

## 5. Što činiti ako slučajno uzmem više od propisane doze?

Ako uzmete previše Xyrema® (predoziranje), odmah zovite hitnu pomoć.

Uzimanje previše Xyrema® može prouzročiti simptome poput uznemirenosti, smetenosti, otežanog kretanja, otežanog disanja, zamagljenog vida, pojačanog znojenja, glavobolje, povraćanja i suženja svijesti koje vodi prema komi te napadaja. Medicinskom osoblju ćete pomoći u zbrinjavanju svojih simptoma ako sa sobom uzmete označenu bocu s lijekom, čak i ako je prazna.

## 6. Što ako naglo prestanem uzimati Xyrem®?

Ako naglo prestanete uzimati Xyrem® možda ćete doživjeti simptome ustezanja. Možda će Vam se vratiti napadi katapleksije te, u rijetkim slučajevima, možete iskusiti nesanicu, glavobolju, tjeskobu, omaglicu, probleme sa spavanjem, pospanost, halucinacije i abnormalno razmišljanje.

## 7. Koje su ostale važne stvari koje moram znati o uzimanju Xyrema®?

- Nemojte dijeliti svoj Xyrem® ni s kim.
- Uzimajte samo dozu koju Vam je propisao Vaš liječnik. Ako mislite da dozu treba promijeniti, obratite se svom liječniku.
- Uvijek poštujujte 2-satni interval između zadnjeg obroka i uzimanja lijeka Xyrem®
- Uvijek čuvajte Xyrem® u njegovom originalnom pakiranju, na sigurnom mjestu.
- Čuvajte Xyrem® izvan dohvata djece.
- Sav neiskorišteni lijek vratite u ljekarnu.
- Ako primijetite bilo koje neuobičajene simptome poput čudnih misli, uključujući misli o ranjavanju drugih tijekom uzimanja lijeka Xyrem®, odmah obavijestite svog liječnika.

# Često postavljana pitanja o sigurnosti lijeka Xyrem® (natrijev oksibat)

*U ovoj knjižici su navedena neka pitanja koja ćete možda imati o uzimanju Xyrema®. Svakako razgovarajte sa svojim zdravstvenim radnikom o svim ostalim pitanjima koja ćete možda imati te pregledajte Uputu o lijeku koja je u kutiji s lijekom.*

## 1. Što je Xyrem®?

Xyrem® je naziv oralnog lijeka koji se dobiva na recept i koji se koristi za liječenje odraslih osoba koje:

- često zaspu tijekom dana i u neočekivanim trenucima (narkolepsija)
- dožive iznenadnu slabost ili paralizu mišića kada osjete snažne emocije (katapleksija)

O svim sumnjama na nuspojave lijeka potrebno je obavijestiti svog liječnika ili ljekarnika, odnosno drugog zdravstvenog radnika s kojim ste u stupili u kontakt. O sumnji na nuspojavu možete izvijestiti Agenciju za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) putem:

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)  
Internetska stranica: [www.halmed.hr](http://www.halmed.hr) ili potražite HALMED aplikaciju putem Google Play ili Apple App Store trgovine

## **2. Mogu li piti alkohol dok uzimam Xyrem®?**

Ne, ne smijete piti alkohol dok uzimate Xyrem®. Učinci Xyrema® mogu biti pojačani te možete doživjeti otežano disanje (respiratornu depresiju) koje može biti fatalno. Možete također doživjeti smanjenu mogućnost razmišljanja ili smetenost.

## **3. Koje su ozbiljne nuspojave Xyrema®?**

### **Poteškoće s disanjem (respiratorna depresija)**

Xyrem® može utjecati na disanje. Ako imate bilo kakvih problema s disanjem ili s plućima, to morate reći svom liječniku prije uzimanja Xyrema®. Ako imate prekomjernu težinu, također imate povećani rizik od respiratorne depresije. Ne smijete uzimati alkohol jer time također povećavate rizik od respiratorne depresije. Respiratorna depresija može biti ozbiljna, čak i fatalna.

### **Depresija i suicidalne misli**

Ako se osjećate deprimirano ili imate bilo kakve misli o tome da si naudite dok uzimate Xyrem®, odmah obavijestite svog liječnika. Također biste trebali obavijestiti svog liječnika ako ste u prošlosti bolovali od depresije.

### **Smanjena razina svijesti**

Xyrem® izaziva omamljenost i može smanjiti Vašu razinu svijesti zato što djeluje izravno na mozak. To može dovesti do kome i može biti fatalno. Važno je da ne uzimate alkohol dok uzimate Xyrem®. Ne smijete uzimati nikakve druge lijekove koji izazivaju omamljenost. Također ne biste smjeli upravljati vozilima ni raditi sa strojevima najmanje 6 sati nakon uzimanja Xyrema®.

## **Napadaji**

Xyrem® može prouzročiti napadaje. Prije uzimanja Xyrema® trebate reći svom liječniku ako ste u prošlosti imali bilo kakve napadaje.

## **Ovisnost/zlouporaba/pogrešna uporaba**

Aktivni sastojak Xyrema® je gama-hidroksibutirat (GHB). GHB je kemikalija koja je bila zlouporabljivana i pogrešno rabljena. Vaš liječnik će Vas stoga posebno pitati jeste li ikad zlouporabili droge/lijekove u prošlosti. Zlouporaba i pogrešna uporaba Xyrema® je opasna i može dovesti do fatalnih posljedica.

Ovo nisu sve nuspojave Xyrema®. Obratite se svom liječniku za medicinski savjet oko nuspojava.

## **4. Je li sigurno uzimati Xyrem® s drugim lijekovima?**

Kao sa svim lijekovima, vrlo je važno da obavijestite svog liječnika o svim ostalim lijekovima koje uzimate, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta. Xyrem® se ne smije uzimati u kombinaciji s lijekovima koji izazivaju omamljenost, ili s lijekovima kao što su opioidni analgetici koji mogu prouzročiti depresiju središnjeg živčanog sustava. Svakako obavijestite svog liječnika ako uzimate lijekove koji utječu na aktivnost središnjeg živčanog sustava (antidepresive, valproat, topiramet, fenitoin ili etosuksimid).

Pitajte svog liječnika da Vam da Xyrem® Karticu s upozorenjima za bolesnika. Karticu nosite sa sobom da vas podsjeti o primjeni Xyrema®. Pokažite tu karticu svim svojim liječnicima kako bi znali da uzimate Xyrem®, posebice ako Vam oni propisuju druge lijekove.