

KARTICA S UPOZORENJIMA ZA BOLESNIKA

Sadržaj

Pradaxa®
dabigatraneteksilat

- Ovu karticu imajte sa sobom u svakom trenutku
- Budite sigurni da koristite najnoviju verziju

01/2018



Poštovani bolesniče,

Vaš liječnik počeo je liječenje Pradaxom®. U cilju sigurne primjene Pradaxe®, molimo uzmite u obzir važne informacije koje se u njoj nalaze. S obzirom da ova Kartica s upozorenjima za bolesnika sadrži važne informacije o vašem liječenju, molimo da uvijek nosite ovu karticu sa sobom kako biste mogli informirati zdravstvene djelatnike da primjenjujete Pradaxu®.



Pradaxa® Informacije za bolesnike

O vašem liječenju

- Pradaxa® razrjeđuje krv, što sprječava stvaranje opasnih krvnih ugrušaka.
- Slijedite upute svog liječnika tijekom primjene Pradaxe®. Ne propuštajte uzeti dozu i ne prekidajte primjenu Pradaxe® bez savjetovanja s liječnikom.
- Obavijestite liječnika o svim lijekovima koje trenutno primjenjujete.
- Obavijestite liječnika da uzimate Pradaxu® prije svakog kirurškog ili invazivnog zahvata.

- Pradaxa® se može uzimati sa ili bez hrane. Kapsulu progutajte cijelu s čašom vode. Nemojte lomiti ili žvakati kapsulu niti prazniti pelete iz kapsule.

Kada potražiti liječnički savjet

- Uzimanje Pradaxe® može povećati rizik od krvarenja. Odmah se obratite liječniku ako razvijete bilo koji od sljedećih mogućih znakova i simptoma krvarenja: oticanje, nelagodu, neobičan bol ili glavobolju, omaglicu, bljedilo, slabost, neobične modrice, krvarenje iz nosa, krvarenje desni, neobično dugo trajno krvarenje iz posjekotina, abnormalno menstruacijsko ili vaginalno krvarenje, krv u mokraći koja može biti ružičasta ili smeđa, crvene/crne stolice, iskašljavanje krvi, povraćanje krvi ili sadržaja nalik talogu kave.

HR

- Ako padnete ili se ozlijedite, osobito ako udarite glavom, hitno potražite liječnički savjet.
- Ne prekidajte primjenu Pradaxe® bez savjetovanja s liječnikom ako osjetite žgaravicu, mučninu, povraćate, osjećate nelagodu u trbuhu, nadutost ili bol u gornjem dijelu trbuha.

Pradaxa® Informacije za zdravstvene radnike

- Pradaxa® je oralni antikoagulans (direktni inhibitor trombina).
- Primjena Pradaxe® možda se mora prekinuti prije kirurškog ili drugog invazivnog postupka.
- U slučaju velikih krvarenja, primjena Pradaxe® se mora odmah prekinuti.
- Dostupan je specifičan antagonist (Praxbind®) (pogledajte Sažetak opisa svojstava lijeka za Pradaxu® i Praxbind®).
- Pradaxa® se uglavnom eliminira putem bubrega; odgovarajuća diureza se mora održavati. Pradaxa® se može dijalizirati.

Molimo, ispunite ovaj dio ili zamolite liječnika da to učini.

2 Podaci o bolesniku

6

Ime bolesnika

Datum rođenja

Indikacija za antikoagulaciju

3 Doza Pradaxe®

7