

# SADRŽI VAŽNE MEDICINSKE INFORMACIJE



Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u uputi o lijeku. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) putem internetske stranice [www.halmed.hr](http://www.halmed.hr) ili potražite HALMED aplikaciju putem Google Play ili Apple App Store trgovine. Prijavlivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Verzija 1, 9/2018  
CRO-MeEd-HEM-EM-002-14/11/2018



---

Broj telefona:

---

Ime liječnika/naziv klinike, centra ili bolnice:

**U slučaju hitnosti ili ako pronadete ovu karticu,  
kontaktirajte ovog liječnika:**

**Za BOLESNIKE liječene daratumumabom: Pokažite ovu karticu zdravstvenim radnicima PRIJE transfuzije krvi i nosite je sa sobom još 6 mjeseci nakon završetka liječenja**  
**Za dodatne informacije pročitajte uputu o lijeku**

## **Identifikacijska kartica bolesnika koji se liječi daratumumabom**

Ime i prezime: \_\_\_\_\_

### **Uzimam sljedeći lijek:**

daratumumab - protutijelo za liječenje multiplog mijeloma

Prestao/la sam uzimati ovaj lijek \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
DD MM GGGG

### **Za zdravstvene radnike:**

Daratumumab je povezan s rizikom od interferencije s tipiziranjem krvi. Nalaz indirektnog Coombsovog testa (indirektnog antiglobulinskog testa [IAT]) u bolesnika koji uzimaju daratumumab može biti pozitivan, čak i ako u bolesnikovu serumu nisu prisutna protutijela na manje značajne antigene. Taj učinak može potrajati do 6 mjeseci nakon primjene posljednje doze lijeka. Nema utjecaja na određivanje bolesnikove krvne grupe (ABO) ni Rh faktora.

Ako je potrebna hitna transfuzija, mogu se primijeniti ABO/RhD-kompatibilni eritrociti za koje nije provedena križna proba, u skladu s praksom lokalne banke krvi.

Za više informacija pročitajte zadnju odobrenu uputu o lijeku ili se obratite Janssen medicinskom odjelu (telefonom: 01 6610 700 ili E-poštom: JJSAFETY@jnjcr.jnj.com), a dodatne informacije možete potražiti i na sljedećoj poveznici: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/trf.13069/epdf>

Verzija 1, 9/2018

### **Prije početka liječenja daratumumabom, nalazi krvnih pretraga provedenih na uzorcima prikupljenima**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ **bili su:**  
DD MM GGGG

Krvna grupa:  A  B  AB  0  Rh+  Rh-

**Nalaz indirektnog Coombsovog testa (probira na protutijela) bio je:**

negativan  pozitivan na sljedeća protutijela:

Drugo: \_\_\_\_\_

Kontaktni podaci institucije u kojoj su provedene krvne pretrage:

Verzija 1, 9/2018