

Lista provjere za propisivače:

LISTA PROVJERE ZA PROPISIVAČE – ciproteronacetat/etinilestradiol

Molimo Vas da koristite ovu listu provjere uz Sažetak opisa svojstava lijeka u redovitim intervalima.

Indikacija u kojoj je propisan ciproteronacetat/etinilestradiol:

Liječenje umjerenih do teških oblika akni povezanih s osjetljivošću na androgene (sa ili bez seboreje) i/ili hirzutizmom, u žena reproduktivne dobi.

Za liječenje akni ciproteronacetat/etinilestradiol se smije koristiti tek kad se lokalno liječenje ili sistemski liječenja antibioticima pokažu neuspješnima.

Kako je ciproteronacetat/etinilestradiol također hormonski kontraceptiv, ne smiju se koristiti u kombinaciji s drugim hormonskim kontraceptivima.

- Tromboembolija (npr. duboka venska tromboza, plućna embolija, srčani udar i moždani udar) je rijedak, ali važan rizik povezan s uzimanjem ciproteronacetata/etinilestradiola.
- Ukupan rizik ovisit će također o osnovnom riziku od tromboembolije koji svaka žena ima. Pri odluci o korištenju ciproteronacetata/etinilestradiola moraju se uzeti u obzir kontraindikacije i prisustvo čimbenika rizika pojedinačno kod svake žene, pogotovo onih za tromboemboliju – vidjeti donje tablice i Sažetak opisa svojstava lijeka.
- Rizik od nastanka tromboembolije pri uzimanju ciproteronacetata/etinilestradiola viši je:
 - tijekom prve godine primjene
 - pri ponovnom počinjanju s primjenom nakon stanke od mjesec dana ili više.
- Odluku o primjeni ciproteronacetata/etinilestradiola treba donijeti tek nakon razgovora s pacijenticom kako bi se osiguralo da ona razumije
 - učinak svakog intrinzičnog čimbenika rizika na njezin rizik od tromboze
 - rizik od tromboembolije pri uzimanju ciproteronacetata/etinilestradiola
 - kako mora budno pratiti na eventualnu pojavu znakova i simptoma tromboze

Molimo Vas da vodite računa o mogućnosti tromboembolijskog događaja u zdravih žena reproduktivne dobi i u slučaju nespecifičnih, neobjašnjениh pritužbi poput boli u nozi, kašla/dispneje ili glavobolje.

Nemojte propisati ciproteronacetat/etinilestradiol ako označite ijednu od kućica u ovom dijelu. Pacijentica:

<input type="checkbox"/>	Istodobno koristi drugi hormonski kontraceptiv?
<input type="checkbox"/>	Akutni ili tromboembolijski događaj u osobnoj povijesti bolesti, npr. duboka venska tromboza, plućna embolija, srčani udar, moždani udar, tranzitorna ishemijačka ataka, angina pektoris?
<input type="checkbox"/>	Zna da ima predispoziciju za poremećaj zgrušavanja krvi?
<input type="checkbox"/>	Ima migrenu s aurom u povijesti bolesti?
<input type="checkbox"/>	Ima šećernu bolest s vaskularnim komplikacijama?
<input type="checkbox"/>	Ima vrlo visok krvni tlak, npr. sistolički ≥ 160 ili dijastolički ≥ 100 mm Hg?
<input type="checkbox"/>	Ima vrlo visoke vrijednosti lipida u krvi?
<input type="checkbox"/>	Nadolazeći veliki kirurški zahvat ili period produljene imobilizacije? Ako da, savjetujte bolesnici da <u>prekine s uzimanjem ciproteronacetata/etinilestradiola i počne s nehormonskim liječenjem kožnih problema</u> i, ako je potrebno, s nehormonskom metodom kontracepcije, tijekom

	najmanje 4 tjedna prije i 2 tjedna nakon potpune remobilizacije (Treba se procijeniti u usporedbi s rizikom od nastanka VTE nakon prestanka uzimanja ciproteronacetata/etinilestradiola tijekom 4 tjedna ili više).
--	---

Razgovarajte o prikladnosti ciproteronacetata/etinilestradiola s pacijenticom ako označite jednu kućicu u ovom dijelu:

<input type="checkbox"/>	Je li njezin indeks tjelesne mase preko 30 kg/m ² ?
<input type="checkbox"/>	Je li starija od 35 godina?
<input type="checkbox"/>	Je li pušač? Ako je pušač i starija je od 35 godina mora joj se strogo savjetovati da prestane pušiti ili da koristi nehormonsko liječenje za akne i/ili hirzutizam.
<input type="checkbox"/>	Ima li visok krvni tlak, npr. sistolički 140-159 ili dijastolički 90-99 mmHg?
<input type="checkbox"/>	Ako je netko od članova njene uže obitelji (npr. roditelja ili brat/sestra) imao tromboembolijski događaj (vidi listu gore) u mlađoj dobi (npr. mlađi od 50 godina)?
<input type="checkbox"/>	Ako ona ili netko u njenoj užoj obitelji ima visoke vrijednosti lipida u krvi?
<input type="checkbox"/>	Pati li od migrena?
<input type="checkbox"/>	Ima li kardiovaskularno stanje poput fibrilacije atrija, aritmije, koronarne bolesti srca, bolesti srčanih zalistaka?
<input type="checkbox"/>	Ima li šećernu bolest?
<input type="checkbox"/>	Je li rodila u posljednjih nekoliko tjedana?
<input type="checkbox"/>	Ako ima neko drugo zdravstveno stanje koje može povisiti rizik od tromboze (npr. karcinom, sistemski lupus eritematodes, anemiju srpastih stanica, Crohnovu bolest, ulcerozni kolitis, hemolitičko-uremijski sindrom)?
<input type="checkbox"/>	Uzima li neke druge lijekove koji mogu povećati rizik od tromboze (npr. kortikosteroide, neuroleptike, antipsihotike, antidepresive, kemoterapeutike itd.)?

Prisutnost više od jednog čimbenika rizika može značiti da se ne smije uzimati ciproteronacetat/etinilestradiol

Ne zaboravite, individualni čimbenici rizika pacijentice mogu se s vremenom promijeniti te ih se mora ponovno procijenjivati u redovitim intervalima.

Molimo Vas osigurajte da Vaša pacijentica razumije kako je potrebno obavijestiti zdravstvenog radnika o činjenici da koristi ciproteronacetat/etinilestradiol ako joj je:

- potrebna operacija
 - potreban period produljene imobilizacije (npr. zbog ozljede ili bolesti ili ako joj je nogu u gipsu)
- U tim bi slučajevima bilo najbolje razmotriti prekid uzimanja ciproteronacetata/etinilestradiola dok se rizik ne vrati na uobičajenu razinu.

Molimo Vas, obavijestite Vašu pacijenticu da se rizik od krvnog ugruška povećava:

- Na dugim putovanjima (npr. dugotrajni letovi avionom)
 - Razvojem jednog ili više gore navedenih čimbenika rizika za ciproteronacetat/etinilestradiol
 - Ako je rodila u posljednjih nekoliko tjedana
- U tim bi slučajevima Vaša pacijentica mora posebno paziti na znakove i simptome tromboembolije.

Molimo Vas **savjetujte Vašoj pacijentici da Vas obavijesti** ako se bilo koje od gore navedenih stanja promijeni ili pogorša.

Molimo Vas da snažno potaknete pacijentice da pročitaju Uputu o lijeku priloženu u svakom pakiranju lijeka. Ona uključuje simptome krvnih ugrušaka na koje mora paziti.

Svaku sumnju na nuspojavu uzrokovanoj ciproteronacetat/etinilestradiolom prijavite na kontakt podatke nositelja odobrenja ili Agenciji za lijekove i medicinske proizvode putem internetske stranice www.halmed.hr ili potražite HALMED aplikaciju putem Google Play ili Apple App Store trgovine.