

Što morate znati prije uzimanja?

Što morate napraviti prije, tijekom i nakon liječenja?

Esmya® 5 mg tablete

Kartica za bolesnicu

Lijek Esmya može uzrokovati nuspojave, iako se one neće javiti kod svakoga. Jedna od mogućih nuspojava je ozbiljno oštećenje jetre.

U ovoj kartici nalaze se informacije o krvnim pretragama koje ćete morati obavljati tijekom liječenja i o tome što morate učiniti ako se pojave nuspojave vezane uz jetru.

Nemojte uzimati lijek Esmya ako imate problema s jetrom. Recite svojem liječniku ako znate da imate problema s jetrom ili ako niste sigurni u stanje svoje jetre.

Redovito obavljati krvne pretrage

Trebate napraviti krvne pretrage prije početka svakog ciklusa liječenja kako biste provjerili kakva je funkcija Vaše jetre. Ovisno o rezultatima tih pretraga, liječnik će odlučiti je li liječenje lijekom Esmya prikladno za Vas.

Tijekom liječenja lijekom Esmya Vaš će liječnik redovito obavljati krvne pretrage kako bi provjerio funkciju Vaše jetre. Te pretrage moraju se obavljati svaki mjesec, uključujući i nekoliko tjedana nakon što završite ciklus liječenja (vidjeti raspored u nastavku). Te krvne pretrage pružit će liječniku informacije o funkciji Vaše jetre i ključne su za praćenje Vašeg liječenja.

Tablica u nastavku olakšat će vam praćenje krvnih pretraga

Znakovi i simptomi mogućih problema s jetrom

	DATUM
1. PRETRAGA (prije početka liječenja)	
Početak liječenja	
2. PRETRAGA (4 tjedna nakon početka liječenja)	
3. PRETRAGA (8 tjedana nakon početka liječenja)	
4. PRETRAGA (12 tjedana nakon početka liječenja)	
5. PRETRAGA (2 do 4 tjedna nakon prestanka uzimanja lijeka Esmya)	

Prestanite uzimati lijek i odmah se obratite liječniku ako uočite bilo koji od sljedećih znakova ili simptoma:

- umor, teški zamor
- žutilo kože/žutilo očiju
- tamnu mokraću
- bol u gornjem desnom dijelu trbuha
- svrbež
- mučninu
- povraćanje.

Liječnik mora odmah provjeriti Vašu jetru i odlučiti možete li nastaviti liječenje.