

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Volquer 50 mg tablete s produljenim oslobođanjem

Volquer 200 mg tablete s produljenim oslobođanjem

Volquer 300 mg tablete s produljenim oslobođanjem

Volquer 400 mg tablete s produljenim oslobođanjem

kvetiapin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Volquer i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Volquer
3. Kako uzimati Volquer
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Volquer
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Volquer i za što se koristi

Volquer sadrži djelatnu tvar kvetiapin. Ona pripada skupini lijekova koju nazivamo antipsihotici.

Volquer se može koristiti za liječenje različitih bolesti, kao što su:

- bipolarna depresija i velike depresivne epizode u velikom depresivnom poremećaju: stanje u kojem stalno možete osjećati tugu ili se možete osjećati potišteno, imati osjećaj krivnje, nedostatak energije, gubitak apetita ili nesanica.
- manija: stanje u kojem se možete osjećati uzbudeno, ushićeno, uznemireno, entuzijastično ili hiperaktivno; ili možete imati poremećaj prosuđivanja što uključuje agresivno ili razorno ponašanje.
- shizofrenija: stanje u kojem možete čuti ili osjećati nešto što ne postoji, vjerovati u nešto što nije istinito ili osjećati neobičnu sumnjičavost, tjeskobu, smetenost, krivnju, napetost ili potištenost.

Kada se Volquer koristi za liječenje velikih depresivnih epizoda u velikom depresivnom poremećaju, on se uzima kao dodatna terapija uz drugi lijek za liječenje ove bolesti.

Liječnik može nastaviti s propisivanjem Volquera čak i kada se osjećate bolje.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Volquer

Nemojte uzimati Volquer

- ako ste alergični na kvetiapin ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (navedeno u dijelu 6)
- ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova:
 - neke lijekove za liječenje HIV infekcija

- lijekove iz skupine azola (za liječenje gljivičnih infekcija)
- eritromicin ili klaritromicin (lijekovi za liječenje bakterijskih infekcija)
- nefazodon (lijek za liječenje depresije).

Ako se bilo što od gore navedenog odnosi na Vas, nemojte uzimati Volqer. Ako niste sigurni, prije uzimanja Volqera posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Upozorenja i mjere opreza

Prije uzimanja Volqera, obavijestite svog liječnika:

- ako Vi, ili netko iz Vaše obitelji, ima ili je imao bilo kakve poteškoće sa srcem, na primjer poremećaje srčanog ritma, slabljenje srčanog mišića ili upalu srca, ili ako uzimate bilo koje lijekove koji mogu utjecati na rad Vašeg srca.
- ako imate nizak krvni tlak.
- ako ste imali moždani udar, osobito ako ste starije životne dobi.
- ako imate poteškoće s jetrom.
- ako ste ikada imali napadaj (konvulzije).
- ako imate šećernu bolest ili rizik da od nje obolite. Ako je tako, liječnik Vam može provjeravati razinu šećera u krvi za vrijeme uzimanja Volqera.
- ako Vam je poznato da ste u prošlosti imali sniženi broj bijelih krvnih stanica (što je moglo ili nije moralo biti uzrokovano uzimanjem drugih lijekova).
- ako ste starije životne dobi i imate demenciju (poremećaj funkcije mozga). U tom slučaju ne biste trebali uzimati Volqer jer skupina lijekova kojoj pripada Volqer može povećati rizik od moždanog udara, ili u nekim slučajevima rizik od smrtnog ishoda, u osoba starije životne dobi s demencijom.
- ako ste starija osoba i imate Parkinsonovu bolest/parkinsonizam
- ako Vi, ili netko iz Vaše obitelji u povijesti bolesti ima podatak o pojavi krvnih ugrušaka, jer su lijekovi poput ovog povezani sa stvaranjem krvnih ugrušaka.
- ako imate ili ste imali stanje kada ste prestali disati na kraće periode tijekom Vašeg normalnog noćnog sna (tzv. „apneja u snu“) i uzimate lijekove koji usporavaju normalnu aktivnost mozga („depresori“).
- ako imate ili ste imali stanje kada ne možete u potpunosti isprazniti svoj mjeđur (zadržavanje urina), imate uvećanu prostatu, začepljenje crijeva ili povišen očni tlak. Ova stanja su ponekad uzrokovana lijekovima (tzv. „antikolinergicima“) koji utječu na način funkcioniranja živčanih stanica kako bi se liječila određena medicinska stanja.
- ako ste imali problema s alkoholom ili zlouporabom droga.

Odmah obavijestite svog liječnika ako nakon uzimanja Volqera primijetite bilo što od navedenog:

- kombinaciju vrućice, jake ukočenosti mišića, znojenja ili smanjenja stupnja svijesti (poremećaj pod nazivom „neuroleptički maligni sindrom“). Možda će biti potrebno hitno medicinsko liječenje.
- nekontrolirane pokrete, uglavnom lica ili jezika.
- omaglicu ili jaki osjećaj pospanosti. To može povećati rizik od ozljeda zbog nezgode (pad) u starijih bolesnika.
- napadaje (konvulzije).
- dugotrajnu i bolnu erekciju (prijapizam).

Navedena stanja mogu biti uzrokovana ovom skupinom lijekova.

Što prije obavijestite svog liječnika ako imate:

- vrućicu, simptome nalik gripi, grlobolju ili bilo koju drugu infekciju jer to može biti posljedica vrlo niskog broja bijelih krvnih stanica, zbog čega ćete možda morati prestati uzimati Volquer i/ili primiti liječenje.
- zatvor praćen bolovima u trbuhu koji ne prolaze, ili zatvor koji ne odgovara na liječenje jer to može dovesti do ozbiljnije blokade crijeva.

Misli o samoubojstvu i pogoršanje Vaše depresije

Ako ste depresivni, ponekad Vam se mogu pojaviti misli o samoozljđivanju ili samoubojstvu. Do toga češće može doći na početku liječenja, jer ovoj skupini lijekova treba određeno vrijeme da počnu djelovati, obično oko dva tjedna, ali ponekad i dulje.

Ove misli mogu biti češće i pri naglom prestanku uzimanja lijeka. Također, mogu biti češće i kod mlađih odraslih osoba. Informacije iz kliničkih ispitivanja pokazuju da se povećani rizik od pojave misli o samoubojstvu i/ili suicidalnog ponašanja javlja u mlađih odraslih osoba u dobi ispod 25 godina, koje boluju od depresije.

Ako Vam se u bilo koje vrijeme pojave misli o samoozljđivanju ili samoubojstvu, odmah se javite svom liječniku ili otidite u najbližu bolnicu. Možda će Vam biti od pomoći ako kažete rođaku ili bliskom prijatelju da ste depresivni te ih zamolite da pročitaju ovu uputu. Također, možete ih zamoliti da Vam kažu ako misle da se Vaša depresija pogoršava, ili ako su zabrinuti zbog promjena u Vašem ponašanju.

Porast tjelesne težine

Porast tjelesne težine je opažen u bolesnika koji uzimaju Volquer. I Vi i Vaš liječnik trebate redovito nadzirati Vašu tjelesnu težinu.

Djeca i adolescenti

Volquer se ne smije primjenjivati kod djece i adolescenata mlađih od 18 godina.

Drugi lijekovi i Volquer

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Ne uzimajte Volquer ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova:

- neke lijekove za liječenje HIV infekcija.
- lijekove iz skupine azola (za liječenje gljivičnih infekcija).
- eritromicin ili klaritromicin (lijekovi za liječenje infekcija).
- nefazodon (lijek za liječenje depresije).

Obavijestite svog liječnika ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova:

- lijekove za epilepsiju (kao što su fenitoin ili karbamazepin).
- lijekove za liječenje povišenog krvnog tlaka.
- barbiturate (lijekovi za liječenje poremećaja spavanja).
- tioridazin ili litij (također antipsihotici).
- lijekove koji utječu na rad srca, na primjer, lijekove koji mogu uzrokovati neravnotežu elektrolita (niske razine kalija ili magnezija) kao što su diuretici (lijekovi za izmokravanje) ili određeni antibiotici (lijekovi za liječenje infekcija).
- lijekove koji mogu uzrokovati zatvor.
- lijekove (tzv. „antikolinergike“) koji utječu na način funkcioniranja živčanih stanica kako bi se liječila određena medicinska stanja.

Prije nego što prestanete uzimati bilo koji od lijekova koje inače uzimate, porazgovarajte sa svojim liječnikom.

Volquer s hranom, pićem i alkoholom

- hrana može utjecati na Volquer i zbog toga morate uzeti svoje tablete najmanje jedan sat prije obroka ili prije spavanja.
- budite oprezni s količinom alkohola koju uzimate. Razlog je što Vas kombinirani utjecaj Volquera i alkohola može učiniti pospanima.
- nemojte pitи sok od grejpa za vrijeme uzimanja Volquera. Sok od grejpa može utjecati na djelovanje lijeka.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ne smijete uzimati Volquer za vrijeme trudnoće, ukoliko to prethodno nije raspravljeno s Vašim liječnikom. Volquer se ne smije uzimati ako dojite.

Sljedeći simptomi, koji mogu biti znakovi ustezanja (prekida primjene lijeka), mogu se javiti kod novorođenčadi majki koje su uzimale Volquer u zadnjem tromjesečju (zadnja tri mjeseca) trudnoće: tresavica, ukočenost i/ili slabost mišića, pospanost, uznemirenost, poteškoće s disanjem i otežano hranjenje. Ako Vaše dijete razvije bilo koji od tih simptoma, morate se javiti liječniku.

Upravljanje vozilima i strojevima

Vaše tablete Vas mogu učiniti pospanima. Ne vozite i ne rukujte alatima ili strojevima sve dok ne utvrđuite kako ove tablete djeluju na Vas.

Učinak na probirne testove na lijekove u urinu

Ukoliko ste podvrgnuti probirnim testovima na lijekove u urinu, uzimanje Volquera može uzrokovati pozitivne rezultate na metadon ili određene lijekove protiv depresije koji se zovu triciklički antidepresivi kada se koriste određene metode testiranja, iako Vi možda ne uzimate metadon ili tricikličke antidepresive. Ako se to dogodi, može se koristiti specifičniji test.

Volquer sadrži laktozu

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite određene šećere, posavjetujte se s njim prije uzimanja ovog lijeka.

3. Kako uzimati Volquer

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

O početnoj dozi lijeka odlučit će Vaš liječnik. Doza održavanja (dnevna doza) će ovisiti o Vašoj bolesti i potrebama, no obično će se kretati između 150 i 800 mg.

- svoje tablete ćete uzimati jednom dnevno.
- tablete ne smijete lomiti, žvakati ili drobiti.
- tablete progrutajte cijele, s nešto vode.
- svoje tablete uzmite bez hrane (najmanje jedan sat prije obroka ili prije spavanja, liječnik će Vam reći kada).

- tijekom liječenja Volqerom nemojte piti sok od grejpa, jer može utjecati na djelovanje lijeka u organizmu.
- čak i ako se osjećate bolje, nemojte prestati uzimati tablete sve dok Vam to ne preporuči liječnik.

Jetrene tegobe

Ako imate jetrenih tegoba, liječnik Vam može promijeniti dozu.

Stariji bolesnici

Ako ste u starijoj životnoj dobi, liječnik Vam može dati nižu dozu.

Primjena u djece i adolescenata (mladih od 18 godina)

Volker se ne smije primjenjivati kod djece i adolescenata mlađih od 18 godina.

Ako uzmete više Volqera nego što ste trebali

Ako uzmete više Volqera nego što Vam je propisao liječnik, mogli biste osjetiti pospanost, omaglicu i nepravilan rad srca. Odmah zatražite savjet liječnika ili najbliže bolnice. Ponesite Volker tablete sa sobom.

Ako ste zaboravili uzeti Volker

Ako ste zaboravili uzeti dozu, uzmite je čim se sjetite. Ako je uskoro vrijeme za sljedeću dozu, pričekajte do tada. Ne uzimajte dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Volker

Ako naglo prestanete uzimati Volker, mogli biste osjetiti nesanicu, ili mučninu, ili biste mogli imati glavobolju, proljev, povraćanje, omaglicu ili biti razdražljivi.

Liječnik Vam može savjetovati da postupno smanjujete dozu lijeka, prije potpunog prestanka uzimanja.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Vrlo često (mogu se javiti kod više od 1 na 10 osoba):

- omaglica (može dovesti do padova), glavobolja ili suha usta.
- osjećaj pospanosti koji nastavkom uzimanja Volqera i tokom vremena može nestati (može dovesti do padova).
- simptomi ustezanja (simptomi koji se javljaju kod prekida uzimanja Volqera) uključuju nemogućnost spavanja (nesanica), mučninu, glavobolju, proljev, povraćanje, omaglicu i razdražljivost. Savjetuje se postupan prekid liječenja tijekom najmanje 1 do 2 tjedna.
- dobivanje na težini.
- abnormalni pokreti mišića. Oni uključuju otežano pokretanje mišića, tresavicu, osjećaj nemira ili ukočenost mišića bez bolova.
- promjene u količini određenih masnoća (triglicerida i ukupnog kolesterola).

Često (mogu se javiti kod 1 na 10 osoba):

- ubrzani otkucaji srca.
- osjećaj da Vaše srce lupa, vrlo brzo radi ili preskače otkucaje.

- zatvor ili želučane tegobe (poremećaj probave).
- osjećaj slabosti.
- oticanje ruku ili nogu.
- nizak krvni tlak prilikom ustajanja. Zbog toga možete imati osjećaj omaglice ili nesvjesticu (može dovesti do padova).
- porast razine šećera u krvi.
- zamućen vid.
- abnormalni snovi i noćne more.
- pojačani osjećaj gladi.
- osjećaj razdraženosti.
- poremećaj u govoru i jeziku.
- razmišljanje o samoubojstvu i pogoršanje Vaše depresije.
- kratak dah (zaduha).
- povraćanje (uglavnom kod starijih osoba).
- vrućica.
- promjene u količini hormona štitnjače u krvi.
- smanjenja broja određenih vrsta krvnih stanica.
- povećanja količine jetrenih enzima u krvi.
- povećanja količine hormona prolaktina u krvi. Povećane količine hormona prolaktina mogu u rijetkim slučajevima uzrokovati sljedeće:
 - oticanje dojki i neočekivano izlučivanje mlijeka iz dojki u muškaraca i žena.
 - izostanak mjesečnica ili neredovite mjesečnice u žena.

Manje često (mogu se javiti kod 1 na 100 osoba):

- napadaji.
- alergijske reakcije koje mogu uključivati pojavu uzdignuća (oteklina) na koži, oticanje kože i oticanje područja oko usta.
- neugodan osjećaj u nogama (poznat i kao sindrom nemirnih nogu).
- poteškoće s gutanjem.
- nekontrolirani pokreti, osobito lica ili jezika.
- spolna disfunkcija.
- šećerna bolest.
- promjena električne aktivnosti srca vidljiva na EKG-u (produljenje QT intervala)
- sporiji otkucaji srca što se može javiti na početku liječenja i može biti povezano s niskim krvnim tlakom i nesvjesticom.
- otežano mokrenje.
- nesvjestica (može dovesti do padova).
- začepljjen nos.
- smanjenje količine crvenih krvnih stanica.
- smanjenje količine natrija u krvi.
- pogoršanje postojeće šećerne bolesti.

Rijetko (mogu se javiti kod 1 na 1000 osoba):

- kombinacija visoke tjelesne temperature (vrućica), znojenja, ukočenosti mišića, osjećaja izrazite omamljenosti ili nesvjestice (poremećaj koji se zove „neuroleptički maligni sindrom“).
- žutilo kože i očiju (žutica).
- upala jetre (hepatitis).
- dugotrajna i bolna erekcija (prijapizam).
- oticanje dojki i neočekivano stvaranje mlijeka (galaktoreja).
- menstrualni poremećaj.

- krvni ugrušci u venama, osobito u nogama (simptomi uključuju oticanje, bol i crvenilo nogu), koji mogu putovati krvnim žilama do pluća uzrokujući bol u prsištu i otežano disanje. Ako primijetite bilo koji od navedenih simptoma odmah potražite liječničku pomoć.
- hodanje, govor, uzimanje hrane ili druge aktivnosti za vrijeme trajanja sna.
- sniženje tjelesne temperature (hipotermija).
- upala gušterače.
- stanje koje se naziva „metaboličkim sindromom“, kod kojega možete imati kombinaciju 3 ili više od sljedećih faktora: povećanje masnog tkiva oko trbuha, smanjenje razine „dobrog“ (HDL) kolesterola, povišenje razine jedne vrste masnoća u krvi (triglicerida), visok krvni tlak i povišenje razine šećera u krvi.
- kombinacija vrućice, simptoma nalik gripi, grlobolje ili bilo koja druga infekcija praćena vrlo niskim brojem bijelih krvnih stanica - to stanje se naziva agranulocitoza.
- blokada crijeva.
- povećana razina kreatin fosfokinaze u krvi (tvari iz mišića).

Vrlo rijetko (mogu se javiti kod 1 na 10 000 osoba):

- težak osip, mjeđuri ili crvene mrlje na koži.
- teška alergijska reakcija (nazvana anafilaksija), koja može uzrokovati otežano disanje ili izazvati šok.
- brzo oticanje kože, obično oko očiju, usana i u području ždrijela (angioedem).
- ozbiljno stanje stvaranja mjeđura na koži, ustima, očima i spolnim organima (Stevens-Johnsonov sindrom).
- neodgovarajuće izlučivanje hormona koji kontrolira volumen mokraće.
- razgradnja mišićnih vlakana i bol u mišićima (rabdomioliza).

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti na osnovi dostupnih podataka):

- osip kože s nepravilnim crvenim mrljama (multiformni eritem).
- ozbiljna, iznenadna alergijska reakcija sa simptomima kao što su vrućica, mjeđuri na koži i ljuštenje kože (toksična epidermalna nekroliza).
- simptomi ustezanja (prekida primjene lijeka) mogu nastupiti u novorođenčadi čije su majke uzimale kvetiapin tijekom trudnoće.
- Lijekom uzrokovani osip s eozinofilijom i sistemskim simptomima (DRESS sindrom). Široko rasprostranjeni osip, visoka tjelesna temperatura, povišena razina jetrenih enzima, abnormalnosti u krvi (eozinofilija), povećani limfni čvorovi i uključenost drugih organa (lijekom uzrokovani osip s eozinofilijom i sistemskim simptomima, također poznat kao DRESS ili sindrom preosjetljivosti na lijek). Prestanite uzimati Volker ako Vam se javi simptomi i odmah kontaktirajte Vašeg liječnika ili odmah potražite medicinsku pomoć
- moždani udar

Lijekovi iz skupine kojoj pripada i Volker mogu uzrokovati poremećaje srčanoga ritma, koji mogu biti ozbiljni, a u teškim slučajevima i smrtonosni.

Pojedine nuspojave se mogu uočiti samo ako se učine krvne pretrage. To uključuje promjene razine određenih masnoća (triglicerida i ukupnog kolesterola) ili šećera u krvi, promjene razine hormona štitnjače u Vašoj krvi, povišene jetrene enzime, smanjenje broja određenih vrsta krvnih stanica, smanjenje broja crvenih krvnih stanica, povišenje kreatin fosfokinaze (nalazi se u mišićima) u krvi, smanjenje količine natrija u krvi i porast razine hormona prolaktina u krvi. U rijetkim slučajevima porast hormona prolaktina može dovesti do sljedećeg:

- oticanje dojki kod muškaraca i žena, te neočekivano stvaranje mlijeka.
- izostanak mjesečnice ili neredovite mjesečnice kod žena.

Zbog toga Vaš liječnik može zatražiti da povremeno obavite pretrage krvi.

Nuspojave u djece i adolescenata

Iste nuspojave koje se mogu pojaviti u odraslih mogu se također pojaviti u djece i adolescenata.

Sljedeće nuspojave su uočene češće u djece i adolescenata, ili nisu bile uočene kod odraslih:

Vrlo često (mogu se javiti kod više od 1 na 10 osoba):

- porast razine hormona prolaktina u krvi. To u rijetkim slučajevima može dovesti do sljedećeg:
 - otok dojki kod dječaka i djevojčica, te neočekivano stvaranje mlijeka.
 - izostanak mjesečnice ili neredovite mjesečnice kod djevojčica.
- povećani apetit.
- povraćanje.
- poremećaj mišićnih pokreta. To uključuje otežano započinjanje mišićnih pokreta, drhtanje, osjećaj nemira ili bezbolnu ukočenost mišića.
- porast krvnog tlaka.

Često (mogu se javiti kod 1 na 10 osoba):

- osjećaj slabosti, nesvjestica (može dovesti do padova).
- začepljen nos.
- osjećaj razdražljivosti.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u [Dodatku V](#).

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Volquer

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

HDPE bočice: nakon prvog otvaranja upotrijebiti prije isteka roka valjanosti označenog na bočici iza oznake „EXP“.

Ovaj lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Volquer sadrži

- Djelatna tvar je kvetiapin. Svaka Volquer tableta s produljenim oslobađanjem sadrži 50 mg, 200 mg, 300 mg ili 400 mg kvetiapina (u obliku kvetiapinfumarata).

- Drugi sastojci su:
Jezgra tablete: metakrilatna kiselina/etilakrilat kopolimer (1:1) vrste A, bezvodna laktoza, magnezijev stearat, kristalična maltoza, talk.
Ovojnica tablete: metakrilatna kiselina/etilakrilat kopolimer (1:1) vrste A, trietilcitrat.

Kako Volqer izgleda i sadržaj pakiranja

- Volqer 50 mg tablete s produljenim oslobađanjem: bijela do skoro bijela, okrugla bikonveksna tableta, promjera 7,1 mm i debljine 3,2 mm, s utisnutim "50" na jednoj strani.
- Volqer 200 mg tablete s produljenim oslobađanjem: bijela do skoro bijela, duguljasta bikonveksna tableta, dužine 15,2 mm, širine 7,7 mm i debljine 4,8 mm, s utisnutim "200" na jednoj strani.
- Volqer 300 mg tablete s produljenim oslobađanjem: bijela do skoro bijela, duguljasta bikonveksna tableta, dužine 18,2 mm, širine 8,2 mm i debljine 5,4 mm, s utisnutim "300" na jednoj strani.
- Volqer 400 mg tablete s produljenim oslobađanjem: bijela do skoro bijela, ovalna bikonveksna tableta, dužine 20,7 mm, širine 10,2 mm i debljine 6,3 mm, s utisnutim "400" na jednoj strani.
- Volqer tablete s produljenim oslobađanjem su dostupne u PVC/PCTFE-Al blisterima pakiranim u kutiju.
- Volqer tablete s produljenim oslobađanjem također su dostupne i u bijeloj, neprozirnoj, HDPE bočici sa polipropilenskim navojnim sigurnosnim zatvaračem za djecu i indukcijski zavarenom zaštitnom folijom.

Veličine pakiranja za blistere su: 10, 30, 50, 56, 60 i 100 tableta.

Veličina pakiranja za boćice su: 60 i 120 tableta.

Veličina pakiranja od 120 tableta ograničena je za bolničku primjenu.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Sandoz d.o.o., Maksimirска 120, Zagreb, Hrvatska

Proizvođač

Pharmathen International S.A, Sapes Industrial Park Block 5, Rodopi, 69300, Grčka

Pharmathen S.A, Dervenakion str. 6, Pallini, 15351 Attiki, Grčka

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, Sachsen-Anhalt, 39179 Barleben, Njemačka

Ovaj lijek je odobren u državama članicama Europskog gospodarskog prostora (EGP) pod sljedećim nazivima:

Država članica	Naziv lijeka
Danska	Quetiapin Hexal 50 mg/150 mg/200 mg/300 mg/400 mg depottabletter
Austrija	Quetiapin Sandoz 50 mg/150 mg/200 mg/300 mg/400 mg – Retardtabletten
Belgija	Quetibloxus 50 mg/150 mg/200 mg/300 mg/400 mg tabletten met verlengde afgifte
Bugarska	Kvelux XR 50 mg/150 mg/200 mg/300 mg/400 mg prolonged release tablet
Njemačka	Quetiapin HEXAL® 50/150/200/300/400 Retardtabletten

Grčka	Quetiapine /Sandoz
Finska	Quetiapin Hexal 50 mg/150 mg/200 mg/300 mg/400 mg depottabletti
Francuska	Quetiapin Sandoz LP 50 mg/150 mg/200 mg/300 mg/400 mg, comprimé à libération prolongée
Mađarska	Quetiapine Sandoz 50 mg/150 mg/200 mg/300 mg/400 mg retard tabletta
Irska	Quetex XR 50 mg/200 mg/300 mg/400 mg Prolonged-release tablets
Island	Quetiapin Hexal 50 mg/150 mg/200 mg/300 mg/400 mg forðatöflur
Italija	Quetiapina Sandoz BV
Luksemburg	Quetibluxus 50 mg/150 mg/200 mg/300 mg/400 mg comprimés à libération prolongée
Nizozemska	Quetiapine Sandoz SR 50 mg/150 mg/200 mg/300 mg/400 mg, tabletten met verlengde afgifte
Poljska	Kvelux SR
Portugal	Quetiapina Sandoz
Rumunjska	Netiapin 50 mg/150 mg/200 mg/300 mg/400 mg comprimate cu eliberare prelungită
Švedska	Quetiapin Hexal 50 mg/150 mg/200 mg/300 mg/400 mg depottabletter
Slovenija	Kvelux SR 50 mg/150 mg/200 mg/300 mg/400 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
Slovačka	Quetiapin Sandoz 50 mg/150 mg/200 mg/300 mg/400 mg
Velika Britanija	Psyquet XL 50 mg/150 mg/200 mg/300 mg/400 mg prolonged-release tablets

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u prosincu 2018.