

Što je lijek Nyxoid®?

Lijek Nyxoid® je sprej za nos u jednodoznom spremniku koji se koristi za hitno liječenje nakon predoziranja opioidima (kao što su heroin, metadon, fentanil, oksikodon, buprenorfin ili morfin). Jedno pakiranje sadrži 2 spreja za nos (2 pojedinačne doze).

Lijek Nyxoid® nije zamjena za hitnu medicinsku skrb.

Lijek Nyxoid® treba sa sobom nositi svatko tko je pod rizikom od predoziranja opioidom. Skrbnici, primjerice članovi uže obitelji ili prijatelji, trebali bi znati gdje mogu pronaći lijek Nyxoid® u slučaju hitnosti.

Kada primijeniti lijek Nyxoid®

Ako znate ili posumnjate da se netko predozirao opioidom, primijenite lijek Nyxoid® onako kako je opisano na drugoj strani ovoga letka.

! UVIJEK morate odmah pozvati hitnu pomoć, čak i ako se osoba probudi – može ponovno izgubiti svijest i prestati disati.


! Budite oprezni: osoba kojoj se primijeni lijek Nyxoid® može pokazivati akutne simptome ustezanja, što može biti opasno.

Ako imate lijek Nyxoid®...

Postavite podsjetnik u kalendaru mjesec dana prije isteka roka valjanosti lijeka Nyxoid, a zatim s liječnikom dogovorite nabavu novog pakiranja.

Kako lijek Nyxoid® djeluje?

Lijek Nyxoid® sadrži **nalokson**, koji privremeno poništava učinak opioidnih lijekova. Nalokson djeluje tako da istiskuje molekule opioidnog lijeka iz njihovih receptora u mozgu i drugdje u tijelu.



Brzi vodič

Za cjelovite upute pogledajte drugu stranu ove kartice.

1 Utvrdite postoje li znakovi predoziranja

2 Pozovite hitnu pomoć



3 Primijenite lijek Nyxoid®



4 Namjestite osobu u bočni položaj



5 Pratite stanje osobe i pružajte potporu dok ne stigne hitna pomoć

6 Primijenite drugu dozu lijeka Nyxoid® ako se bolesnikovo stanje ne poboljša nakon 2-3 minute ILI ako se simptomi predoziranja vrate



7 Pobrinite se za vlastitu sigurnost: pripazite na akutne simptome ustezanja

8 Zbrinite upotrijebljeni lijek Nyxoid® i nabavite novo pakiranje

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u uputi o lijeku. Nuspojave možete prijaviti izravno Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) putem internetske stranice www.halmed.hr ili potražite HALMED mobilnu aplikaciju putem Google Play ili Apple App Store trgovine. Prijavlivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

MEDIS

Medis Adria d.o.o.
Buzinska cesta 58, Zagreb
Interni kod: SciA-NYX-2400042

NYXOID® mundi**pharma**

Nyxoid® je registrirani zaštitni znak Mundipharma Corporation Limited.
Datum izrade: travanj 2024.

Kartica s informacija za bolesnika / skrbnika

NYXOID®
naloxone



Ovaj vodič predstavlja edukacijski materijal koji je obavezan kao uvjet za stavljanje lijeka Nyxoid® u promet, u cilju dodatne minimizacije važnih odabranih rizika.

Bez promidžbenog sadržaja.

Informacije navedene u ovom edukacijskom materijalu ne zamjenjuju one navedene u uputi o lijeku koja je priložena svakom pakiranju ovog lijeka. Za potpune informacije prije primjene lijeka pročitajte uputu o lijeku (dostupna u svakom pakiranju lijeka i na www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova).

Ovaj edukacijski materijal možete pronaći na internetskim stranicama Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) u dijelu Farmakovigilancija/Mjere minimizacije rizika




Što učiniti: korak po korak

1 Utvrdite ima li znakova predoziranja

- **Oprezno pristupite osobi.** Provjerite ima li u blizini opasnih predmeta, kao što je pribor za injiciranje.
- **Provjerite odgovara li osoba,** kako biste vidjeli je li osoba pri svijesti. Možete:
 - viknuti njeno ime
 - blago je protresti za ramena
 - glasno joj govoriti u uho
 - protrljati prsnu kost (sternum)
 - uštipnuti je za uho ili ležište nokta na prstu ruke
- **Provjerite dišne puteve i disanje.**
 - **Uklonite iz usta i nosa sve strane stvari**
 - 10 sekundi **provjeravajte disanje** – Pomiču li se prsa? Čujete li zvuk disanja? Osjećate li dah na obrazu?
- **Provjerite ima li znakova predoziranja,** kao što su:
 - izostanak reakcije na dodir ili zvukove
 - sporo, neravnomjerno disanje ili izostanak disanja
 - hrkanje, dahtanje ili gutanje zraka
 - plavi ili ljubičasti nokti prstiju ruku ili usne

2 Pozovite hitnu pomoć

Uvijek odmah nazovite hitnu pomoć, čak i ako se osoba probudi.




! Lijek Nyxoid® nije zamjena za hitnu medicinsku pomoć ni mjere osnovnog održavanja života (kao što je kardiopulmonalno oživljavanje)

- Ako je moguće, stavite telefon na zvučnik kako bi Vam ruke bile slobodne.
- **Dajte hitnoj službi što više informacija,** uključujući:
 - točnu lokaciju i poštanski broj (ako ih znate)
 - što mislite da je osoba možda uzela
 - je li osoba pri svijesti i diše li
 - da planirate primijeniti Nyxoid® sprej za nos

3 Primijenite jedan sprej lijeka Nyxoid®


Svaki sprej za nos sadrži samo jednu dozu



A
Odljepite stražnju stranu spremnika lijeka Nyxoid. Izvadite sprej za nos i stavite ga nadohvat ruke.




B
Polegnite osobu na leđa. Poduprite joj potiljak i zabacite glavu unazad. Uklonite iz nosa sve strane stvari.



C
Držite sprej kako je prikazano – kažiprst i srednji prst položite svaki s jedne strane mlaznice, a palac namjestite na klip.

! Nemojte pritiskati sprej radi pripreme ili probe prije upotrebe.



D
Nježno umetnite mlaznicu spreja u jednu nosnicu. Čvrsto pritisnite klip sve dok ne čujete klik, što je znak da je doza primijenjena. Izvadite mlaznicu spreja iz nosnice. Po mogućnosti zapamtite u koju ste nosnicu primijenili lijek.

4 Položite osobu u bočni položaj



A
Postavite bližu ruku pod pravim kutom u odnosu na tijelo i savijte je.



B
Prebacite drugu ruku preko prsnog koša. Položite nadlanicu uz obraz



C
Uхватite udaljeniju nogu odmah iznad koljena. Podignite koljeno. Okrenite osobu prema sebi i postavite je na bok

Poduprite glavu, tako da nadlanica ostane ispod obraza



D
Konačni položaj: Šaka podupire glavu

Gornja noga savijena je u kuku i koljenu

5 Pratite stanje osobe dok ne stigne pomoć

- **Ostanite uz osobu.** Pratite poboljšava li se disanje te reagira li na zvukove i dodir.
- Ako je osoba bez svijesti i ne diše normalno, primijenite mjere osnovnog održavanja života (kao što je oživljavanje), ako ste obučeni za to*.
- Budite na oprezu – čak i ako se osoba probudi, može ponovno izgubiti svijest i prestati disati.

6 Osoba ne reagira? Primijenite drugu dozu

- Ako nema poboljšanja **nakon 2-3 minute** ili ako se simptomi predoziranja vrate: **primijenite novi sprej lijeka Nyxoid® u drugu nosnicu.**

To možete učiniti dok je osoba u bočnom položaju

7 Pobrinite se za vlastitu sigurnost

- Ako je osoba ovisna o opioidima, lijek Nyxoid® može izazvati akutne simptome ustezanja. Simptomi mogu uključivati:
 - bolove i grčeve po tijelu
 - povraćanje, mučninu, proljev
 - vrućicu, curenje iz nosa ili kihanje
 - znojenje, drhtanje ili groznicu
 - nervozu ili razdražljivost

Neke osobe mogu se ponašati agresivno kad se počnu buditi.

! Pobrinite se za vlastitu sigurnost.

8 Kad stigne hitna pomoć

- **Odmah im recite što se dogodilo i da ste osobi primijenili lijek Nyxoid®.** Dajte im sve upotrijebljene spremnike Nyxoid spreja za nos.

Zbrinjavanje upotrijebljenih sprejeva za nos

Ako zaboravite dati upotrijebljene sprejeve djelatnicima hitne pomoći, dajte ih zdravstvenom radniku ili ljekarniku i dogovorite nabavu novog pakiranja. Nikada nemojte bacati sprejeve u otpadne vode ili kućni otpad.

Za više informacija o obuci za pružanje mjera osnovnog održavanja života posjetite stranicu: <http://www.hdhm.com.hr/>