

KARTICA S UPOZORENJIMA ZA BOLESNIKA

Delianda

filmom obložene tablete
edoksaban



XXXX

- ♦ Molimo Vas da uvijek nosite ovu karticu sa sobom.
- ♦ Pokažite je liječniku, ljekarniku, kirurgu ili zubaru prije svakog liječenja ili zahvata.



INFORMACIJE ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE

- ♦ Delianda je oralni antikoagulans, inhibitor faktora Xa.
- ♦ Kad je potreban invazivni postupak, primjenu lijeka Delianda treba prekinuti najmanje 24 sata prije i primijeniti odgovarajući oprez.
- ♦ Delianda može povećati rizik od krvarenja. U slučaju klinički značajnog krvarenja, odmah obustavite liječenje.
- ♦ Testovi koagulacije kao što su međunarodni normalizirani omjer (INR), protrombinsko vrijeme (PV) ili aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme (aPTV) nisu korisne mjere učinka lijeka Delianda. Međutim,

kalibrirani test za određivanje anti-faktora Xa može dati korisnu informaciju kod donošenja kliničke odluke.

Molimo da pročitate Sažetak opisa svojstava lijeka za dodatne informacije.

O LIJEČENJU

Propisana Vam je Delianda, antikoagulantni lijek, koji razrjeđuje krv i pomaže u sprječavanju nastanka krvnih ugrušaka. Važno je da uzimate ovaj lijek točno prema uputama liječnika.

- ♦ Ako propustite dozu, odmah je uzmite i zatim nastavite sljedećeg dana prema uobičajenom rasporedu – nemojte istog dana uzeti dvostruko veću dozu od propisane.
- ♦ Nemojte početi uzimati nikakve druge lijekove (uključujući one u slobodnoj prodaji) a da se prethodno niste posavjetovali s liječnikom.
- ♦ Nemojte prestati uzimati lijek Delianda a da se prethodno niste posavjetovali s liječnikom jer Vam to može povećati rizik od nastanka krvnog ugruška.

- ♦ Molimo da pročitate Uputu o lijeku koju možete pronaći u svakom pakiranju lijeka Delianda.

KADA ZATRAŽITI SAVJET LIJEČNIKA

RIZIK OD KRVARENJA

Uzimanje antikoagulantnog lijeka kao što je Delianda može Vam povećati rizik od krvarenja. Stoga je važno da budete upoznati s mogućim znakovima i simptomima krvarenja i da se **odmah** obratite svom liječniku ako Vam se pojavi nešto od sljedećeg:

- ♦ modrice ili potkožno krvarenje
- ♦ krv u mokraći
- ♦ iskašljavanje krvi
- ♦ povraćanje krvi ili sadržaja koji izgleda kao mljevena kava
- ♦ krvarenje iz nosa ili posjekotine kojima treba puno vremena da prestanu krvariti
- ♦ stolica boje katrana
- ♦ omaglica ili iznenadna glavobolja



- ♦ neobjašnjivi umor
- ♦ nenormalno krvarenje iz rodnice, uključujući jaču ili dugotrajniju menstruaciju

Molimo da se obratite svom liječniku ako osjetite ikakve neobične simptome.

INFORMACIJE O BOLESNIKU

Ime bolesnika: _____

Datum rođenja: _____

U hitnom slučaju, molimo da se obratite: _____

Ime: _____

Broj telefona: _____

INFORMACIJE O LIJEČENJU

(Ispunjava liječnik)

Delianda je propisana jedanput na dan u dozi od : _____ mg

Početak liječenja: / (mm/gg)

Krvna grupa: _____

Drugi lijekovi/bolesti: _____

INFORMACIJE O LIJEČNIKU KOJI PROPISUJE LIJEK

Za dodatne informacije ili u hitnom slučaju, obratite se:

Ime liječnika: _____

Telefonski broj, žig ordinacije: _____

Potpis liječnika: _____