

## KARTICA S UPOZORENJIMA ZA BOLESNIKA

### KARTICA S UPOZORENJIMA ZA BOLESNIKA

#### **Edoksaban Genericon**

filmom obložene tablete

#### **edoksaban**

Molimo Vas da uvijek nosite ovu karticu sa sobom.

Pokažite je liječniku, ljekarniku, kirurgu ili zubaru prije svakog liječenja ili zahvata.

### INFORMACIJE O BOLESNIKU

Ime bolesnika:

Datum rođenja:

U hitnom slučaju, molimo da se obratite:

Ime:

Broj telefona:

### INFORMACIJE O LIJEČENJU

(Ispunjava liječnik)

Edoksaban Genericon je propisan jedanput na dan u dozi od: mg

Početak liječenja: / (mm/gg)

Krvna grupa:

Drugi lijekovi/bolesti:

### INFORMACIJE O LIJEČNIKU KOJI PROPISUJE LIJEK

Za dodatne informacije ili u hitnom slučaju, obratite se:

Ime liječnika:

Telefonski broj, žig ordinacije:

Potpis liječnika:

## INFORMACIJE ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE

- Edoksaban Genericon je oralni antikoagulans, inhibitor faktora Xa.
- Kad je potreban invazivni postupak, primjenu lijeka Edoksaban Genericon treba prekinuti najmanje 24 sata prije i primijeniti odgovarajući oprez.
- Edoksaban Genericon može povećati rizik od krvarenja. U slučaju klinički značajnog krvarenja, odmah obustavite liječenje.
- Testovi koagulacije kao što su međunarodni normalizirani omjer (INR), protrombinsko vrijeme (PV) ili aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme (aPTV) nisu korisne mjere učinka lijeka Edoksaban Genericon. Međutim, kalibrirani test za određivanje anti-faktora Xa može dati korisnu informaciju kod donošenja kliničke odluke.

Molimo da pročitate Sažetak opisa svojstava lijeka za dodatne informacije.

[MAH LOGO]

## O LIJEČENJU

Propisan Vam je Edoksaban Genericon, antikoagulantni lijek, koji razrjeđuje krv i pomaže u sprječavanju nastanka krvnih ugrušaka. Važno je da uzimate ovaj lijek točno prema uputama liječnika.

- Ako propustite dozu, odmah je uzmite i zatim nastavite sljedećeg dana prema uobičajenom rasporedu – nemojte istog dana uzeti dvostruko veću dozu od propisane.
- Nemojte početi uzimati nikakve druge lijekove (uključujući one u slobodnoj prodaji), a da se prethodno niste posavjetovali s liječnikom.
- Nemojte prestati uzimati Edoksaban Genericon, a da se prethodno niste posavjetovali s liječnikom jer Vamto može povećati rizik od nastanka krvnog ugruška.
- Molimo da pročitate Uputu o lijeku koju možete pronaći u svakom pakiranju lijeka Edoksaban Genericon.

## KADA ZATRAŽITI SAVJET LIJEČNIKA

### RIZIK OD KRVARENJA

Uzimanje antikoagulantnog lijeka kao što je Edoksaban Genericon može Vam povećati rizik od krvarenja. Stoga je važno da budete upoznati s mogućim znakovima i simptomima krvarenja i da se **odmah** obratite svom liječniku ako Vam se pojavi nešto od sljedećeg:

- modrice ili potkožno krvarenje
- krv u mokraći
- iskašljavanje krvi
- povraćanje krvi ili sadržaja koji izgleda kao mljevena kava
- krvarenje iz nosa ili posjekotine kojima treba puno vremena da prestanu
- stolica boje katrana
- omaglica ili iznenadna glavobolja
- neobjašnjivi umor
- nenormalno krvarenje iz rodnice, uključujući jaču ili dugotrajniju menstruaciju

Molimo da se obratite svom liječniku ako osjetite ikakve neobične simptome.