

INFORMACIJE O BOLESNIKU

Ime bolesnika: _____

Datum rođenja: _____

U hitnom slučaju, molimo da se обратите:

Ime: _____

Broj telefona: _____

INFORMACIJE O LIJEČENJU

(Ispunjava liječnik)

Setiapo je propisan jedanput na dan u dozi od: mg

15 mg 30 mg 60 mg

Početak liječenja: / (mm/gg)

Krvna grupa: _____

Drugi lijekovi/bolesti:
_____**KARTICA S UPOZORENJIMA
ZA BOLESNIKA****Setiapo**

filmom obložene tablete

edoksaban

Molimo Vas da uvijek nosite ovu karticu sa sobom.

Pokažite je liječniku, ljekarniku, kirurgu ili zubaru prije svakog liječenja ili zahvata.

ZENTIVA**INFORMACIJE O LIJEČNIKU KOJI
PROPIŠUJE LIJEK**

Za dodatne informacije ili u hitnom

slučaju, обратите se:

Ime liječnika: _____

Telefonski broj, žig ordinacije:

Potpis liječnika:

**KARTICA S UPOZORENJIMA
ZA BOLESNIKA****Setiapo**filmom obložene tablete
edoksaban

Molimo Vas da uvijek nosite ovu karticu sa sobom.

Pokažite je liječniku, ljekarniku, kirurgu ili zubaru prije svakog liječenja ili zahvata.

**INFORMACIJE ZA ZDRAVSTVENE
RADNIKE**

- Setiapo je oralni antikoagulans, inhibitor faktora Xa.
- Kad je potreban invazivni postupak, primjenju lijeka Setiapo treba prekinuti najmanje 24 sata prije i primijeniti odgovarajući oprez.
- Setiapo može povećati rizik od krvarenja.
U slučaju klinički značajnog krvarenja, odmah obustavite liječenje.
- 1 • Testovi koagulacije kao što su

međunarodni normalizirani omjer (INR), protrombinsko vrijeme (PV) ili aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme (aPTV) nisu korisne mjere učinka lijeka Setiapo. Međutim, kalibrirani test za određivanje anti-faktora Xa može dati korisnu informaciju kod donošenja kliničke odluke.

Molimo da pročitate Sažetak opisa svojstava lijeka za dodatne informacije.

O LIJEČENJU

Propisan Vam je Setiapo, antikoagulantni lijek, koji razrjeđuje krv i pomaže u sprječavanju nastanka krvnih ugrušaka.

2 od nastanka krvnog ugruška.
• Molimo da pročitate Uputu o lijeku koju možete pronaći u svakom pakiranju lijeka Setiapo.

KADA ZATRAŽITI SAVJET LIJEČNIKA**RIZIK OD KRVARENJA**

Uzimanje antikoagulantnog lijeka kao što je Setiapo može Vam povećati rizik od krvarenja. Stoga je važno da budete upoznati s mogućim znakovima i simptomima krvarenja i da se odmah obratite svom liječniku ako Vam se pojavi nešto od sljedećeg:

- modrice ili potkožno krvarenje

Važno je da uzimate ovaj lijek točno prema uputama liječnika.

- Ako propustite dozu, odmah je uzmite i zatim nastavite sljedećeg dana prema uobičajenom rasporedu – nemojte istog dana uzeti dvostruko veću dozu od propisane.
- Nemojte početi uzimati nikakve druge lijekove (uključujući one u slobodnoj prodaji) a da se prethodno niste posavjetovali s liječnikom.
- Nemojte prestati uzimati Setiapo, a da se prethodno niste posavjetovali s liječnikom jer Vam to može povećati rizik

- krv u mokrašu
 - iskašljavanje krvi
 - povraćanje krvi ili sadržaja koji izgleda kao mljevena kava
 - krvarenje iz nosa ili posjekotine kojima treba puno vremena da prestanu
 - stolica boje katrana
 - omaglica ili iznenadna glavobolja
 - neobični umor
 - nenormalno krvarenje iz rodnice, uključujući jaču ili dugotrajniju menstruaciju.
- Molimo da se obratite svom liječniku ako osjetite ikakve neobične simptome.

3