


LIJEKOVI S NOVIM DJELATNIM TVARIMA

LIJEKOVI ODOBRENI U REPUBLICI HRVATSKOJ OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2014. GODINE KOJI SADRŽAVAJU NOVU DJELATNU TVAR (DJELATNU TVAR PRVI PUTA ODOBRENU U REPUBLICI HRVATSKOJ)

Ovdje možete pronaći lijekove odobrene u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine koji sadrže novu djelatnu tvar odnosno djelatnu tvar koja je po prvi puta odobrena u Republici Hrvatskoj. Popis ne uključuje nove kombinacije djelatnih tvari.

1. Djelatna tvar: bifonazolum (bifonazol)



i enantiomer

Naziv lijeka: Canespor 10 mg/g krema

Datum rješenja: 06. lipnja 2013.


Terapijske indikacije:

Canespor krema koristi se za liječenje kožnih mikoza uzrokovanih dermatofitima, kvasnicama, plijesnima i drugim gljivicama (npr. *Malassezia furfur*) te infekcije bakterijom *Corynebacterium minutissimum*: *tinea pedum*, *tinea manuum*, *tinea corporis*, *tinea inguinalis*, *pityriasis versicolor*, površinskih kandidoza i eritrazme

Detaljne informacije o lijeku (uključujući Uputu o lijeku i Sažetak opisa svojstava lijeka) možete pronaći na internetskim stranicama HALMED-a pod sljedećim linkom:

<http://www.halmed.hr/?ln=hr&w=lijekovi&d=opsirnije&id=10404>

2. Djelatna tvar: nitrogenii oxidum (dušikov (II) oksid)



Naziv lijeka: Dušikov (II) oksid Messer 800 ppm (V/V) medicinski plin, stlačen

Datum rješenja: 13. lipnja 2014.

Terapijske indikacije:


Dušikov (II) oksid Messer, zajedno s potporom disanju i drugim odgovarajućim djelatnim tvarima, indiciran je:

- za liječenje novorođenčadi gestacijske dobi ≥ 34 tjedna s hipoksičnim respiratornim zatajenjem povezanim s klinički ili ehokardiografski dokazanom plućnom hipertenzijom, kako bi se poboljšala oksigenacija i smanjila potreba za izvantjelesnom membranskom oksigenacijom
- kao dio liječenja perioperativne i postoperativne plućne hipertenzije povezane s operacijom srca u odraslih i novorođenčadi, dojenčadi i male djece, djece i adolescenata u dobi od 0 do 17 godina, kako bi se selektivno smanjio plućni arterijski tlak i poboljšala funkcija desne klijetke te oksigenacija

Detaljne informacije o lijeku (uključujući Uputu o lijeku i Sažetak opisa svojstava lijeka) možete pronaći na internetskim stranicama HALMED-a pod sljedećim linkom:

<http://www.halmed.hr/?ln=hr&w=lijekovi&d=opsirnije&id=10665>

3. Djelatna tvar: ofloxacinum (ofloksacin)



i enantiomer

Naziv lijeka: Uniflox 3 mg/ml kapi za oko, otopina

Datum rješenja: 27. lipnja 2013.


Terapijske indikacije:

Uniflox kapi za oko koriste se u odraslih i djece za topikalno liječenje bakterijskih upala prednjeg očnog segmenta (kao što su infektivni konjunktivitis i keratokonjunktivitis) uzrokovanih patogenima osjetljivim na ofloksacin. Sigurnost i djelotvornost u liječenju neonatalnog konjunktivitisa nije potvrđena

Detaljne informacije o lijeku (uključujući Uputu o lijeku i Sažetak opisa svojstava lijeka) možete pronaći na internetskim stranicama HALMED-a pod sljedećim linkom:

<http://www.halmed.hr/?ln=hr&w=lijekovi&d=opsirnije&id=10507>

4. Djelatna tvar: tapentadolum (tapentadol)



Naziv lijeka: Palexia 50 mg filmom obložene tablete
Palexia 75 mg filmom obložene tablete
Palexia 100 mg filmom obložene tablete
Palexia retard 25 mg tablete s produljenim oslobađanjem
Palexia retard 50 mg tablete s produljenim oslobađanjem
Palexia retard 100 mg tablete s produljenim oslobađanjem
Palexia retard 150 mg tablete s produljenim oslobađanjem
Palexia retard 200 mg tablete s produljenim oslobađanjem
Palexia retard 250 mg tablete s produljenim oslobađanjem
Palexia 4 mg/ml oralna otopina
Palexia 20 mg/ml oralna otopina

Datum rješenja: 30. lipnja 2014.

Terapijske indikacije:

Palexia filmom obložene tablete i Palexia oralna otopina indicirane su za ublažavanje umjerene do jake akutne boli u odraslih, koja se samo s opioidnim analgeticima može odgovarajuće ublažiti.

Palexia retard tablete s produljenim oslobađanjem indicirane su za ublažavanje teške kronične boli u odraslih koja se samo s opioidnim analgeticima može odgovarajuće ublažiti.

Detaljne informacije o lijeku (uključujući Uputu o lijeku i Sažetak opisa svojstava lijeka) možete pronaći na internetskim stranicama HALMED-a pod sljedećim linkovima:

<http://www.halmed.hr/?ln=hr&w=lijekovi&d=opsirnije&id=10666>

<http://www.halmed.hr/?ln=hr&w=lijekovi&d=opsirnije&id=10667>

<http://www.halmed.hr/?ln=hr&w=lijekovi&d=opsirnije&id=10668>

<http://www.halmed.hr/?ln=hr&w=lijekovi&d=opsirnije&id=10671>

<http://www.halmed.hr/?ln=hr&w=lijekovi&d=opsirnije&id=10672>

<http://www.halmed.hr/?ln=hr&w=lijekovi&d=opsirnije&id=10673>

<http://www.halmed.hr/?ln=hr&w=lijekovi&d=opsirnije&id=10674>

<http://www.halmed.hr/?ln=hr&w=lijekovi&d=opsirnije&id=10675>

<http://www.halmed.hr/?ln=hr&w=lijekovi&d=opsirnije&id=10676>

<http://www.halmed.hr/?ln=hr&w=lijekovi&d=opsirnije&id=10669>

<http://www.halmed.hr/?ln=hr&w=lijekovi&d=opsirnije&id=10670>