

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Alprazolam Krka 0,25 mg tablete

Alprazolam Krka 0,5 mg tablete

Alprazolam Krka 1 mg tablete

Alprazolam Krka 2 mg tablete

alprazolam

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

1. Što je Alprazolam Krka i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Alprazolam Krka
3. Kako uzimati Alprazolam Krka
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Alprazolam Krka
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Alprazolam Krka i za što se koristi

Alprazolam Krka sadrži djelatnu tvar alprazolam. On pripada skupini lijekova nazvanih benzodiazepini (lijekovi za ublažavanje tjeskobe).

Alprazolam Krka se primjenjuje u odraslih osoba za liječenje simptoma tjeskobe koji su teški, onesposobljavajući ili bolesniku uzrokuju veliku duševnu bol. Ovaj lijek je namijenjen samo za kratkotrajnu primjenu.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Alprazolam Krka

Nemojte uzimati Alprazolam Krka

- ako ste alergični na alprazolam ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
- ako bolujete od mijastenije gravis (uzrokuje slabost mišića).
- ako imate ozbiljnih poteškoća s disanjem (npr. kronični bronhitis ili emfizem).
- ako bolujete od apneje u snu (pauze u disanju koje nastaju tijekom spavanja).
- ako imate teško oštećenje jetre.
- ako imate akutno trovanje alkoholom ili drugim lijekovima koji utječu na središnji živčani sustav.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Alprazolam Krka:

- ako imate oštećenu funkciju bubrega.
- ako imate oštećenu funkciju jetre.
- ako ste općeg lošeg stanja.
- ako uzimate druge lijekove za liječenje psihičkih bolesti.
- ako uzimate lijekove protiv bolova koji sadrže dekstropropoksifen. Ta kombinacije mora izbjegavati jer može uzrokovati poteškoće s disanjem.

H A L M E D

27 - 10 - 2022

ODOBRENO

- ako ste se osjećali tako depresivno da ste razmišljali o oduzimanju vlastitog života.
- ako ste u prošlosti zlorabili opojne droge ili alkohol ili Vam je bilo teško prestati uzimati lijekove, piti alkohol ili uzimati opojne droge (vidi također dio 4. „Moguće nuspojave“). Vaš će Vam liječnik možda htjeti pružiti posebnu pomoć prilikom prestanka uzimanja tih tableta.
- ako ste već prije uzimali lijekove za smirenje, jer Vam se tijelo brzo može priviknuti na ovaj tip lijekova na način da Vam više neće pomoći.
- ako ste osoba starije životne dobi, benzodiazepine i slične lijekove treba koristiti s oprezom zbog rizika od sedacije i/ili slabosti u kostima i mišićima koji mogu izazvati padove, često s ozbiljnim posljedicama u ovoj populaciji.
- ako primijetite da učinak ovih tableta slabi nakon što ste koristili lijek nekoliko tjedana (tolerancija).

Ovisnost

Primjena lijeka Alprazolam Krka tableta može dovesti do fizičke i psihičke ovisnosti o lijeku. Ako primijetite da imate poteškoća s prestankom uzimanja ovog lijeka, možda ste psihički ovisni o njemu. Fizička ovisnost znači da se simptomi ustezanja javljaju kada se liječenje ovim lijekom iznenada prekine. Rizik od ovisnosti se povećava s dozom i trajanjem liječenja. Kako bi se smanjili rizici, doza mora biti što niža, a trajanje liječenja što je moguće kraće. Slijedite preporuke liječnika o dozi. Rizik je veći u bolesnika koji zlorabe ili su zlorabili alkohol i opojne droge (vidjeti također dio 3. „Ako prestanete uzimati Alprazolam Krka“).

Zloupotrebaba

Zloupotrebaba je poznat rizik za ovaj lijek (vidjeti također dio 4 „Moguće nuspojave“). Zloupotrebaba ovog lijeka može dovesti do predoziranja i smrti. Uvijek slijedite preporuke liječnika o dozi. Ovaj lijek može biti poželjan za osobe koje zloupotrebljavaju lijekove na recept i treba ga držati izvan dohvata drugih osoba.

Učinci na pamćenje

Tijekom liječenja lijekom Alprazolam Krka može doći do poremećaja pamćenja. Problemi se obično javljaju nekoliko sati nakon uzimanja lijeka. Obratite se svom liječniku ako primijetite ovakav simptom.

Učinci na raspoloženje

Liječenje lijekom Alprazolam Krka može povećati rizik od pojave epizoda hipomanije ili manije u bolesnika s depresijom. Odmah se obratite svom liječniku ako se razviju simptomi manije ili hipomanije.

Ako patite od depresije moguća je pojava misli o samoozljeđivanju ili samoubojstvu tijekom primjene lijeka Alprazolam Krka.

Posavjetujte se sa svojim liječnikom prije početka liječenja lijekom Alprazolam Krka.

Ako je liječenje lijekom Alprazolam Krka neophodno, a Vi imate depresiju ili ste prije imali suicidalne misli te misli o samoozljeđivanju ili samoubojstvu, Vaš liječnik će pažljivo pratiti Vaše liječenje. Odmah se javite svom liječniku ili otidite u najbližu bolnicu ako Vam se pojave misli o samoozljeđivanju ili samoubojstvu.

Djeca i adolescenti

Alprazolam se ne preporučuje u djece i adolescenata u dobi ispod 18 godina.

Drugi lijekovi i Alprazolam Krka

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, osobito lijekove nabrojane ispod, jer se učinak lijeka Alprazolam Krka ili drugog lijeka može promijeniti kada se uzimaju u isto vrijeme:

- opioidi (jaki lijekovi protiv boli, lijekovi za nadomjesnu terapiju i neki lijekovi protiv kašlja). To povećava rizik od omamljenosti, poteškoća u disanju (depresije disanja), kome te može biti opasno po život. Zbog toga se istodobna primjena treba uzeti u obzir samo ako druge

mogućnosti liječenja nisu moguće. Međutim, ako Vaš liječnik propiše Alprazolam Krka zajedno s opioidima, mora ograničiti dozu i trajanje istodobnog liječenja. Obavijestite liječnika o svim opioidnim lijekovima koje uzimate i pomno pratite preporuke liječnika o doziranju. Bilo bi korisno obavijestiti prijatelje ili rodbinu da budu svjesni gore navedenih znakova i simptoma.

- Obratite se liječniku ako se pojave simptomi kao što su omamljenost ili poteškoće s disanjem.
- bilo koje druge lijekove za liječenje tjeskobe ili depresije ili nesаницe (npr. nefazodon, fluvoksamin, fluoksetin).
- neke snažne lijekove protiv boli (npr. morfin, kodein, dekstropropoksifen).
- antipsihotike koji se koriste za liječenje psihičkih bolesti kao što je shizofrenija (antipsihotici uključujući klopazin).
- lijekove za poremećaje spavanja (tablete za spavanje).
- lijekove za liječenje epilepsije (npr. karbamazepin).
- antihistaminike za liječenje alergija.
- lijekove za liječenje gljivičnih infekcija (npr. ketokonazol, itrakonazol, flukonazol, vorikonazol).
- lijekove za kontracepciju koji se uzimaju kroz usta.
- određene antibiotike (npr. eritromicin, klaritromicin, telitromicin).
- cimetidin (za liječenje čireva na želucu).
- diltiazem (koristi se za liječenje angine i visokog krvnog tlaka).
- digoksin (koristi se za liječenje različitih stanja srca).
- ritonavir ili druge slične lijekove koji se koriste za liječenje HIV infekcije.
- rifampicin, lijek koji se koristi za liječenje tuberkuloze.
- lijekove za liječenje astme i bronhitisa (npr. teofilin).
- lijekove za opuštanje mišića (kad se koriste u kombinaciji s alprazolamom mogu povećati učinak na opuštanje mišića, čime se povećava rizik od pada).
- gospinu travu (biljni pripravak).

Ako planirate operativni zahvat pod općom anestezijom, obavijestite svog liječnika ili anesteziologa da uzimate Alprazolam Krka.

Alprazolam Krka s hranom, pićem i alkoholom

Možete uzimati tablete s hranom ili bez nje. Progutajte tabletu s malom količinom tekućine.

Važno je da ne uzimate alkohol dok uzimate Alprazolam Krka, jer alkohol povećava neželjene učinke ovog lijeka.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća

Morate odmah reći svom liječniku ako ste trudni ili planirate imati dijete. Iskustva u ljudi ukazuju da djelatna tvar alprazolam može štetiti nerođenom djetetu (povećan rizik od malformacije kao što je rascjep nepca). Nemojte uzimati Alprazolam Krka ako ste trudni ili planirate trudnoću, osim ako Vam liječnik nije drugačije propisao. Vaš liječnik će odlučiti da li korist primjene lijeka nadmašuje rizike primjene na nerođeno dijete.

Ako koristite Alprazolam Krka sve do poroda, obavijestite svog liječnika jer novorođenče može imati neke simptome odvikavanja nakon rođenja.

Dojenje

Nemojte dojiti dok uzimate Alprazolam Krka jer se ovaj lijek izlučuje u majčino mlijeko.

Upravljanje vozilima i strojevima

Alprazolam Krka može uzrokovati nuspojave kao što su omamljenost, gubitak pamćenja, mišićnu slabost i oslabljenu koncentraciju. Stoga Vaše sposobnosti mogu biti umanjene, posebno ako ste nedovoljno spavali.

Ti se učinci mogu pojačati ako pijete alkohol. Nemojte voziti niti upravljati strojevima za vrijeme

H A L M E D

27 - 10 - 2022

ODOBRENO

liječenja lijekom Alprazolam Krka.

Alprazolam Krka sadrži laktozu

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

3. Kako uzimati Alprazolam Krka

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Vaš će liječnik odrediti najprikladniju dozu lijeka Alprazolam Krka za Vas, na temelju znakova bolesti i tolerancije. Poželjno je da liječenje započne, nadzire i završi isti liječnik. Liječenje obično počinje nižom dozom koja se po potrebi postupno povećava, u skladu s liječničkim receptom. Potrebno je 1-2 sata da tablete počnu djelovati. Ako dobijete teške nuspojave nakon prve doze, Vaša se doza mora smanjiti. Nemojte mijenjati doziranje bez savjetovanja s liječnikom.

Liječenje anksioznosti (tjeskobe)

Preporučena početna doza: uzmite 0,25 – 0,5 mg tri puta na dan.

Ako je potrebno, liječnik Vam može povećati dozu.

Preporučena doza održavanja je 0,5 mg do 3 mg na dan, podijeljeno u nekoliko doza.

Starije osobe i bolesnici osjetljivi na sedativne učinke alprazolama

Početna doza je 0,25 mg dva ili tri puta na dan u liječenju anksioznih poremećaja.

Vaš liječnik može prilagoditi dozu prema potrebi.

Trajanje liječenja

Rizik od ovisnosti i zlorabe može se povećati s dozom i trajanjem liječenja. Liječnik će stoga propisati najmanju moguću učinkovitu dozu i trajanje liječenja, te će često ponovno procjenjivati potrebu za nastavkom liječenja (pogledajte dio 2. „Upozorenja i mjere opreza“).

Maksimalno trajanje liječenja ne smije biti dulje od 2-4 tjedna. Ne preporučuje se dugotrajno liječenje. Može doći do smanjenog učinka lijeka ako se koristi dulje od nekoliko tjedana.

Urez služi samo kako bi se olakšalo lomljenje tablete ako imate poteškoće s gutanjem cijele tablete.

Primjena u djece i adolescenata

Sigurnost i djelotvornost nisu utvrđene za bolesnike mlađe od 18 godina. Stoga se uporaba alprazolama ne preporučuje.

Ako uzmete više lijeka Alprazolam Krka nego što ste trebali

Ako uzmete više tableta nego što je propisao Vaš liječnik (ili ako netko drugi uzima Vaše tablete), potražite liječničku pomoć ili idite u najbližu bolnicu. Uzmite kutiju ovog lijeka sa sobom.

Simptomi predoziranja mogu uključivati:

- omaglicu,
- pospanost,
- probleme s disanjem,
- smetenost,
- nesvjesticu,
- slabost mišića,
- poteškoće u koordinaciji pokreta tijela (ataksija),
- osjećaj hladnoće,
- pad krvnog tlaka,
- reakcije poput agresivnosti, halucinacije, uznemirenost i nemir.

H A L M E D

27 - 10 - 2022

ODOBRENO

Ako ste zaboravili uzeti Alprazolam Krka

Ako ste zaboravili uzeti dozu, uzmite ju čim se sjetite, osim ako nije već vrijeme za sljedeću dozu. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Uzmite svoju sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme.

Ako prestanete uzimati Alprazolam Krka

Uvijek se savjetujte sa svojim liječnikom prije nego što prestanete uzimati lijek Alprazolam Krka jer se doza treba postupno smanjivati. U slučaju naglog prekida liječenja, mogu se javiti simptomi ustezanja, kao što su glavobolja, bolovi u mišićima, jaka tjeskoba, nemir, smetenost, razdražljivost i poremećaj spavanja. U težim slučajevima mogu se javiti sljedeći simptomi: promjena percepcije stvarnosti, promjena stanja svijesti (osjećaj odvojenosti od vlastitog tijela), ukočenost i trnci u rukama i nogama, preosjetljivost na svjetlo, buku i fizički kontakt, halucinacije ili epileptički napadi (konvulzije). Ovi se simptomi mogu pojaviti nekoliko dana nakon što ste prestali uzimati tablete. Kada se liječenje ovim lijekom prekine, simptomi koji su zahtijevali primjenu ovog lijeka mogu se vratiti s većim intenzitetom nego prije. Osim gore navedenih simptoma, može se javiti i promjena raspoloženja.

Stoga će Vaš liječnik postupno smanjivati dozu prilikom prekida liječenja. Smanjenje doze je prilagođeno individualnim potrebama i ovisi o nekoliko čimbenika (kao što je duljina trajanja liječenja i Vaša dnevna doza). Ako ste zabrinuti, Vaš liječnik će Vam reći više o tome.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Ako dobijete bilo koju od sljedećih nuspojava, odmah se obratite Vašem liječniku jer će Vam se liječenje morati prekinuti:

- iznenadno piskanje, poteškoće s gutanjem ili disanjem, oticanje očnih kapaka, lica ili usana, osip ili svrbež (osobito ako je zahvaćeno cijelo tijelo).

Ako dobijete bilo koji od sljedećih simptoma, što prije se obratite Vašem liječniku jer će možda biti potrebno promijeniti dozu lijeka ili liječenje:

- žuta boja kože i bjeloočnica (žutica).
- povremeno, liječenje ovim lijekom može uzrokovati ozbiljne učinke na ponašanje i psihijatrijske učinke – npr. uznemirenost, nemir, agresivnost, razdražljivost, nasilan bijes, lažna uvjerenja, noćne more i halucinacije ili drugo neprikladno ponašanje. Ove se reakcije češće javljaju u starijih osoba.
- depresija/depresivne misli.

Ostale moguće nuspojave koje se mogu javiti su:

Vrlo često: mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba

- depresija
- pospanost i omamljenost
- grčeviti ili nekontrolirani pokreti (ataksija)
- nemogućnost pamćenja podataka
- nerazgovjetan govor (dizartrija)
- omaglica, ošamućenost
- glavobolja
- zatvor
- suha usta
- umor
- razdražljivost

Često: mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba

- smanjen apetit
- smetenost
- dezorijentacija
- promjene spolnog nagona (smanjen libido, povećan libido)
- osjećaj nervoze ili anksioznosti (tjeskobe)
- nesanica (nemogućnost spavanja ili poremećaj spavanja)
- poremećaj ravnoteže i nestabilnost (slično osjećaju opijenosti) osobito tijekom dana
- poteškoće u koordinaciji
- gubitak budnosti ili koncentracije
- nemogućnost održavanja budnosti, osjećaj tromosti
- tresenje ili drhtanje
- zamućen vid
- mučnina
- kožna upala (dermatitis)
- seksualna disfunkcija
- promjene tjelesne težine

Manje često: mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba

- osjećaj ushićenja ili previše uzbuđenja (manija)
- halucinacije (vidna ili slušna priviđenja stvari koje ne postoje)
- osjećaj uznemirenosti ili ljutnje
- gubitak pamćenja (amnezija)
- povraćanje, proljev
- mišićna slabost
- nemogućnost kontroliranja mokrenja (inkontinencija)
- poremećaj menstrualnog ciklusa
- ovisnost o lijeku
- simptomi ustezanja lijeka

Nepoznato: učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka

- u žena, neredovite menstruacije ili proizvodnja previše prolaktina (hormon koji potiče proizvodnju mlijeka)
- povećan apetit
- gubitak apetita (anoreksija)
- hipomanija
- neprijateljsko ili agresivno ponašanje
- abnormalne misli
- hiperaktivnost
- neravnoteža žičanog sustava. Simptomi mogu uključivati: brzi otkucaji srca i nestabilan krvni tlak (osjećaj omaglice, ošamućenosti ili nesvjestice).
- uvijajući ili trzajni pokreti (distonija)
- probavne smetnje
- otežano gutanje
- upala jetre (hepatitis)
- poteškoće s funkcijom jetre (vidi se u krvnim testovima)
- žuta boja kože i bjeloočnica (žutica)
- teška alergijska reakcija koja uzrokuje oticanje lica ili grla
- kožna reakcija uzrokovana osjetljivošću na sunčevu svjetlost
- otežano mokrenje ili poteškoće s kontrolom mjehura
- oticanje gležnjeva, stopala ili prstiju
- povećan tlak u očima, što može utjecati na vid
- zlouporaba lijeka

Ranije uočena depresija može postati izraženija kod osjetljivih osoba.

Ovisnost i simptomi ustezanja

Moguće je postati ovisan o lijekovima kao što je Alprazolam Krka dok ih uzimate što povećava vjerojatnost dobivanja simptoma ustezanja kada prekinete s liječenjem.

Simptomi ustezanja su češći ako:

- iznenada prekinete liječenje
- uzimate visoke doze ovog lijeka
- uzimate ovaj lijek dulje vrijeme
- imate u povijesti bolesti zlouporabu alkohola ili lijekova.

To može uzrokovati učinke kao što su glavobolja, bolovi u mišićima, jake tjeskobe, napetosti, nemira, smetenost, promjene raspoloženja, poteškoće sa spavanjem i razdražljivost. U teškim slučajevima simptoma ustezanja možete dobiti i sljedeće simptome: osjećaj nestvarnosti ili odvojenosti, neuobičajena osjetljivost na zvuk, svjetlost ili fizički kontakt, obamrlost i trnci stopala i ruku, halucinacije (gledanje ili slušanje stvari koje ne postoje dok ste budni), tremor ili epileptički napadaji.

Obavijestite svog liječnika ako se simptomi ustezanja pogoršaju ili ne prestaju.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: [navedenog u Dodatku V](#). Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Alprazolam Krka

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji iza oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne čuvati na temperaturi iznad 30 °C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

Nikada nemojte nikakve lijekove baciti u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Alprazolam Krka sadrži

- Djelatna tvar je alprazolam. Jedna tableta sadrži 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg ili 2 mg alprazolama.
- Drugi sastojci 0,25 mg tableta su laktoza hidrat, kukuruzni škrob, krospovidon (vrsta A), povidon K 25, magnezijev stearat (E470b), polisorbat 80.
- Drugi sastojci 0,5 mg tableta su laktoza hidrat, kukuruzni škrob, krospovidon (vrsta A), povidon K 25, boja *carmine* (E120), magnezijev stearat (E470b), polisorbat 80.
- Drugi sastojci 1 mg tableta su laktoza hidrat, kukuruzni škrob, krospovidon (vrsta A), povidon K 25, boja *patent blue V* (E131), magnezijev stearat (E470b), polisorbat 80.
- Drugi sastojci 2 mg tableta su laktoza hidrat, kukuruzni škrob, krospovidon (vrsta A), povidon K 25, magnezijev stearat (E470b), polisorbat 80.
- Pogledajte dio 2: „Alprazolam Krka sadrži laktozu“.

Kako Alprazolam Krka izgleda i sadržaj pakiranja

- 0,25 mg tablete: bijele do gotovo bijele, okrugle, bikonveksne tablete s ukošenim rubovima. Tablete imaju urez na jednoj strani i utisnutu oznaku 0.25 na drugoj strani, promjera 7 mm. Urez služi samo kako bi se olakšalo lomljenje tablete radi lakšeg gutanja, a ne da bi se podijelila na jednake doze.

- 0,5 mg tablete: blijedo ružičaste, mramorirane, okrugle, bikonveksne tablete s ukošenim rubovima. Tablete imaju urez na jednoj strani i utisnutu oznaku 0.5 na drugoj strani, promjera 7 mm. Urez služi samo kako bi se olakšalo lomljenje tablete radi lakšeg gutanja, a ne da bi se podijelila na jednake doze.
- 1 mg tablete: blijedo zelenkasto plave do blijedo plave, mramorirane, okrugle, bikonveksne tablete s ukošenim rubovima. Tablete imaju urez na jednoj strani i utisnutu oznaku 1 na drugoj strani, promjera 7 mm. Urez služi samo kako bi se olakšalo lomljenje tablete radi lakšeg gutanja, a ne da bi se podijelila na jednake doze.
- 2 mg tablete: bijele do gotovo bijele, okrugle, bikonveksne tablete s ukošenim rubovima i urezom na obje strane. Tablete na obje strane imaju utisnutu oznaku 2 s jedne strane ureza, promjera 9 mm. Urez služi samo kako bi se olakšalo lomljenje tablete radi lakšeg gutanja, a ne da bi se podijelila na jednake doze.

Alprazolam Krka je dostupan u kutijama s 10, 20, 30, 50, 60 i 100 tableta u blisterima.

Alprazolam Krka je dostupan u kutijama s 10 x 1, 20 x 1, 30 x 1, 50 x 1, 60 x 1 i 100 x 1 tableta u perforiranim blisterima s jediničnom dozom.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Proizvođači

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Njemačka

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

KRKA - FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Telefon: 01 631 21 01

Ovaj lijek odobren je u državama članicama Europskog gospodarskog prostora pod sljedećim nazivima:

Država	Naziv lijeka
Hrvatska, Bugarska, Estonija, Španjolska	Alprazolam Krka
Danska, Švedska	Alprazolam Krka d.d.
Cipar, Portugal	Alprazolam TAD

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u kolovozu 2022.