

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Blocar Plus 2,5 mg/12,5 mg tablete

Blocar Plus 5 mg /25 mg tablete

ramipril/hidroklorotiazid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Blocar Plus i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Blocar Plus
3. Kako uzimati Blocar Plus
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Blocar Plus
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Blocar Plus i za što se koristi

Blocar Plus je kombinacija dvaju lijekova koji se zovu ramipril i hidroklorotiazid.

Ramipril pripada skupini lijekova zvanih „ACE inhibitori“ (engl. *Angiotensin Converting Enzyme* - angiotenzin konvertirajući enzim). Djeluje tako da:

- smanjuje stvaranje tvari koje povisuju krvni tlak u Vašem tijelu,
- čini Vaše krvne žile opuštenijima i širimima,
- olakšava Vašem srcu pumpanje krvi kroz tijelo.

Hidroklorotiazid pripada skupini lijekova koji se zovu „tiazidski diuretici“ ili „tablete za vodu“. Djeluje tako da povećava količinu mokraće (urina) koju izlučujete te na taj način snižava krvni tlak.

Blocar Plus se koristi za liječenje povišenog krvnog tlaka. Dvije djelatne tvari zajedno snižuju krvni tlak. Koriste se zajedno kad liječenje samo jednom od tih tvari nije bilo uspješno.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Blocar Plus

Nemojte uzimati Blocar Plus

- ako ste alergični (preosjetljivi) na ramipril, hidroklorotiazid ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.),
- ako ste alergični (preosjetljivi) na lijekove slične Blocar Plus-u (drugi ACE inhibitori ili lijekovi derivati sulfonamida),
Znaci alergijske reakcije mogu uključivati osip, probleme s gutanjem ili disanjem, oticanje usana, lica, grla ili jezika.

- ako ste ikad imali ozbiljnu alergijsku reakciju zvanu „angioedem“. Znaci te reakcije uključuju svrbež, koprivnjaču (urtikarija), crvene mrlje po rukama, stopalima i vratu, oticanje grla i jezika, oticanje oko očiju i usana, teškoće u disanju i gutanju.
- ako ste na dijalizi ili nekom drugi oblik filtracije krvi. Ovisno o aparatu koji se pri tom koristi, Blocar Plus možda nije pogodan za Vas.
- ako imate ozbiljnih problema s jetrom,
- ako imate abnormalne količine soli u krvi (kalcij, kalij, natrij),
- ako imate problema s bubrezima, pri čemu je smanjena opskrba bubrega krvlju (stenoza bubrežne arterije),
- tijekom **zadnjih 6 mjeseci trudnoće** (pogledajte dio „Trudnoća, dojenje i plodnost“),
- ako dojite (Pogledajte dio „Trudnoća, dojenje i plodnost“),
- ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje krvnog tlaka koji sadrži aliskiren.
- ako ste uzimali ili trenutno uzimate sakubitril/valsartan, koji se koristi za liječenje jedne vrste dugoročnog (kroničnog) zatajivanja srca u odraslih, jer je u tom slučaju povećan rizik od angioedema (naglo oticanje potkožnog tkiva na području kao što je vrat).

Nemojte uzimati Blocar Plus ako se išta od gore navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, razgovarajte s Vašim liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Blocar Plus:

- ako imate problema sa srcem, jetrom ili bubrezima,
- ako ste izgubili puno soli ili tekućine iz tijela (zbog bolesti – povraćanja, proljeva, neuobičajeno pojačanog znojenja, prehrane s malim unosom soli, dugotrajnog uzimanja diuretika ili zbog dijalize),
- ako imate predviđenu terapiju za smanjenje alergije na ubod pčela ili osa (desenzibilizacija),
- ako trebate primiti anestetik; primjerice kod operacije ili zahvata na zubima. U tom slučaju možda će biti potrebno prekinuti liječenje ovim lijekom jedan dan prije zahvata. Upitajte svog liječnika za savjet.
- ako imate visoku koncentraciju kalija u krvi (vidljivu u rezultatima krvnih pretraga),
- ako uzimate lijekove ili imate stanja koja mogu smanjiti razinu natrija u krvi. Vaš liječnik može provoditi redovite krvne pretrage, osobito za provjeru razine natrija u krvi, pogotovo ako ste stariji.
- ako imate vaskularnu bolest vezivnog tkiva, kao što je skleroderma ili sistemski eritematozni lupus,
- ako ste trudni ili mislite da biste mogli zatrudnjeti. Ovaj se lijek ne preporučuje u prva tri mjeseca trudnoće i može ozbiljno naštetiti Vašem djetetu ako se koristi nakon trećeg mjeseca trudnoće (pogledajte dio „Trudnoća, dojenje i plodnost“).
- ako primijetite slabljenje vida ili osjetite bol u očima. To mogu biti simptomi nakupljanja tekućine u sloju oka u kojem su smještene krvne žile (efuzija žilnice) ili povećanja tlaka u oku (glaukom), a mogu nastupiti u roku od nekoliko sati do tjedan dana nakon uzimanja lijeka Blocar Plus. Ako se ne liječi, može dovesti do trajnog gubitka vida. Ako ste ranije imali alergiju na penicilin ili sulfonamid, pod većim ste rizikom da ovo razvijete.
- ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka:
 - blokator angiotenzin II receptora (ARB) (nazivaju se i sartanima – primjerice valsartan, telmisartan, irbesartan), osobito ako imate bubrežne tegobe povezane sa šećernom bolešću,
 - aliskiren.
- ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova, rizik od angioedema može biti povećan: (brzo oticanje potkožnog tkiva u području poput grla):
 - racekadotril, koji se koristi za liječenje proljeva,
 - lijekove koji se koriste za sprječavanje odbacivanja presađenih organa i za liječenje raka (npr. temsirolimus, sirolimus, everolimus)
 - vildagliptin, koji se koristi za liječenje šećerne bolesti

- sakubitril/valsartan (pogledajte dio 2 „Nemojte uzimati Blocar Plus”).
- ako ste imali rak kože ili ako Vam se pojavi neočekivana lezija (promjena) na koži tijekom liječenja. Liječenje hidroklorotiazidom, naročito dugotrajna primjena uz visoke doze, može povećati rizik o nekih vrsta raka kože ili usana (nemelanomski rak kože). Zaštitite svoju kožu od izlaganja suncu i UV zrakama za vrijeme uzimanja Blocar Plus tableta.
- ako ste u prošlosti imali probleme s disanjem ili plućima (uključujući upalu ili tekućinu u plućima) nakon unosa hidroklorotiazida. Ako osjetite bilo kakav težak nedostatak zraka ili otežano disanje nakon uzimanja lijeka Blocar Plus, odmah potražite liječničku pomoć.

Liječnik Vam može provjeravati bubrežnu funkciju, krvni tlak i količinu elektrolita (npr. kalija) u krvi u redovitim intervalima.

Pogledajte također informacije pod naslovom „Nemojte uzimati Blocar Plus“.

Djeca i adolescenti

Ovaj se lijek ne preporučuje djeci i adolescentima mlađim od 18 godina, jer nema dovoljno podataka o primjeni lijeka u ovoj populaciji.

Ako se bilo što od gore navedenog odnosi na Vas (ili u to niste sigurni), razgovarajte s Vašim liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

Drugi lijekovi i Blocar Plus

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. Blocar Plus može utjecati na učinak drugih lijekova, a drugi lijekovi mogu također utjecati na učinak ovog lijeka.

Obavijestite svog liječnika ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova, jer oni mogu smanjiti učinak Blocar Plus-a:

- lijekovi za ublažavanje boli i upale (nesteroidni protuupalni lijekovi, NSAIL, kao što su ibuprofen, indometacin i acetilsalicilatna kiselina),
- lijekovi za liječenje niskog krvnog tlaka, šoka, zatajenja srca, astme ili alergija, kao što su efedrin, noradrenalin ili adrenalin. Liječnik će Vam trebati provjeriti krvni tlak.

Obavijestite svog liječnika ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova, jer oni mogu povećati vjerojatnost razvoja nuspojava ako ih uzimate s ovim lijekom:

- sakubitril/valsartan - koristi za liječenje jedne vrste dugoročnog (kroničnog) zatajivanja srca u odraslih (pogledajte dio 2. „Nemojte uzimati Blocar Plus”)
- lijekove za ublažavanje boli i upale (nesteroidni protuupalni lijekovi (NSAIL), kao što su acetilsalicilatna kiselina, ibuprofen ili indometacin),
- lijekove koji mogu smanjiti količinu kalija u krvi, uključujući lijekove protiv zatvora, diuretike (tablete za mokrenje), amfotericin B (koristi se za gljivične infekcije) i ACTH (koristi se za provjeru aktivnosti adrenalnih žlijezda),
- lijekove za liječenje raka (kemoterapeutici),
- lijekove za srčane probleme, uključujući probleme s brojem otkucaja srca,
- imunosupresive (lijekovi koji suzbijaju odbacivanje organa nakon transplantacije), kao što je ciklosporin,
- lijekove koji se najčešće primjenjuju kako bi se izbjeglo odbacivanje presađenih organa (sirolimus, everolimus i ostali lijekovi koji pripadaju skupini mTOR inhibitora). Pogledajte dio „Upozorenja i mjere opreza“.
- diuretike (lijekovi za mokrenje), kao što je furosemid,
- nadomjeske kalija (uključujući nadomjeske soli), diuretike koji štede kalij i druge lijekove koji mogu povećati količinu kalija u krvi (npr. trimetoprim i kotrimoksazol za bakterijske infekcije; ciklosporin, imunosupresijski lijek koji se koristi za sprječavanje odbacivanja presađenih organa; i heparin, koji se

koristi za razrjeđivanje krvi radi sprječavanja nastanka krvnih ugrušaka).

- steroidne lijekovi za liječenje upale, kao što je prednizolon,
- nadomjeske kalcija,
- alopurinol (za liječenje gihta),
- prokainamid (za liječenje problema sa srčanim ritmom),
- kolestiramin (za smanjenje masnoća u krvi),
- karbamazepin (za epilepsiju)
- temsirolimus (za liječenje raka)
- vildagliptin (koristi se u liječenju šećerne bolesti tipa 2)
- racekadotril (za liječenje proljeva).

Liječnik će Vam možda morati promijeniti dozu i/ili poduzeti druge mjere opreza:

- ako uzimate neki blokator angiotenzin II receptora (ARB) ili aliskiren (pogledajte također informacije pod naslovima „Nemojte uzimati Blocar Plus“ i „Upozorenja i mjere opreza“).

Obavijestite liječnika ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova, jer Blocar Plus može utjecati na njihov učinak:

- lijekovi za liječenje dijabetesa, kao što su lijekovi za snižavanje koncentracije glukoze u krvi koji se uzimaju kroz usta i inzulin. Ovaj lijek može dovesti do smanjenja koncentracije šećera u krvi, pa je potrebno redovito provjeravati razinu šećera u krvi dok uzimate ovaj lijek.
- litij (za liječenje mentalnih problema). Ovaj lijek može povisiti koncentraciju litija u krvi, stoga je potrebno da Vaš liječnik pažljivo prati koncentraciju litija.
- lijekovi za opuštanje mišića,
- kinin (za malariju),
- lijekovi koji sadržavaju jod, a koriste se prilikom rendgenskog ili CT pregleda u bolnici,
- penicilin (za infekcije),
- lijekovi za razrjeđivanje krvi koji se uzimaju kroz usta (oralni antikoagulansi), kao što je varfarin.

Ako se išta od gore navedenog odnosi na Vas (ili u to niste sigurni), razgovarajte s Vašim liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

Pretrage

Posavjetujte se s Vašim liječnikom ili ljekarnikom prije uzimanja lijeka:

- ako trebate obaviti ispitivanje funkcije paratireoidne žlijezde jer ovaj lijek može utjecati na rezultate pretrage,
- ako ste sportaš i trebate obaviti anti-doping kontrolu jer ovaj lijek može dati pozitivan rezultat na testu.

Blocar Plus s hranom, pićem i alkoholom

- Uzimanje alkohola s Blocar Plus tabletama može izazvati omaglicu ili ošamućenost. Ako ne znate koliko alkohola smijete popiti dok uzimate ovaj lijek, razgovarajte s Vašim liječnikom, s obzirom da lijekovi za snižavanje krvnog tlaka i alkohol mogu imati aditivni učinak (učinci im se zbrajaju).
- Ovaj se lijek može uzeti s obrokom ili između obroka.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Trudnoća

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ne preporučuje se uzimanje ovog lijeka tijekom prvih 12 tjedana trudnoće, a ne smije se uzimati nakon 13-og tjedna, s obzirom da uzimanje ovog lijeka za vrijeme trudnoće može biti štetno za dijete.

Ako zatrudnite za vrijeme uzimanja ovog lijeka, odmah obavijestite svog liječnika. Ako planirate imati dijete, potrebno je unaprijed prijeći na primjerenu alternativnu terapiju.

Dojenje

Ne biste smjeli uzimati ovaj lijek ako dojite.

Prije uzimanja bilo kojeg lijeka upitajte za savjet liječnika ili ljekarnika.

Upravljanje vozilima i strojevima

Za vrijeme uzimanja ovog lijeka možete osjetiti omaglicu. Veća je vjerojatnost da se to dogodi na početku liječenja i pri povećanju doze lijeka. Ako se to dogodi, nemojte upravljati vozilima ili koristiti alate i strojeve.

Blocar Plus sadrži laktozu i natrij

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka. Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po tableti, tj. zanemarive količine natrija.

3. Kako uzimati Blocar Plus

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Koliko lijeka uzeti

Liječenje povišenog krvnog tlaka

Liječnik će prilagoditi dozu koju uzimate tako da Vaš krvni tlak bude pod kontrolom.

Stariji bolesnici

Liječnik će smanjiti početnu dozu te će postupno prilagođavati Vašu terapiju.

Uzimanje lijeka

- Lijek uzmite kroz usta, svaki dan u isto vrijeme, obično ujutro.
- Tablete progutajte s tekućinom.
- Nemojte drobiti ili žvakati tablete.
- Tableta se može razdijeliti na jednake doze.

Ako uzmete više Blocar Plus-a nego što ste trebali

Obavijestite liječnika ili otidite na odjel hitne pomoći u najbližu bolnicu. Nemojte sami voziti u bolnicu, neka Vas poveze netko drugi ili pozovite hitnu pomoć. Uzmite sa sobom pakiranje lijeka kako bi liječnik znao što ste uzeli.

Ako ste zaboravili uzeti Blocar Plus

- Ako zaboravite uzeti lijek, uzmite sljedeću dozu prema rasporedu uzimanja.
- Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Prestanite uzimati Blocar Plus i odmah se obratite liječniku ako primijetite bilo koju od sljedećih ozbiljnih nuspojava – možda će Vam biti potrebna i hitna medicinska pomoć:

- oticanje lica, usana ili grla koje otežava gutanje ili disanje te svrbež i osip na koži – to mogu biti znakovi ozbiljne alergijske reakcije na ovaj lijek,
- ozbiljne kožne reakcije, uključujući osip na koži, čireve u ustima, pogoršanje postojećih kožnih bolesti, crvenilo, mjehuriće na koži ili ljuštenje kože (kao što je Stevens-Johnson sindrom, toksična epidermalna nekroliza ili multififormni eritem).

Odmah obavijestite liječnika ako primijetite nešto od sljedećeg:

- ubrzani puls, nepravilne ili snažne otkucaje srca (palpitacije), bol u prsima, stezanje u prsima ili ozbiljnije probleme, kao što su srčani i moždani udar,
- zadihanost, vrućicu uz kašalj koja traje 2 do 3 dana te smanjeni apetit. To mogu biti znaci problema s plućima, uključujući upalu.
- ako primijetite da Vam se češće javljaju modrice, krvarite dulje nego što je normalno, bilo kakve znakove krvarenja (npr. krvarenje desni), ljubičaste točke na koži ili infekcije češće nego što je to uobičajeno, ako imate bolno grlo i groznicu, osjećate umor, nesvjesticu, omaglicu ili imate blijedu kožu. To mogu biti znaci problema s krvlju ili koštanom srži.
- jake bolove u želucu, koji se mogu proširiti na leđa (to može biti znak pankreatitisa – upale gušterače).
- groznicu, zimicu, umor, gubitak apetita, bol u želucu, mučninu, žutilo kože ili očiju (žutica). To mogu biti znaci problema s jetrom, kao što je hepatitis (upala jetre) ili oštećenje jetre.
- jaku bol u oku, zamagljen vid ili viđenje aureola (svjetlost ovalnog oblika, svijetleći prsten) oko svjetala, glavobolju, obilno suženje ili mučninu i povraćanje koji mogu upućivati na stanje zvano glaukom; oslabljen vid, kratkovidnost što može biti stanje koje se naziva miopija.

Ostale nuspojave:

Obavijestite svog liječnika ako neke od sljedećih nuspojava postanu ozbiljne ili traju duže od nekoliko dana.

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 bolesnika)

- glavobolja, opća slabost ili umor,
- omaglica (češće se javlja na početku liječenja i pri povećanju doze lijeka),
- suhi nadražujući kašalj ili bronhitis,
- krvne pretrage koje pokazuju povećanu razinu šećera u krvi, ako imate dijabetes, može se pogoršati),
- krvne pretrage koje pokazuju povećanu razinu urične kiseline ili masti u krvi,
- bolni, crveni ili natečeni zglobovi (pogoršanje stanja kod oboljelih od gihta).

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 bolesnika)

- osip na koži, s ispupčenjem dijelova kože ili bez ispupčenja,
- crvenilo praćeno vrućinom, nesvjestica, hipotenzija (abnormalno nizak krvni tlak), posebice kod naglog ustajanja ili sjedanja,
- problemi s ravnotežom (vrtoglavica),
- svrbež i neobični osjeti na koži kao što su ukočenost, žarenje, peckanje, vrućina ili trnci (parestezija),
- gubitak ili poremećaj okusa (disgeuzija),
- problemi sa snom,
- osjećaj depresije, napetosti, povećane nervoze ili nemira,
- začepljen nos, upala sinusa (sinusitis), zadihanost
- upala desni, natečena usta (gingivitis),
- crvene, natečene oči koje svrbe ili suze (konjuktivitis),
- zujanje u ušima (tinitus),

- zamućen vid,
- gubitak kose,
- bolovi u prsištu,
- bol u mišićima (mijalgija),
- zatvor, bol u želucu ili crijevima,
- poremećaji probave ili mučnina,
- povećano izlučivanje tekućine (urin) tijekom dana, što može biti posljedica oštećenja bubrega,
- znojenje jače od uobičajenog ili osjećaj žeđi,
- gubitak ili smanjenje apetita (anoreksija), smanjen osjećaj gladi,
- ubrzani ili nepravilni otkucaji srca,
- oticanje ruku i nogu - ovo mogu biti znakovi pojačanog zadržavanja tekućine u tijelu,
- groznica,
- seksualna impotencija u muškaraca,
- krvne pretrage koje pokazuju smanjenje broja crvenih ili bijelih krvnih stanica, krvnih pločica (trombocita) ili koncentracije hemoglobina u krvi,
- krvne pretrage koje pokazuju na promjene u radu jetre, gušterače ili bubrega,
- krvne pretrage koje pokazuju na smanjenu razinu kalija u krvi.

Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 bolesnika)

- mučnina, proljev ili žgaravica,
- crven i natečen jezik (glositis) ili sluznica usta (aftozni stomatitis), suha usta,
- krvne pretrage koje pokazuju povećanu razinu kalija u krvi.
- akutni respiratorni distress (znakovi uključuju težak nedostatak zraka, vrućicu, slabost i smetenost).

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

- teškoće u koncentraciji, nemir ili zbunjenost,
- prsti na rukama i nogama mijenjaju boju kad Vam je hladno uz osjećaj peckanja ili boli kad se ugrijete (Raynaudov fenomen),
- povećanje grudi u muškaraca (ginekomastija),
- krvni ugrušci uslijed teškog gubitka tekućine,
- poremećaj sluha,
- smanjeno suzenje očiju,
- poremećaj vida kod kojeg objekti izgledaju žućkasto (ksantopsija),
- dehidracija,
- oticanje, bol ili crvenilo u obrazima (upala žlijezde slinovnice),
- oticanje crijeva zvano „intestinalni angioedem“, uz simptome kao što su bol u trbuhu, povraćanje i proljev,
- povećana osjetljivost kože na sunce (fotoosjetljivost),
- teško ljuštenje ili guljenje kože, osip praćen svrbežom i kvrgama ili druge kožne reakcije kao što je osip praćen crvenilom na licu i čelu,
- kožni osip,
- mrlje na koži ili hladnoća u ekstremitetima,
- problemi s noktima (npr. klimavost nokta ili odvajanje nokta iz ležišta),
- mišićno-koštana ukočenost ili nemogućnost pomicanja čeljusti (tetanija),
- slabost ili grčevi u mišićima,
- smanjen spolni nagon (libido) u muškaraca i žena,
- krv u mokraći (to može biti znak problema s bubrezima – intersticijski nefritis),
- povećana razina šećera u mokraći,
- povećan broj jedne vrste bijelih krvnih stanica (eozinofilija) vidljiv prilikom krvnih pretraga,
- nalazi krvnih pretraga koji pokazuju premali broj krvnih stanica (pancitopenija),

- nalazi krvnih pretraga koji pokazuju promjene razina soli (elektrolita) kao što su natrij, kalcij, magnezij i klorid u krvi,
- koncentrirani urin (tamne boje), mučnina ili povraćanje, grčevi u mišićima, smetenost i napadaji koji mogu biti posljedica neodgovarajućeg izlučivanja ADH-a (antidiuretskog hormona). Ako imate te simptome, obratite se svom liječniku što je prije moguće,
- usporena ili narušena sposobnost reakcije,
- poremećaj njuha (parosmija),
- otežano disanje ili pogoršanje astme.
- rak kože i usana (nemelanomski rak kože).
- oslabljen vid ili bol u očima zbog visokog tlaka (nakupljanje tekućine u sloju oka u kojem su smještene krvne žile (efuzija žilnice) ili akutnog glaukoma zatvorenog kuta).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u [Dodatku V](#). Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Blocar Plus

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25°C, u originalnom pakiranju, radi zaštite od vlage.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza riječi EXP.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Blocar Plus sadrži

Djelatne tvari su: ramipril i hidroklorotiazid.

Jedna tableta Blocar Plus 2,5 mg/12,5 mg sadrži 2,5 mg ramiprila i 12,5 mg hidroklorotiazida.

Jedna tableta Blocar Plus 5 mg/25 mg sadrži 5 mg ramiprila i 25 mg hidroklorotiazida.

Pomoćne tvari su: laktoza hidrat; hipromeloza; krosprovidon; mikrokristalična celuloza; natrijev stearilfumarat.

Kako Blocar Plus tablete izgledaju i sadržaj pakiranja

Blocar Plus 2,5 mg /12,5 mg

Bijele tablete u obliku kapsula, dužine 8,1 mm, s urezom s obje strane. Na jednoj strani su utisnute oznake „2.5“ i „12.5“.

Tableta se može razdijeliti na jednake doze.

Blocar Plus 5 mg/25 mg

Bijele tablete u obliku kapsula, dužine 10,1 mm, s urezom s obje strane, na jednoj strani su utisnute oznake „5“ i „25“.

Tableta se može razdijeliti na jednake doze.

28 tableta tableta u PVC/PCTFE/Al blisteru, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

JADRAN- GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u ožujku 2022.