

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Osan Plus 80 mg / 12,5 mg tablete

telmisartan, hidroklorotiazid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Osan Plus i za što se koristi?
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Osan Plus?
3. Kako uzimati Osan Plus?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Osan Plus?
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Osan plus i za što se koristi?

Osan Plus je kombinacija dviju djelatnih tvari, telmisartana i hidroklorotiazida u jednoj tableti. Obje tvari pomažu u liječenju visokog krvnog tlaka.

Telmisartan pripada skupini lijekova koji se nazivaju antagonisti receptora angiotenzina II. Angiotenzin II je tvar koja se proizvodi u tijelu i uzrokuje sužavanje krvnih žila. Zbog toga krv teže prolazi kroz žile i dolazi do porasta tlaka u njima. Telmisartan blokira učinak angiotenzina II pa se krvne žile opuštaju, a krvni tlak se snižava.

Hidroklorotiazid pripada skupini lijekova koji se nazivaju tiazidski diuretici. Ti lijekovi pospješuju mokrenje i tako snižavaju krvni tlak.

Ako se ne liječi, visoki krvni tlak može oštetiti krvne žile u nekoliko organa, što katkada može dovesti do srčanog udara, zatajenja srca ili bubrega, moždanog udara ili sljepoće. Visoki krvni tlak obično nema simptoma, sve dok ne nastupi oštećenje. Stoga je važno redovito kontrolirati vrijednosti krvnog tlaka.

Osan Plus se koristi za liječenje visokog krvnog tlaka (esencijalne hipertenzije) u bolesnika čiji se krvni tlak ne može dovoljno dobro kontrolirati samo telmisartanom niti samo hidroklorotiazidom.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Osan plus?

Nemojte uzimati Osan Plus:

- ako ste preosjetljivi (alergični) na telmisartan ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.);
- ako ste preosjetljivi (alergični) na hidroklorotiazid ili na bilo koji drugi sulfonamidni lijek;

- ako ste trudni više od tri mjeseca (Osan Plus je bolje izbjegavati i ranije u trudnoći – pročitati odjeljak o trudnoći);
- ako imate teške jetrene tegobe kao što je kolestaza ili opstrukcija žuči (poteškoće s istjecanjem žuči iz jetre i žučnog mjehura) ili neku drugu tešku bolest jetre;
- ako imate tešku bolest bubrega;
- ako je liječnik ocijenio da je razina kalija u Vašoj krvi niska ili da je razina kalcija u Vašoj krvi visoka i da se liječenjem ne poboljšava.
- ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje krvnog tlaka koji sadrži aliskiren.

Ako se bilo što od gore navedenog odnosi na Vas, obavijestite o tome svog liječnika ili ljekarnika prije nego što počnete uzimati Osan Plus tablete.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Osan Plus ako imate ili ste imali bilo koje od sljedećih stanja ili bolesti:

- nizak krvni tlak koji se obično javlja kad ste dehidrirani ili imate manjak soli zbog uzimanja diuretika (tableta za mokrenje), zatim ukoliko ste na dijeti s niskim sadržajem soli ili ako imate proljev, ako povraćate ili ako se podvrgavate dijalizi;
- bolesti bubrega ili ako Vam je presađen bubreg;
- suženje bubrežnih arterija;
- bolesti jetre;
- poteškoće sa srcem;
- šećernu bolest;
- giht;
- povišene vrijednosti aldosterona (zadržavanje soli i vode u tijelu zajedno s neravnotežom raznih minerala u krvi).;
- bolest imunološkog sustava (lupus eritematosus).
- ako ste imali rak kože ili ako Vam se pojavi neočekivana lezija (promjena) na koži tijekom liječenja. Liječenje hidroklorotiazidom, naročito dugotrajna primjena uz visoke doze, može povećati rizik od nekih vrsta raka kože ili usana (nemelanomski rak kože). Zaštitite svoju kožu od izlaganja suncu i UV zrakama za vrijeme uzimanja Osan Plus tableta
- djelatna tvar, hidroklorotiazid može izazvati neobičnu reakciju koja rezultira smanjenjem vida i boli u očima, koji mogu biti simptomi nakupljanja tekućine u sloju oka u kojem su smještene krvne žile (efuzija žilnice) ili povišenog tlaka u oku, a do njih može doći unutar nekoliko sati do tjedana primjene lijeka Osan Plus. Ako se ne liječe, mogu dovesti do trajnog oštećenja vida.
- Ako ste u prošlosti imali probleme s disanjem ili plućima (uključujući upalu ili tekućinu u plućima) nakon unosa hidroklorotiazida. Ako osjetite bilo kakav težak nedostatak zraka ili otežano disanje nakon uzimanja lijeka Osan Plus, odmah potražite liječničku pomoć.

Obratite se svom liječniku prije nego uzmete Osan Plus:

- ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka:
 - ACE inhibitor (primjerice enalapril, lizinopril, ramipril), osobito ako imate bubrežne tegobe povezane sa šećernom bolešću.
 - aliskiren.
 Liječnik Vam može provjeravati bubrežnu funkciju, krvni tlak i količinu elektrolita (npr. kalija) u krvi u redovitim intervalima. Vidjeti također informacije pod naslovom „Nemojte uzimati Osan Plus“.
- ako uzimate digoksin

Ako imate bol u trbuhu, mučninu, povraćanje ili proljev nakon uzimanja Osana Plus, obratite se svojem liječniku. Vaš će liječnik odlučiti o daljnjem liječenju. Nemojte prestati uzimati Osan Plus bez savjetovanja s liječnikom.

Također, morate obavijestiti liječnika ako ste trudni ili ako planirate trudnoću. Osan Plus tablete se ne preporučuju u ranoj trudnoći, a ne smiju se uzimati nakon 3. mjeseca trudnoće jer mogu jako naškoditi djetetu ako se uzimaju u tom stadiju trudnoće (pročitati dio o trudnoći).

Liječenje hidroklorotiazidom može izazvati neravnotežu elektrolita u tijelu. Među tipične simptome neravnoteže tekućina ili elektrolita ubrajaju se suha usta, slabost, apatija, pospanost, nemir, bol ili grčevi mišića, mučnina (osjećaj da Vam nije dobro), povraćanje, umor mišića i nenormalno brzi otkucaji srca (više od 100 otkucaja u minuti). Javi li se neki od navedenih simptoma, trebate obavijestiti liječnika.

Liječnika trebate obavijestiti i ako Vam koža postane osjetljivija na sunce, a simptomi sunčevih opekлина (npr. crvenilo, svrbež, oteknuće, plikovi) počnu se javljati brže nego inače.

Ako morate na operaciju ili morate primiti anesteziju, liječniku trebate reći da uzimate Osan Plus tablete.

Kao i ostali antagonisti receptora angiotenzina II, i telmisartan može biti slabije učinkovit u snižavanju krvnog tlaka u osoba Crne rase.

Djeca i adolescenti

Ne preporučuje se primjena Osan Plus tableta kod djece i osoba mlađih od 18 godina.

Drugi lijekovi i Osan Plus

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući lijekove koji se mogu dobiti bez recepta. Liječnik će možda promijeniti dozu tih lijekova i/ili poduzeti druge mjere opreza. U nekim slučajevima možda ćete morati prestati uzimati neki od tih lijekova. To se osobito odnosi na sljedeće lijekove ako se uzimaju istovremeno s Osan Plus tabletama:

- Lijekovi koji sadrže litij za liječenje određenih oblika depresije.
- Lijekovi koji su povezani s niskim vrijednostima kalija u krvi (hipokalemija) kao što su drugi diuretici („tablete za izmokranje”), laksativi (npr. ricinusovo ulje), kortikosteroidi (npr. prednizon), ACTH (hormon), amfotericin (protugljivični lijek), karbenoksolon (koji se primjenjuje u liječenju ulkusa u ustima), penicilin-G-natrij (antibiotik), te salicilatna kiselina i derivati.
- Lijekovi koji mogu povisiti vrijednosti kalija u krvi kao što su diuretici koji štede kalij, nadomjesci kalija, zamjenske soli koje sadrže kalij, ACE inhibitori, ciklosporin (imunosupresivni lijek) i drugi lijekovi kao što je heparinnatrij (lijek protiv zgrušavanja krvi).
- Lijekovi na koje utječu promjene vrijednosti kalija u krvi kao što su lijekovi za srce (npr. digoksin) ili lijekovi za kontrolu srčanog ritma (npr. kinidin, dizopiramid, amiodaron, sotalol), lijekovi koji se primjenjuju za duševne poremećaje (npr. tioridazin, klorpromazin, levomepromazin) i drugi lijekovi kao što su određeni antibiotici (npr. sparfloksacin, pentamidin) ili određeni lijekovi za liječenje alergijskih reakcija (npr. terfenadin).
- Lijekovi za liječenje dijabetesa (inzulini ili lijekovi koji se primjenjuju kroz usta kao što je metformin).
- Kolestiramin i kolestipol, lijekovi za snižavanje vrijednosti masnoća u krvi.
- Lijekovi za povišenje krvnog tlaka kao što je noradrenalin.
- Lijekovi za opuštanje mišića kao što je tubokurarin.
- Nadomjesci kalcija i/ili nadomjesci vitamina D.

- Antikolinergički lijekovi (lijekovi koji se primjenjuju u liječenju niza poremećaja poput grčeva probavnog sustava, grča mokraćnog mjehura, astme, bolesti kretanja, grčeva mišića, Parkinsonove bolesti te kao pomoć u anesteziji) kao što su atropin i biperiden.
- Amantadin (lijek koji se primjenjuje za liječenje Parkinsonove bolesti te se također primjenjuje u liječenju ili prevenciji određenih bolesti uzrokovanih virusima).
- Drugi lijekovi koji se primjenjuju u liječenju visokog krvnog tlaka, kortikosteroidi, lijekovi protiv bolova (kao što su nesteroidni protuupalni lijekovi [NSAIL-ovi]), lijekovi za liječenje raka, gihta, ili artritisa.
- Ako uzimate ACE inhibitor ili aliskiren (vidjeti također informacije pod naslovima „Nemojte uzimati Osan Plus“ i „Upozorenja i mjere opreza“).
- Digoksin

Osan Plus može pojačati učinak snižavanja krvnog tlaka drugih lijekova koji se primjenjuju u liječenju visokog krvnog tlaka ili lijekova s potencijalom snižavanja krvnog tlaka (npr. baklofenak, amifostin). Nadalje, niski krvni tlak se može pogoršati uzimanjem alkohola, barbiturata, narkotika ili antidepresiva što se može primijetiti u obliku omaglice prilikom ustajanja. Potrebno je posavjetovati se s liječnikom ako trebate prilagođavanje doze drugog lijeka dok uzimate Osan Plus.

Učinak lijeka Osan Plus se može smanjiti dok uzimate NSAIL-ove (nesteroidni protuupalni lijekovi, npr. acetilsalicilna kiselina ili ibuprofen).

Osan Plus s hranom i pićem

Možete uzeti Osan Plus tablete neovisno o uzimanju hrane.

Izbjegavajte konzumiranje alkohola dok se ne posavjetujete s liječnikom. Alkohol može još više sniziti krvni tlak i/ili povećati rizik od omaglice ili osjećaja nesvjestice.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije uzimanja bilo kojeg lijeka.

Trudnoća

Morate reći svom liječniku ako ste trudni ili ako planirate trudnoću. Obično će Vas liječnik savjetovati da prestanete uzimati Osan Plus čim saznate da ste trudni te da uzmete drugi lijek. Uzimanje lijeka Osan Plus ne preporučuje se u ranoj trudnoći, a mogu uzrokovati ozbiljna oštećenja kod Vašeg djeteta ako se uzimaju nakon trećeg mjeseca trudnoće.

Dojenje

Obavijestite liječnika ukoliko dojite ili namjeravate dojiti. Uzimanje lijeka Osan Plus ne preporučuje se majkama koje doje te će Vam liječnik izabrati drugu terapiju ukoliko želite dojiti, posebno ako je Vaše dijete tek rođeno ili se rodilo kao nedonošče.

Upravljanje vozilima i strojevima

Neke osobe mogu osjećati omaglicu ili umor tijekom primjene lijeka Osan Plus. Osjetite li omaglicu ili umor dok uzimate Osan Plus, nemojte upravljati vozilima ni raditi na strojevima.

Osan Plus sadrži laktozu, sorbitol i manitol:

- Osan Plus sadrži laktozu i sorbitol. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka.
- Osan Plus sadrži manitol koji može imati blagi laksativni učinak.

Osan Plus sadrži natrij

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po tableti tj. zanemarive količine natrija.

3. Kako uzimati Osan plus?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Uobičajena doza Osan Plus tableta je jedna tableta na dan. Trebali biste popiti tabletu u isto vrijeme svakog dana. Osan Plus možete uzimati neovisno o uzimanju hrane. Tabletu treba progutati s malo vode ili drugog bezalkoholnog napitka. Važno je da uzimate Osan Plus svaki dan sve dok Vam liječnik ne kaže drugačije.

Ako Vaša jetra ne funkcionira uredno, uobičajena doza ne bi smjela premašiti dnevnu dozu od 40 mg/12,5 mg. Stoga, Osan Plus 80 mg / 12,5 mg tablete ne smijete primijeniti, te se u tom slučaju obratite Vašem liječniku.

Ako uzmete više Osan Plus tableta nego što ste trebali

Ako slučajno uzmete previše tableta, može doći do pojave simptoma kao što su niski krvni tlak i ubrzani otkucaji srca. Također su prijavljeni i usporeni otkucaji srca, omaglica, povraćanje, smanjena funkcija bubrega uključujući zatajenje bubrega. Zbog hidroklorotiazida kao komponente, također može doći i do izrazitijeg niskog krvnog tlaka i niskih vrijednosti kalija u krvi, što može rezultirati mučninom, pospanošću i grčevima mišića, i/ili nepravilnim otkucajima srca povezanim s istodobnom primjenom lijekova kao što su digitalis ili određeni antiaritmici. Odmah obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ili se javite u hitnu službu najbliže bolnice.

Ako zaboravite uzeti Osan Plus tablete

Ako zaboravite uzeti jednu dozu, ne brinite. Uzmite je čim se sjetite i dalje nastavite kao i ranije. Ako ne uzmete tabletu jedan dan, uzmite svoju uobičajenu dozu sljedećeg dana. Ne uzimajte dvostruku dozu kako biste nadoknadili onu propuštenu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom lijeka Osan Plus obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Neke nuspojave mogu biti ozbiljne i zahtijevati trenutno medicinsko zbrinjavanje:

Morate se trenutno javiti liječniku ako imate neki od sljedećih simptoma:

Sepsa* (često se naziva "trovanje krvi") je teška infekcija s upalnom reakcijom cijelog tijela, vrlo brzo oticanje kože i sluznice (angioedem); stvaranje mjehura i ljuštenje gornjeg sloja kože (toksična epidermalna nekroliza); ove nuspojave su rijetke (mogu se javiti u do 1 na 1 000 osoba), ili su nepoznate učestalosti (toksična epidermalna nekroliza) ali izuzetno ozbiljne, te bolesnici moraju prekinuti s primjenom lijeka i trenutno se javiti liječniku. Ako se ovi učinci ne liječe, mogu imati fatalan ishod. Povećana učestalost sepse je primijećena samo uz telmisartan, ali ne može se isključiti za Osan Plus.

Prijavljene nuspojave i njihova približna učestalost navedene su u nastavku.

Česte (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba):
Omaglica.

Manje česte (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba):

Snížene vrijednosti kalija u krvi, tjeskoba, nesvjestica (sinkopa), osjećaj trnaca, bockanja i žarenja (parestezija), osjećaj vrtnje (vrtoglavica), brzi otkucaji srca (tahikardija), poremećaji srčanog ritma, niski krvni tlak, iznenadni pad krvnog tlaka prilikom ustajanja, nedostatak zraka (zaduha), proljev, suhoća usta, vjetrovi, bol u leđima, grčevi mišića, bolovi u mišićima, erektilna disfunkcija (nesposobnost postizanja ili održavanja erekcije), bol u prsnom košu, povišene vrijednosti mokraćne kiseline u krvi.

Rijetke (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba):

Upala pluća (bronhitis), aktivacija ili pogoršanje sistemskog lupus eritematozusa (bolest u kojoj imunološki sustav tijela napada tijelo, što izaziva bolove u zglobovima, osipe po koži i vrućicu), upaljeno grlo, upala sinusa, osjećaj tuge (depresija), problemi s usnivanjem (nesanica), oštećenje vida, otežano disanje, bol u trbuhu, zatvor, nadutost (probavne tegobe), osjećaj mučnine (povraćanje), upala želuca (gastritis), abnormalna jetrena funkcija (Japanska populacija ima veće izgleda za ovu nuspojavu), crvenilo kože (eritem), alergijske reakcije kao što su svrbež ili osip, pojačano znojenje, koprivnjača (urtikarija), bol zglobova (artralgija) i bol u udovima, grčevi u mišićima, bolest nalik gripi, bolovi, niske vrijednosti natrija, povišene vrijednosti kreatinina, jetrenih enzima ili kreatin fosfokinaze u krvi.

Nuspojave prijavljene uz jednu od pojedinih komponenti mogu biti potencijalne nuspojave uz Osan Plus, čak ako i nisu primijećene u kliničkim ispitivanjima s ovim lijekom.

Telmisartan

U bolesnika koji su uzimali samo telmisartan, prijavljene su i niže navedene nuspojave.

Manje česte (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba):

Infekcija gornjeg dišnog sustava (npr. upaljeno grlo, upala sinusa, obična prehlada), infekcije mokraćnog sustava, nedostatak crvenih krvnih stanica (slabokrvnost/anemija), visoke vrijednosti kalija, usporena srčana frekvencija (bradikardija), oštećenje bubrega uključujući akutno zatajenje bubrega, slabost, kašalj.

Rijetke (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba):

Niski broj trombocita (trombocitopenija), porast određenih bijelih krvnih stanica (eozinofilija), ozbiljna alergijska reakcija (npr. preosjetljivost, anafilaktička reakcija, osip pri uzimanju lijeka), niske vrijednosti šećera u krvi (kod dijabetičara), nadražaj želuca, ekcem (poremećaj kože), artroza, upala tetiva, sniženi hemoglobin (protein u krvi), jaka pospanost.

Vrlo rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

- progresivan nastanak ožiljaka u tkivu pluća (intersticijska bolest pluća)**

Učestalost „nepoznato“: Intestinalni angioedem: nakon primjene sličnih lijekova prijavljeno je oticanje u crijevima praćeno simptomima kao što su bol u trbuhu, mučnina, povraćanje i proljev.

* Do događaja je moglo doći slučajno ili je mogao biti povezan s trenutno nepoznatim mehanizmom.

** Slučajevi progresivnog nastanka ožiljaka u tkivu pluća prijavljeni su tijekom unosa telmisartana. Međutim, nije poznato je li telmisartan uzrok.

Hidroklorotiazid

U bolesnika koji su uzimali samo hidroklorotiazid, prijavljene su niže navedene nuspojave.

Česte (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba):

Mučnina, niska razina magnezija u krvi.

Rijetke (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba):

Smanjenje broja krvnih pločica, što povećava rizik od krvarenja ili stvaranja modrica (malih ljubičasto-crvenih mrlja na koži ili drugom tkivu uzrokovanih krvarenjem), visoka razina kalcija u krvi, glavobolja.

Vrlo rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

Povišen pH (poremećena acidobazna ravnoteža) zbog niske razine klorida u krvi

Akutni respiratorni distres (znakovi uključuju težak nedostatak zraka, vrućicu, slabost i smetenost).

Nuspojave nepoznate učestalosti (učestalost se ne može utvrditi iz dostupnih podataka)

Upala žlijezda slinovnica, smanjenje broja (ili čak nedostatak) stanica u krvi, uključujući niske vrijednosti crvenih i bijelih krvnih stanica, ozbiljne alergijske reakcije (npr. preosjetljivost, anafilaktička reakcija), smanjeni ili gubitak apetita, nemir, ošamućenost, zamućeni vid ili žutilo pred očima, smanjenje vida i bol u očima (mogući znakovi nakupljanja tekućine u sloju oka u kojem su smještene krvne žile (efuzija žilnice), akutne miopije i akutnog glaukoma zatvorenog kuta), upala krvnih žila (nekrotizirajući vaskulitis), upala gušterače (pankreatitis), nadraženi želudac, žutilo kože ili bjeloočnica (žutica), sindrom sličan lupusu (stanje koje oponaša bolest koja se naziva sistemski lupus eritematosus pri kojem imunološki sustav tijela napada tijelo), poremećaji kože kao što je upala krvnih žila kože, povećana osjetljivost na sunčevu svjetlost, osip, crvenilo kože, mjehurići na usnama, očima ili u ustima, ljuštenje kože, vrućica (mogući znakovi multififormnog eritema), slabost, upala bubrega ili oštećenje bubrežne funkcije, glukoza u urinu (glikozurija), vrućica, poremećena ravnoteža elektrolita, visoke vrijednosti kolesterola u krvi, smanjeni volumen krvi, porast razine glukoze u krvi, poteškoće u kontroliranju razine glukoze u krvi/urinu kod bolesnika s dijagnozom šećerne bolesti, ili masnoća u krvi, rak kože i usana (nemelanomski rak kože).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u [Dodatku V](#).

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Osan plus?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek ne zahtjeva posebne uvjete čuvanja.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji iza oznake „EXP“.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Dodatne informacije

Što Osan Plus sadrži

- Osan Plus 80 mg / 12,5 mg tablete sadrže 80 mg telmisartana i 12,5 mg hidroklorotiazida.
- Pomoćne tvari: natrijev hidroksid; hipromeloza; sorbitol; meglumin; manitol; talk; magnezijev stearat; laktoza hidrat; hidroksipropilceluloza; željezov oksid, crveni (E172).

Svaka Osan Plus 80 mg / 12,5 mg tableta sadrži 175,10 mg laktoza hidrata te 56,74 mg sorbitola.

Kako Osan Plus izgleda i sadržaj pakiranja?

Tableta.

Osan Plus 80 mg / 12,5 mg tablete su crvene i bijele do bjelkaste dvodijelne tablete oblika kapsule s urezom na crveno obojenoj strani tablete, dimenzija 16,5 x 8,0 mm.

Urez služi samo kako bi se olakšalo lomljenje tablete radi lakšeg gutanja, a ne da bi se podijelila na jednake doze.

Osan Plus 80 mg / 12,5 mg tablete dostupne su u pakiranju od 28 tableta u blisteru, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25

10 000 Zagreb

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u siječnju 2025.