

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Corprotect 1000 mg meke kapsule

etilni[90]esteri omega-3 kiselina

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što su Corprotect meke kapsule i za što se koriste?
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Corprotect meke kapsule?
3. Kako uzimati Corprotect meke kapsule?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Corprotect meke kapsule?
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što su Corprotect meke kapsule i za što se koriste?

Corprotect meke kapsule sadrže visoko pročišćene omega-3 polinezasićene masne kiseline. Corprotect meke kapsule pripadaju skupini lijekova koji snižavaju kolesterol i trigliceride (vrste masti u krvi).

Corprotect meke kapsule se koriste:

- za snižavanje povišenih vrijednosti nekih triglicerida (masti) u krvi određenih bolesnika kada dijeta nije dala zadovoljavajuće rezultate.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Corprotect meke kapsule?

Nemojte uzimati Corprotect meke kapsule:

- ako ste alergični na omega-3 masne kiseline ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Corprotect meke kapsule.

Budite posebno oprezni s Corprotect mekim kapsulama ako:

- trebate ići na operaciju ili ste nedavno operirani
- ste nedavno bili ozlijeđeni
- imate problema s bubrezima
- imate šećernu bolest koja nije pod kontrolom
- imate problema s jetrom. Liječnik će krvnim pretragama pratiti moguće djelovanje Corprotect mekih kapsula na Vašu jetru.
- ako ste alergični na ribu.

Ako se nešto od navedenog odnosi na Vas, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete ovaj lijek.

Djeca

Djeca ne smiju uzimati ovaj lijek.

Starije osobe

Corprotect meke kapsule treba primjenjivati s oprezom u bolesnika starijih od 70 godina.

Drugi lijekovi i Corprotect meke kapsule

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Obavijestite Vašeg liječnika ako uzimate lijekove protiv zgrušavanja krvi u arterijama, poput varfarina. Možda ćete trebati napraviti i dodatne krvne pretrage i možda će biti potrebno prilagoditi Vašu uobičajenu dozu lijeka protiv zgrušavanja krvi.

Corprotect meke kapsule s hranom i pićem

Kapsule lijeka treba uzimati u vrijeme obroka, čime se smanjuje mogućnost pojave probavnih smetnji.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek..

Corprotect meke kapsule ne smijete uzimati ako ste trudni ili dojite, osim ako liječnik ne odluči da je to neophodno.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ne postoji vjerojatnost utjecaja ovog lijeka na Vašu sposobnost upravljanja vozilima ili strojevima.

3. Kako uzimati Corprotect meke kapsule?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ako niste sigurni.

Liječenje visokih razina masnoća (triglicerida) u krvi (hipertrigliceridemija)

Uobičajena doza je 2 kapsule dnevno, u skladu s liječničkim preporukama.

Ako se ne postigne zadovoljavajući učinak, doza se može povećati na 4 kapsule dnevno.

Način primjene

Kapsule treba progutati s vodom.

Kapsule možete uzimati uz obrok kako biste smanjili mogućnost probavnih smetnji.

Vaš će liječnik odlučiti koliko dugo ćete uzimati ovaj lijek.

Ako uzmete više Corprotect mekih kapsula nego što ste trebali

Ako ste slučajno uzeli veću dozu lijeka nego što biste trebali, ne brinite jer je malo vjerojatno da ćete trebati specifično liječenje. No, ipak se obratite liječniku ili ljekarniku radi dodatnih uputa.

Ako ste zaboravili uzeti Corprotect meke kapsule

Zaboravite li uzeti dozu lijeka, uzmite je čim se sjetite. No, ako se već približilo vrijeme za uzimanje iduće doze, uzmite samo iduću dozu u uobičajeno vrijeme.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Rijetko se mogu javiti **alergijske reakcije** (u manje od 1 na 1000 osoba).

Neki od znakova alergijskih reakcija su: oticanje lica, usana, jezika ili grla, što može uzrokovati teškoće pri gutanju ili disanju, osip popraćen svrbežom, ispupčen crveni osip kože (koprivnjača).

Ako dođe do alergijske reakcije, prestanite s primjenom lijeka i odmah se obratite liječniku.

Ostale prijavljene nuspojave i njihova približna učestalost navedene su niže:

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba)

- problemi s probavom kao što su nadutost, bol, zatvor, proljev, loša probava, vjetrovi, podrigivanje, povrat kiseline, mučnina i povraćanje

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba)

- omaglica
- poremećaji okusa
- visoka razina šećera u krvi
- giht
- glavobolja
- nizak krvni tlak
- krvarenje iz nosa
- krv u stolici
- osip

Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba)

- osip koji svrbi (koprivnjača/urtikarija)
- poremećaji jetre s mogućim promjenama rezultata određenih krvnih testova

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

- svrbež

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: [navedenog u Dodatku V](#).

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Corprotect meke kapsule?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 30 °C u originalnom pakiranju, zaštićeno od vlage. Ne zamrzavati.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza oznake „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Corprotect meke kapsule sadrže?

Djelatne tvari su etilni esteri omega-3 kiselina.

Jedna kapsula sadrži 1000 mg etilnih[90]jester omega-3 kiselina, s udjelom etilnih estera eikosapentaenoatne kiseline (EPA) od 460 mg i etilnih estera dokosaheksaenoatne kiseline (DHA) od 380 mg (ukupno 840 mg EPA i DHA).

Pomoćne tvari su:

Sadržaj kapsule: alfa-tokoferol

Ovojnica kapsule: želatina; glicerol; trigliceridi, srednje duljine lanca.

Kako Corprotect meke kapsule izgledaju i sadržaj pakiranja?

Kapsula, meka.

Corprotect 1000 mg meke kapsule su duguljaste, prozirne, elastične meke želatinske kapsule koje sadrže bistro svijetložuto ulje.

Corprotect 1000 mg meke kapsule dostupne su u sljedećem pakiranju:

- 1.) 30, 60, 90 i 120 kapsula u prozirn timeru, u kutiji
- 2.) 30 i 90 kapsula u bijeloj plastičnoj (HDPE) boćici s plastićnim zatvaraćem, u kutiji

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođać

Nositelj odobrenja:

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25

10 000 Zagreb

Proizvođaći:

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25

10 000 Zagreb

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13

4042 Debrecen

Mađarska

Naćin i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljećarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u prosincu 2019.