

Part VI Sažetak plana upravljanja rizikom

Sažetak plana upravljanja rizikom za lijek Ceftriakson Qilu 1 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju i Ceftriakson Qilu 2 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju (ceftriaksonnatrij)

Ovo je sažetak plana upravljanja rizikom (engl. Risk Management Plan, RMP) za lijek Ceftriakson Qilu 1 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju i Ceftriakson Qilu 2 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju (ceftriaksonnatrij). Plan upravljanja rizikom (RMP) opisuje važne rizike lijeka Ceftriakson Qilu 1 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju i Ceftriakson Qilu 2 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju (ceftriaksonnatrij), načine kako se oni mogu minimizirati te kako se mogu prikupiti dodatne informacije o rizicima i informacijama koje nedostaju lijeka Ceftriakson Qilu 1 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju i Ceftriakson Qilu 2 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju.

Sažetak opisa svojstava lijeka Ceftriakson Qilu 1 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju i Ceftriakson Qilu 2 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju i uputa o lijeku pružaju temeljne informacije zdravstvenim radnicima i bolesnicima o tome kako se lijek Ceftriakson Qilu 1 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju i Ceftriakson Qilu 2 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju (ceftriaksonnatrij) treba primjenjivati.

Važni novi rizici ili promjene postojećih biti će uključeni putem ažuriranja Plana upravljanja rizikom (RMP) za lijek Ceftriakson Qilu 1 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju i Ceftriakson Qilu 2 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju.

I. Lijek i za što se primjenjuje

Lijek Ceftriakson Qilu 1 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju i Ceftriakson Qilu 2 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju je odobren za liječenje sljedećih infekcija u odraslih i djece uključujući i novorođenčad (od rođenja): bakterijskog meningitisa, izvanbolnički stečene pneumonije, bolnički stečene pneumonije, akutne upale srednjeg uha, intraabdominalnih infekcija, kompliciranih infekcija urinarnog trakta (uključujući pijelonefritis), infekcija kostiju i zglobova, kompliciranih infekcija kože i mekog tkiva, gonoreje, sifilisa i bakterijskog endokarditisa, a može se koristiti i za liječenje akutnih pogoršanja kronične opstruktivne bolesti pluća u odraslih te za liječenje diseminirane lajmske borelioze (rane (stadij II) i kasne (stadij III)) u odraslih i djece, uključujući novorođenčad stariju od 15 dana, za preoperativnu profilaksu infekcija na mjestu kirurškog zahvata, u liječenju bolesnika s febrilnom neutropenijom za koju se smatra da je posljedica bakterijske infekcije, u liječenju bolesnika s bakterijemijom koja je povezana, ili se sumnja da je povezana, s bilo kojim od gore navedenih infekcija (vidjeti sažetak opisa svojstava lijeka za cjeloviti opis indikacije(a)). Ceftriakson Qilu 1 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju i Ceftriakson Qilu 2 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju sadrži ceftraiskonnatrij kao djelatnu tvar i primjenjuje se intramuskularno ili intravenski kao injekcija ili infuzija.

II. Rizici povezani s lijekom i aktivnosti za njihovu minimizaciju i/ili daljnju karakterizaciju

Važni rizici lijeka Ceftriakson Qilu 1 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju i Ceftriakson Qilu 2 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju zajedno s mjerama za njihovu minimizaciju i predloženim studijama za daljnju karakterizaciju rizika lijeka Ceftriakson Qilu 1 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju i Ceftriakson Qilu 2 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju opisani su u nastavku.

Mjere za minimizaciju identificiranih rizika lijeka mogu biti:

- Određene informacije poput upozorenja, mjera opreza i uputa za ispravnu primjenu u uputi o lijeku namijenjenoj za bolesnike i u sažetku opisa svojstava lijeka namijenjenom za zdravstvene radnike
- Određene informacije na pakiranju lijekova
- Odobrene veličine pakiranja lijeka (količina lijeka u pakiranju je određena kako bi se osigurala ispravna primjena lijeka)
- Način propisivanja lijeka (način kako se lijek propisuje i izdaje bolesnicima (na recept ili bez recepta) koristi se u minimizaciji rizika lijeka).

Prethodno opisane mjere se nazivaju *rutinskim mjerama minimizacije rizika*.

Osim prethodno navedenih mjera, informacije o nuspojavama se kontinuirano prikupljaju i redovito analiziraju kako bi se provele trenutne akcije ako je potrebno. Ove mjere sačinjavaju *rutinske farmakovigilancijske aktivnosti*.

II.A Popis važnih rizika i informacija koje nedostaju

Važni rizici lijeka Ceftriakson Qilu 1 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju i Ceftriakson Qilu 2 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju su rizici koji zahtijevaju posebne aktivnosti kako bi se minimizirali ili dodatno istražili s ciljem sigurne primjene lijeka. Važni rizici mogu biti identificirani ili potencijalni. Identificirani rizici su oni za koje postoji dovoljno dokaza da su povezani s primjenom lijeka Ceftriakson Qilu 1 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju i Ceftriakson Qilu 2 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju. Potencijalni rizici su oni za koje je povezanost s primjenom lijeka moguća temeljem dostupnih podataka, ali nije još potvrđena i zahtijeva daljnja istraživanja. Informacije koje nedostaju su informacije o sigurnoj primjeni lijeka koje je potrebno prikupiti jer trenutno nisu dostupne (npr. informacije o dugotrajnoj primjeni lijeka).

Popis važnih rizika i informacija koje nedostaju	
Važni identificirani rizici	Nema
Važni potencijalni rizici	Nema
Informacije koje nedostaju	Nema

II.B Sažetak važnih rizika

Sigurnosne informacije u odobrenim informacijama o lijeku (sažetak opisa svojstava lijeka i uputa o lijeku) su jednake onima referentnog lijeka.

II.C Post-autorizacijski razvojni plan

II.C.1 Studije koje su uvjet odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Nema studija koje su uvjet odobrenja za stavljanje lijeka u promet ili posebna obveza lijeka Ceftriakson Qilu 1 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju i Ceftriakson Qilu 2 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju.

II.C.2 Druge studije u post-autorizacijskom razvojnom planu

Nije zatraženo provođenje studija za lijek Ceftriakson Qilu 1 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju i Ceftriakson Qilu 2 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju.