

Part VI Sažetak plana upravljanja rizikom

Sažetak plana upravljanja rizikom za lijek Piperacilin/tazobaktam Qilu 4 g/0,5 g prašak za otopinu za infuziju (piperacilin/tazobaktam)

Ovo je sažetak plana upravljanja rizikom (engl. *Risk Management Plan*, RMP) za lijek Piperacilin/tazobaktam Qilu 4 g/0,5 g prašak za otopinu za infuziju (piperacilin/ tazobaktam). Plan upravljanja rizikom (RMP) opisuje važne rizike lijeka Piperacilin/tazobaktam Qilu 4 g/0,5 g prašak za otopinu za infuziju, načine kako se oni mogu minimizirati te kako se mogu prikupiti dodatne informacije o rizicima i informacijama koje nedostaju lijeka Piperacilin/tazobaktam Qilu 4 g/0,5 g prašak za otopinu za infuziju.

Sažetak opisa svojstava lijeka Piperacilin/tazobaktam Qilu 4 g/0,5 g prašak za otopinu za infuziju i uputa o lijeku pružaju temeljne informacije zdravstvenim radnicima i bolesnicima o tome kako se lijek Piperacilin/tazobaktam Qilu 4 g/0,5 g prašak za otopinu za infuziju (piperacilin/ tazobaktam) treba primjenjivati.

Važni novi rizici ili promjene postojećih biti će uključeni putem ažuriranja Plana upravljanja rizikom (RMP) za lijek Piperacilin/tazobaktam Qilu 4 g/0,5 g prašak za otopinu za infuziju.

I. Lijek i za što se primjenjuje

Lijek Piperacilin/tazobaktam Qilu 4 g/0,5 g prašak za otopinu za infuziju je odobren kod odraslih i adolescenata za liječenje teške pneumonije uključujući bolnički stečenu pneumoniju i pneumonije uzrokovane mehaničkom ventilacijom, komplicirane infekcije urinarnog trakta (uključujući pijelonefritis), komplicirane intraabdominalne infekcije i komplicirane infekcije kože i mekog tkiva (uključujući infekcije dijabetičkog stopala), te bakterijemiju koja prati ili je pod sumnjom da prati bilo koju od navedenih infekcija. Piperacilin/tazobaktam se može upotrijebiti i kod neutropeničnih bolesnika s vrućicom ako se sumnja da je uzrokovana bakterijskom infekcijom. Za djecu od 2 do 12 godina može se koristiti za liječenje komplicirane intraabdominalne infekcije i kod neutropenične djece s vrućicom, ako se sumnja da je uzrokovana bakterijskom infekcijom (vidjeti sažetak opisa svojstava lijeka za cjeloviti opis indikacije(a)). Piperacilin/tazobaktam Qilu 4 g/0,5 g prašak za otopinu za infuziju sadrži piperacilin i tazobaktam kao djelatne tvari i primjenjuje se intravenskim načinom primjene.

II. Rizici povezani s lijekom i aktivnosti za njihovu minimizaciju i/ili daljnju karakterizaciju

Važni rizici lijeka Piperacilin/tazobaktam Qilu 4 g/0,5 g prašak za otopinu za infuziju zajedno s mjerama za njihovu minimizaciju i predloženim studijama za daljnju karakterizaciju rizika lijeka Piperacilin/tazobaktam Qilu 4 g/0,5 g prašak za otopinu za infuziju opisani su u nastavku.

Mjere za minimizaciju identificiranih rizika lijeka mogu biti:

- Određene informacije poput upozorenja, mjera opreza i uputa za ispravnu primjenu u uputi o lijeku namijenjenoj za bolesnike i u sažetku opisa svojstava lijeka namijenjenom za zdravstvene radnike
- Određene informacije na pakiranju lijekova
- Odobrene veličine pakiranja lijeka (količina lijeka u pakiranju je određena kako bi se osigurala ispravna primjena lijeka)
- Način propisivanja lijeka (način kako se lijek propisuje i izdaje bolesnicima (na recept ili bez recepta) koristi se u minimizaciji rizika lijeka).

Prethodno opisane mjere se nazivaju *rutinskim mjerama minimizacije rizika*.

Osim prethodno navedenih mjera, informacije o nuspojavama se kontinuirano prikupljaju i redovito analiziraju kako bi se provele trenutne akcije ako je potrebno. Ove mjere sačinjavaju *rutinske farmakovigilancijske aktivnosti*.

II.A Popis važnih rizika i informacija koje nedostaju

Važni rizici lijeka Piperacilin/tazobaktam Qilu 4 g/0,5 g prašak za otopinu za infuziju su rizici koji zahtijevaju posebne aktivnosti kako bi se minimizirali ili dodatno istražili s ciljem sigurne primjene lijeka. Važni rizici mogu biti identificirani ili potencijalni. Identificirani rizici su oni za koje postoji dovoljno dokaza da su povezani s primjenom lijeka Piperacilin/tazobaktam Qilu 4 g/0,5 g prašak za otopinu za infuziju. Potencijalni rizici su oni za koje je povezanost s primjenom lijeka moguća temeljem dostupnih podataka, ali nije još potvrđena i zahtijeva daljnja istraživanja. Informacije koje nedostaju su informacije o sigurnoj primjeni lijeka koje je potrebno prikupiti jer trenutno nisu dostupne (npr. informacije o dugotrajnoj primjeni lijeka).

| Popis važnih rizika i informacija koje nedostaju | |
|---|------|
| Važni identificirani rizici | Nema |
| Važni potencijalni rizici | Nema |
| Informacije koje nedostaju | Nema |

II.B Sažetak važnih rizika

Sigurnosne informacije u odobrenim informacijama o lijeku (sažetak opisa svojstava lijeka i uputa o lijeku) su jednake onima referentnog lijeka.

II.C Post-autorizacijski razvojni plan

II.C.1 Studije koje su uvjet odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Nema studija koje su uvjet odobrenja za stavljanje lijeka u promet ili posebna obveza lijeka Piperacilin/tazobaktam Qilu 4 g/0,5 g prašak za otopinu za infuziju.

II.C.2 Druge studije u post-autorizacijskom razvojnom planu

Nije zatraženo provođenje studija za lijek Piperacilin/tazobaktam Qilu 4 g/0,5 g prašak za otopinu za infuziju.