

KARTICA ZA BOLESNIKA

Aboxoma (apiksaban)



XXXX

Ovu karticu uvijek nosite sa sobom / Ovu karticu dijete ili njegovatelj moraju uvijek nositi sa sobom
Pokažite ovu karticu ljekarniku, stomatologu ili bilo kojem drugom zdravstvenom radniku prije liječenja.
Liječim se antikoagulacijskim lijekom Aboxoma (apiksaban) koji sprječava zgrušavanje krvi.

Informacija za bolesnike / njegovatelje



- ♦ Lijek Aboxoma uzimajte/davajte redovito, prema uputama. Ako propustite jutarnju dozu, uzmite/dajte ju čim se sjetite ili zajedno s večernjom dozom. Propuštena večernja doza može se uzeti/dati samo tijekom iste večeri. Ne smijete uzeti/dati dvije doze sljedeće jutro, već sljedeći dan trebate nastaviti prema uobičajenom rasporedu uzimanja dvaput na dan, kako je preporučeno.
- ♦ Nemojte prestati uzimati/davati lijek Aboxoma bez razgovora s liječnikom, s obzirom na to da je bolesnik izložen riziku od moždanog udara (odrasli)/stvaranja krvnog ugruška (pedijatrijski bolesnici) ili drugih komplikacija.
- ♦ Aboxoma pomaže razrijediti krv. Međutim, to može povisiti rizik od krvarenja. Znakovi i simptomi krvarenja uključuju stvaranje modrica ili krvarenje ispod kože, crno obojenu stolicu, krv u mokraći, krvarenje iz nosa, omaglicu, umor, bljedilo ili slabost, iznenadnu tešku glavobolju, iskašljavanje krvi ili povraćanje krvi.
- ♦ Ako krvarenje ne prestane samo od sebe, **odmah zatražite medicinsku pomoć.**
- ♦ Ako Vi/bolesnik trebate/treba ići na operaciju ili bilo kakav invazivni postupak, obavijestite liječnika da uzimate lijek Aboxoma / obavijestite zdravstvenog radnika da dijete uzima lijek Aboxoma.

{MMM GGGG}

Informacija za zdravstvene radnike

- ◆ Aboxoma (apiksaban) je oralni antikoagulans, koji djeluje izravnom selektivnom inhibicijom faktora Xa.
- ◆ Aboxoma može povećati rizik od krvarenja. U slučajevima jakih krvarenja, potrebno je odmah prekinuti primjenu.
- ◆ Liječenje lijekom Aboxoma ne zahtijeva rutinsko praćenje izloženosti. Kalibrirano kvantitativno određivanje sadržaja anti-faktora Xa može biti korisno u iznimnim situacijama, primjerice kod predoziranja i hitnih operacija (testovi zgrušavanja: protrombinsko vrijeme (PV),

međunarodni normalizirani omjer (INR) i aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme (aPTV) se ne preporučuju – vidjeti sažetak opisa svojstava lijeka.

- ◆ Dostupan je lijek za reverziju anti-faktor Xa aktivnosti apiksabana za odrasle, međutim, njegova sigurnost i djelotvornost nisu ustanovljene u pedijatrijskih bolesnika (vidjeti sažetak opisa svojstava lijeka za andeksanet alfa).

Molimo Vas ispunite ovaj dio ili zamolite liječnika da ga ispuni

Ime i prezime: _____

Datum rođenja: _____

Indikacija: _____

Tjelesna težina (za pedijatrijsku populaciju): _____

Doza: _____ mg dvaput na dan

Ime i prezime liječnika: _____

Broj telefona liječnika: _____