

KARTICA S UPOZORENJIMA ZA BOLESNIKA

Dabigatraneteksilat Accord
dabigatraneteksilat

- Vi / njegovatelj morate u svakom trenutku imati ovu karticu sa sobom
- Budite sigurni da koristite najnoviju verziju (svibanj 2023)

Poštovani bolesniče / njegovatelju pedijatrijskog bolesnika,

Vaš liječnik / liječnik Vašeg djeteta počeo je liječenje lijekom Dabigatraneteksilat Accord. U cilju sigurne primjene lijeka Dabigatraneteksilat Accord, molimo uzmite u obzir važne informacije koje se nalaze u uputi o lijeku.

S obzirom da ova Kartica s upozorenjima za bolesnika sadrži važne informacije o Vašem liječenju / liječenju Vašeg djeteta, ona mora uvijek biti s Vama / Vašim djetetom kako biste Vi / Vaše dijete mogli informirati zdravstvene radnike da primjenjujete Dabigatraneteksilat Accord.

Dabigatraneteksilat Accord Informacije za bolesnike / njegovatelje pedijatrijskih bolesnika

O Vašem liječenju / liječenju Vašeg djeteta

- Dabigatraneteksilat Accord razrjeđuje krv. Koristi se za liječenje postojećih krvnih ugrušaka ili za sprječavanje stvaranja opasnih krvnih ugrušaka.
- Slijedite upute svog liječnika / liječnika svog djeteta tijekom primjene lijeka Dabigatraneteksilat Accord. Ne propustajte uzeti dozu i ne prekidajte uzimanje lijeka Dabigatraneteksilat Accord bez savjetovanja sa svojim liječnikom / liječnikom svog djeteta.
- Obavijestite svog liječnika / liječnika svog djeteta o svim lijekovima koje Vi / Vaše dijete trenutno uzimate.
- Obavijestite svog liječnika / liječnika svog djeteta o uzimanju lijeka Dabigatraneteksilat Accord prije svakog kirurškog/invazivnog zahvata.
- Dabigatraneteksilat Accord kapsule se mogu uzimati sa hranom ili bez nje. Kapsulu je potrebno progutati cijelu s čašom vode. Kapsule se ne smiju lomiti ili žvakati, a peleti se ne smiju prazniti iz kapsule.

Kada potražiti liječnički savjet

- Uzimanje lijeka Dabigatraneteksilat Accord može povećati rizik od krvarenja. Odmah se obratite svom liječniku / liječniku svog djeteta ako se u Vas / Vašeg djeteta jave znakovi i simptomi krvarenja poput: oticanja, nelagode, neobične boli ili glavobolje, omaglice, bljedila, slabosti, neobičnih modrica, krvarenja iz nosa, krvarenja desni, neobično dugotrajnog krvarenja iz posjekotina, abnormalnog menstruacijskog ili vaginalnog krvarenja, krvi u mokraći koja može biti ružičasta ili smeđa, crvene/crne stolice, iskašljavanja krvi, povraćanja krvi ili sadržaja nalik talogu kave.
- U slučaju pada ili ozljede, osobito udarca u glavu, hitno potražite liječnički savjet.
- Ne prekidajte uzimanje lijeka Dabigatraneteksilat Accord bez savjetovanja sa svojim liječnikom / liječnikom svog djeteta ako Vi / Vaše dijete osjetite žgaravicu, mučninu, povraćate, imate nelagodu u trbuhu, nadutost ili bol u gornjem dijelu trbuha.

Dabigatraneteksilat Accord Informacije za zdravstvene radnike

- Dabigatraneteksilat Accord je oralni antikoagulans (direktni inhibitor trombina).

- Primjena lijeka Dabigatraneteksilat Accord možda se mora prekinuti prije kirurškog ili drugog invazivnog postupka.
- U slučaju velikih krvarenja, primjena lijeka Dabigatraneteksilat Accord se mora odmah prekinuti.
- Specifičan antagonist (idarucizumab) dostupan je za odrasle bolesnike. Nije ustanovljena djelotvornost i sigurnost specifičnog antagonista idarucizumaba u pedijatrijskih bolesnika. Za detalje i više savjeta o antagoniziranju antikoagulacijskog učinka lijeka Dabigatraneteksilat Accord pogledajte Sažetak opisa svojstava lijeka za Dabigatraneteksilat Accord i idarucizumab.
- Dabigatraneteksilat Accord se uglavnom eliminira putem bubrega; odgovarajuća diureza se mora održavati. Dabigatraneteksilat Accord se može dijalizirati.

Molimo da Vi / Vaše dijete ispunite ovaj dio ili zamolite liječnika da to učini.

Podaci o bolesniku

Ime bolesnika

Datum rođenja

Indikacija za antikoagulaciju

>>>>>Doza lijeka Dabigatraneteksilat Accord