

KARTICA S UPOZORENJIMA ZA BOLESNIKA

Sadržaj

Dabigatraneteksilat Genericon 75 mg tvrde kapsule
Dabigatraneteksilat Genericon 110 mg tvrde kapsule
Dabigatraneteksilat Genericon 150 mg tvrde kapsule
dabigatraneteksilat

- Vi / njegovatelj morate u svakom trenutku imati ovu karticu sa sobom
- Budite sigurni da koristite najnoviju verziju

[26.10. 2023]

[Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H]

Poštovani bolesniče / njegovatelju pedijatrijskog bolesnika,

Vaš liječnik / liječnik Vašeg djeteta je započeo liječenje lijekom Dabigatraneteksilat Genericon (dabigatraneteksilat). U cilju sigurne primjene lijeka Dabigatraneteksilat Genericon, molimo uzmite u obzir važne informacije koje se nalaze u uputi o lijeku.

S obzirom da ova Kartica s upozorenjima za bolesnika sadrži važne informacije o Vašem liječenju / liječenju Vašeg djeteta, ona mora uvijek biti s Vama / Vašim djetetom kako biste Vi / Vaše dijete mogli informirati zdravstvene radnike da primjenjujete Dabigatraneteksilat Genericon.

Dabigatraneteksilat Genericon Informacije za bolesnike / njegovatelje pedijatrijskih bolesnika

O Vašem liječenju / liječenju Vašeg djeteta

- Dabigatraneteksilat Genericon razrjeđuje krv. Koristi se za liječenje postojećih krvnih ugrušaka ili za sprječavanje stvaranja opasnih krvnih ugrušaka.
- Slijedite upute svog liječnika tijekom primjene lijeka Dabigatraneteksilat Genericon. Nikada ne propustajte uzeti dozu i ne prekidajte uzimanje lijeka Dabigatraneteksilat Genericon bez savjetovanja sa svojim liječnikom / liječnikom svog djeteta.
- Obavijestite svog liječnika / liječnika svog djeteta o svim lijekovima koje Vi / Vaše dijete trenutno uzimate.
- Obavijestite svog liječnika / liječnika svog djeteta o uzimanju lijeka Dabigatraneteksilat Genericon prije svakog kirurškog/invazivnog zahvata.
- Dabigatraneteksilat Genericon se može uzimati sa hranom ili bez nje. Kapsulu je potrebno progutati cijelu s čašom vode. Kapsula se ne smije lomiti ili žvakati, a peleti se ne smiju prazniti iz kapsule.

Kada potražiti liječnički savjet

- Uzimanje lijeka Dabigatraneteksilat Genericon može povećati rizik od krvarenja. Odmah se obratite svom liječniku / liječniku svog djeteta ako se u Vas / Vašeg djeteta jave znakovi i simptomi krvarenja poput:
oticanja, nelagode, neobične boli ili glavobolje, omaglice, bljedila, slabosti, neobičnih modrica, krvarenja iz nosa, krvarenja desni, neobično dugotrajnog krvarenja iz posjekotina, abnormalnog menstrualnog ili vaginalnog krvarenja, krvi u mokraći koja može biti ružičasta ili smeđa, crvene/crne stolice, iskašljavanja krvi, povraćanja krvi ili sadržaja nalik talogu kave.
- U slučaju pada ili ozljede, osobito udarca u glavu, hitno potražite liječnički savjet.
- Ne prekidajte uzimanje lijeka Dabigatraneteksilat Genericon bez savjetovanja sa svojim liječnikom / liječnikom svog djeteta ako osjetite žgaravicu, mučninu, povraćate, imate nelagodu u trbuhu, nadutost ili bol u gornjem dijelu trbuha.

Dabigatraneteksilat Genericon Informacije za zdravstvene radnike

- Dabigatraneteksilat Genericon je oralni antikoagulans (direktni inhibitor trombina).
- Primjena lijeka Dabigatraneteksilat Genericon možda se mora prekinuti prije kirurškog ili drugog invazivnog postupka.
- U slučaju velikih krvarenja, primjena lijeka Dabigatraneteksilat Genericon se mora odmah prekinuti.
- Specifičan antagonist (idarucizumab) dostupan je za odrasle bolesnike. Nije ustanovljena djelotvornost i sigurnost specifičnog antagonista idarucizumaba u pedijatrijskih bolesnika. (Za detalje i više savjeta o antagoniziranju antikoagulacijskog učinka lijeka Dabigatraneteksilat Genericon, pogledajte sažetak opisa svojstava lijeka za Dabigatraneteksilat Genericon i idarucizumab).
- Dabigatraneteksilat Genericon se uglavnom eliminira putem bubrega; odgovarajuća diureza se mora održavati. Dabigatraneteksilat Genericon se može dijalizirati.

Molimo da Vi / Vaše dijete ispunite ovaj dio ili zamolite svog liječnika / liječnika svog djeteta da to učini.

Podaci o bolesniku

Ime bolesnika

Datum rođenja

Indikacija za antikoagulaciju

Doza lijeka Dabigatraneteksilat Genericon