

KARTICA S UPOZORENJIMA ZA BOLESNIKA

Dabigatraneteksilat Viatris 110 mg tvrde kapsule

- Vi / njegovatelj morate u svakom trenutku imati ovu karticu sa sobom
- Provjerite koristite li najnoviju verziju

Poštovani bolesniče/njegovatelju pedijatrijskog bolesnika,
Vaš liječnik/liječnik Vašeg djeteta započeo je liječenje lijekom Dabigatraneteksilat Viatris. U cilju sigurne primjene lijeka Dabigatraneteksilat Viatris, molimo uzmite u obzir važne informacije koje se nalaze u uputi o lijeku.

S obzirom da ova kartica s upozorenjima za bolesnika sadrži važne podatke o Vašem liječenju/liječenju Vašeg djeteta, ona mora uvijek biti uz Vas/Vaše dijete kako biste obavijestili zdravstvene djelatnike da Vi/Vaše dijete koristite Dabigatraneteksilat Viatris.

Dabigatraneteksilat Viatris Informacije za bolesnike/njegovatelje pedijatrijskih bolesnika

O Vašem liječenju/liječenju Vašeg djeteta

- Dabigatraneteksilat Viatris razrjeđuje krv. Koristi se za liječenje postojećih krvnih ugrušaka ili za sprječavanje stvaranja opasnih krvnih ugrušaka.
- Slijedite upute svog liječnika/liječnika svog djeteta prilikom primjene lijeka Dabigatraneteksilat Viatris. Ne propušljajte uzeti dozu i ne prekidajte uzimanje lijeka Dabigatraneteksilat Viatris bez savjetovanja sa svojim liječnikom / liječnikom svog djeteta.
- Obavijestite svog liječnika/liječnika svog djeteta o svim lijekovima koje Vi/Vaše dijete trenutno uzimate.
- Obavijestite svog liječnika/ liječnika svog djeteta o uzimanju lijeka Dabigatraneteksilat Viatris prije svakog kirurškog/invazivnog zahvata.
- Dabigatraneteksilat Viatris kapsule mogu se uzimati sa ili bez hrane. Kapsulu treba progutati cijelu s čašom vode. Kapsula se ne smije lomiti ili žvakati, a peleti se ne smiju prazniti iz kapsule.

Kada potražiti savjet liječnika

- Uzimanje lijeka Dabigatraneteksilat Viatris može povećati rizik od krvarenja. Odmah se obratite svom liječniku / liječniku svog djeteta ako Vi /Vaše dijete osjetite znakove i simptome krvarenja kao što su: oticanje, nelagoda, neobična bol ili glavobolja, omaglica, bljedilo, slabost, neuobičajeno stvaranje modrica, krvarenje iz nosa, krvarenje desni, neuobičajeno dugotrajno krvarenje iz posjekotina, abnormalno menstruacijsko ili vaginalno krvarenje, krv u mokraći koja može biti ružičasta ili smeđa, crvena/crna stolica, iskašljavanje krvi, povraćanje krvi ili sadržaja nalik talogu kave.
- U slučaju pada ili ozljede, osobito udarca u glavu, hitno potražite savjet liječnika.
- Nemojte prestati uzimati lijek Dabigatraneteksilat Viatris bez razgovora sa svojim/liječnikom svog djeteta, ako Vi/Vaše dijete osjetite žgaravicu, mučninu, povraćanje, nelagodu u trbuhi, nadutost ili bol u gornjem dijelu trbuha.

Dabigatraneteksilat Viatris Informacije za zdravstvene djelatnike

- Dabigatraneteksilat Viatris je oralni antikoagulans (direktni inhibitor trombina).
 - Primjenu lijeka Dabigatraneteksilat Viatris možda može biti potrebno prekinuti prije kirurškog ili drugog invazivnog postupka.
 - U slučaju većih krvarenja, primjena lijeka Dabigatraneteksilat Viatris mora se odmah prekinuti.
 - Specifičan antagonist (idarucizumab) dostupan je za odrasle bolesnike. Nije ustanovljena djelotvornost i sigurnost specifičnog antagonista idarucizumaba u pedijatrijskim bolesnicima.
- Za pojedinosti i dodatne savjete o antagoniziranju antikoagulacijskog učinka lijeka Dabigatraneteksilat Viatris, molimo pogledajte Sažetak opisa svojstava lijeka za Dabigatraneteksilat Viatris i idarucizumab.
- Dabigatraneteksilat Viatris se uglavnom eliminira putem bubrega; mora se održavati odgovarajuća diureza. Dabigatraneteksilat Viatris se može dijalizirati.

Molimo da ispunite ovaj dio ili zamolite svog liječnika/ liječnika svog djeteta da to učini.

Podaci o bolesniku

Ime bolesnika

Datum rođenja

Indikacija za antikoagulaciju

Doza lijeka Dabigatraneteksilat Viatris