

## KARTICA S UPOZORENJIMA ZA BOLESNIKA

### Kartica s upozorenjima za bolesnika

Xaboplax 2,5 mg  (kućica za označavanje propisane doze kvačicom)

Xaboplax 10 mg  (kućica za označavanje propisane doze kvačicom)

Xaboplax 15 mg  (kućica za označavanje propisane doze kvačicom)

Xaboplax 20 mg  (kućica za označavanje propisane doze kvačicom)

- ◆ Imajte ovu karticu uz sebe u svakom trenutku
- ◆ Pokažite ovu karticu svakom liječniku ili stomatologu prije liječenja

### Ja sam na antikoagulacijskoj terapiji lijekom Xaboplax (rivaroksaban)

Ime i prezime:

Adresa:

Datum rođenja:

Tjelesna težina:

Drugi lijekovi / stanja:

### U hitnom slučaju molim obavijestite:

Ime i prezime liječnika:

Broj telefona liječnika:

Faksimil liječnika:

### Molim također obavijestite:

Ime i prezime:

Broj telefona:

Srodstvo:

### Obavijest za zdravstvene radnike:

◆ INR vrijednosti se ne bi smjele koristiti jer nisu pouzdana mjera antikoagulacijske aktivnosti lijeka Xaboplax.

### Što trebam znati o lijeku Xaboplax?

- ◆ Xaboplax razrjeđuje krv i tako Vas štiti od stvaranja opasnih krvnih ugrušaka.
- ◆ Xaboplax morate uzimati točno prema uputama liječnika. Kako bi osigurali optimalnu zaštitu od stvaranja krvnih ugrušaka, **nikad nemojte propustiti dozu lijeka.**
- ◆ Ne smijete prestati uzimati Xaboplax bez prethodnog savjetovanja s liječnikom jer se tako može povećati rizik od stvaranja krvnih ugrušaka.
- ◆ Obavijestite svog liječnika ako trenutno uzimate bilo koje druge lijekove, ili ste ih nedavno uzimali ili ih namjeravate početi uzimati, prije nego počnete uzimati Xaboplax.
- ◆ Obavijestite liječnika da uzimate lijek Xaboplax prije bilo kakve operacije ili invazivnog postupka.

### Kada trebam potražiti savjet liječnika?

Prilikom uzimanja antikoagulacijskih lijekova kao što je Xaboplax, važno je biti svjestan mogućih nuspojava. Krvarenje je najčešća nuspojava. Ne započinjite uzimati Xaboplax bez prethodnog dogovora s liječnikom ukoliko znate da ste izloženi riziku od krvarenja. Odmah obavijestite svog liječnika ukoliko imate neki od znakova ili simptoma krvarenja poput sljedećih:

- ◆ bol
- ◆ oticanje ili nelagodu
- ◆ glavobolju, omaglicu ili slabost
- ◆ neobično stvaranje modrica, krvarenje iz nosa, krvarenje iz desni, rane kojima treba dugo da

prestanu krvariti

- ◆ menstrualno ili vaginalno krvarenje obilnije nego uobičajeno
- ◆ krv u mokraći koja može biti ružičasta ili smeđa, crvenu ili crnu stolicu
- ◆ iskašljavanje krvi ili povraćanje krvi ili sadržaja nalik talogu crne kave

### **Kako uzimati Xaboplax?**

- ◆ Kako bi se osigurala optimalna zaštita, Xaboplax
  - od 2,5 mg može se uzimati s hranom ili bez nje
  - od 10 mg može se uzimati s hranom ili bez nje
  - od 15 mg se mora uzimati s hranom
  - od 20 mg se mora uzimati s hranom.