

KARTICA ZA BOLESNIKA

Welireg ▼ (belzutifan)

- Nemojte uzimati WELIREG za von Hippel Lindauovu bolest ako ste trudni.
- Ako ste trudni i potrebna Vam je terapija za karcinom bubrežnih stanica, razgovarajte s liječnikom o primjeni lijeka WELIREG.
- WELIREG može naškoditi djetetu i uzrokovati spontani pobačaj. Ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.
- Liječnik će Vam napraviti test na trudnoću prije nego počnete uzimati WELIREG.
- Ne smijete zatrudnjati dok uzimate WELIREG.

Kontrola začeca (kontracepcija)

- Ako ste žena koja bi mogla zatrudnjati:
 - metode kontrole začeca koje sadrže hormone - poput pilula, injekcija ili transdermalnih naljepaka za kontrolu začeca - možda neće biti jednako djelotvorne dok uzimate WELIREG.
 - dok uzimate WELIREG i još najmanje tjedan dana nakon uzimanja posljednje doze:
 - morate koristiti učinkovitu nehormonsku metodu kontrole začeca (kontracepcije) ili
 - Vaš partner mora koristiti prezervativ.
- Razgovarajte s liječnikom ili ljekarnikom o tome koje bi metode kontrole začeca bile dobre za Vas dok uzimate WELIREG.
- Odmah obavijestite svog liječnika ako zatrudnite ili mislite da ste možda zatrudnjeli tijekom liječenja.

Za više informacija pročitajte uputu o lijeku za WELIREG koja sadrži informacije za bolesnika.

Važni kontaktni podaci

Ime liječnika

Telefonski broj ordinacije

Telefonski broj nakon radnog vremena

Moje ime
