

Kartica za bolesnika

**Važna informacija za bolesnice
koje mogu zatrudnjeti**

WELIREG® (belzutifan)



Ne smijete zatrudnjeti dok
uzimate WELIREG.

Ako ste trudni:

- Nemojte uzimati WELIREG za von Hippel Lindauovu bolest.
- Razgovarajte s liječnikom o primjeni lijeka WELIREG za liječenje karcinoma bubrežnih stanica.
- WELIREG može naškoditi djetetu u maternici i uzrokovati spontani pobačaj.
- Ako ste trudni, mislite da ste trudni, zatrudnite, ili želite zatrudnjeti, prije i za vrijeme liječenja lijekom WELIREG, odmah se obratite svom liječniku.

- Liječnik će Vam napraviti test na trudnoću prije nego počnete uzimati WELIREG.

Kontrola začeća (kontracepcija)

- Metode kontrole začeća koje sadrže hormone - poput pilula, injekcija ili transdermalnih naljepaka za kontrolu začeća - možda neće biti jednako djelotvorne dok uzimate WELIREG.
- Koristite pouzdanu nehormonsku metodu kontrole začeća ili Vaš partner mora koristiti prezervativ radi sprječavanja začeća. Tako postupajte dok uzimate WELIREG i još najmanje tjedan dana nakon uzimanja posljednje doze.
- Razgovarajte s liječnikom ili ljekarnikom o tome koje bi metode kontrole začeća bile dobre za Vas.

Za više informacija pažljivo pročitajte uputu o lijeku.

Važni kontaktni podaci

Moje ime

Ime liječnika

Telefonski broj ordinacije
