

Kartica za bolesnika, Olumiant (baricitinib) u indikacijama reumatoidnog artritisa i juvenilnog idiopatskog artritisa

Ova kartica predstavlja edukacijski materijal koji je obavezan kao uvjet za stavljanje lijeka Olumiant u promet, u cilju dodatne minimizacije važnih odabranih rizika.

Bez promidžbenog sadržaja.

Informacije navedene u ovom edukacijskom materijalu ne zamjenjuju one navedene u uputi o lijeku koja je priložena svakom pakiranju ovog lijeka. Za potpune informacije prije primjene lijeka pročitajte uputu o lijeku (dostupna u svakom pakiranju lijeka i na <http://www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova>).

Ovaj edukacijski materijal možete pronaći na internetskim stranicama Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) u dijelu Farmakovigilancija/Mjere minimizacije rizika.

Molimo, nosite ovu karticu sa sobom i pokažite je svim zdravstvenim radnicima koji sudjeluju u Vašem liječenju.

.....
Vaše ime:

.....
Ime liječnika (koji je propisao Olumiant):

.....
Broj telefona liječnika:

Informacije o lijeku OLUMIANT (baricitinib) za bolesnike

Ovaj dokument sadrži važne informacije s kojima morate biti upoznati prije i tijekom liječenja lijekom Olumiant.

The Lilly logo, featuring the word "Lilly" in a red, cursive script font.

Verzija 5, srpanj 2026.

Trudnoća:

- Nemojte uzimati Olumiant ako ste trudni ili mislite da biste mogli biti trudni.
- Koristite učinkovitu kontracepciju tijekom liječenja lijekovima Olumiant (i još tjedan dana nakon njegova završetka).
- Odmah obavijestite svog liječnika ako zatrudnite (ili želite zatrudnjeti).

Infekcije:

Olumiant može pogoršati postojeću infekciju ili povećati vjerojatnost razvoja nove infekcije ili povećati vjerojatnost reaktivacije virusa. Ako imate šećernu bolest ili ste stariji od 65 godina, možete biti podložniji razvoju infekcija. Infekcija može postati ozbiljna ako se ne liječi. Odmah se obratite svom liječniku ako primijetite simptome infekcije, kao što su:

- vrućica, rane, pojačan umor ili problemi sa zubima
- kašalj koji ne prolazi, noćno znojenje i gubitak tjelesne težine. To bi mogli biti simptomi tuberkuloze (zarazne bolesti pluća)
- bolan kožni osip praćen mjehurićima. To bi mogao biti znak infekcije koja se zove herpes zoster

Nemelanomski rak kože:

U bolesnika liječenih lijekovima Olumiant opažen je nemelanomski rak kože. Obavijestite svog liječnika ako tijekom ili nakon liječenja primijetite nove kožne lezije ili promjenu izgleda postojećih lezija.

Krvni ugrušci:

Olumiant može uzrokovati stanje kod kojega dolazi do nastanka krvnih ugrušaka u nozi, koji zatim mogu dospjeti u pluća. Odmah se obratite svom liječniku ako primijetite bilo koji od sljedećih simptoma:

- oticanje ili bol u jednoj nozi ili ruci
- toplina ili crvenilo na jednoj nozi ili ruci
- neočekivan nedostatak zraka
- ubrzano disanje
- bol u prsnoj koži

Srčani ili moždani udar:

Odmah obavijestite svog liječnika ako primijetite bilo što od sljedećega:

- jaku bol ili stezanje u prsnoj koži (koji se mogu proširiti na ruke, čeljust, vrat, leđa)
- nedostatak zraka
- hladan znoj
- slabost u jednoj ruci i/ili nozi
- nerazgovijetan govor

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u uputi o lijeku. Nuspojave možete prijaviti izravno Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) putem internetske stranice www.halmed.hr. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.