

## **Kartica za bolesnika s upozorenjima o lijeku Erelzi (etanercept) ▼**

Ova Kartica za bolesnika s upozorenjima sadrži važne sigurnosne informacije kojih morate biti svjesni prije nego što dobijete Erelzi te za vrijeme liječenja tim lijekom. Upitajte svog liječnika ako ne razumijete ove informacije.

- Bez promidžbenog sadržaja.
- ▼Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Upute za prijavljivanje dostupne su na [www.halmed.hr](http://www.halmed.hr)

- Ovaj edukacijski materijal možete pronaći na internetskim stranicama Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) u dijelu Farmakovigilancija/Mjere minimizacije rizika.
- Pokažite ovu karticu svakom liječniku koji je uključen u Vaše liječenje.
- Pročitajte i uputu o lijeku Erelzi za više informacija.

### **Primjena u djece i adolescenata (tjelesne težine ispod 62,5 kg)**

Erelzi se ne smije primjenjivati u djece i adolescenata tjelesne težine ispod 62,5 kg. Upitajte svog liječnika ako imate bilo kakvih pitanja oko toga.

### **Infekcije**

Erelzi može povećati rizik od infekcija, koje bi mogle biti ozbiljne.

- Ne smijete se liječiti Erelzijem ako imate infekciju. Ako niste sigurni, upitajte svog liječnika.
- Ako Vam se pojave simptomi koji ukazuju na infekciju, kao što su vrućica, ustrajni kašalj, gubitak težine ili bezvoljnost, odmah zatražite liječničku pomoć.
- Trebate obaviti pretragu na tuberkulozu (TB). Zamolite liječnika da upiše datume i rezultate Vašeg zadnjeg probira na TB u nastavku:

Pretraga: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Rezultati: \_\_\_\_\_

Pretraga: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Rezultati: \_\_\_\_\_

- Zamolite svog liječnika da navede Vaše ostale lijekove koji bi mogli povećati rizik od infekcija.

---

---

---

---

---

---

---

---

### **Kongestivno zatajenje srca**

Ako Vam se pojave simptomi koji **ukazuju na kongestivno zatajenje srca ili pogoršanje postojećeg kongestivnog zatajenja srca**, kao što su nedostatak zraka, oticanje gležnjeva, ustrajni kašalj ili umor, odmah zatražite liječničku pomoć.

### **Ostale informacije (popuniti):**

- Ime i prezime bolesnika: \_\_\_\_\_
- Ime i prezime liječnika: \_\_\_\_\_
- Telefonski broj liječnika: \_\_\_\_\_

**Nosite ovu karticu sa sobom za vrijeme liječenja Erelzijem te 2 mjeseca nakon posljednje doze Erelzija, budući da do nuspojava može doći i nakon posljednje doze Erelzija.**

**Važno je da Vi i Vaš liječnik zabilježite naziv i broj serije Vašeg lijeka.**

---

---

---

---

### **Prijavljivanje nuspojava**

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u uputi o lijeku. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) putem internetske stranice [www.halmed.hr](http://www.halmed.hr) ili potražite HALMED aplikaciju putem Google Play ili Apple App Store trgovine. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

verzija 1, svibanj, 2019.

ERE-2-28-B/HR2003808046/2020-03-09