

KARTICA ZA BOLESNIKA



Važne sigurnosne informacije za bolesnike koji primaju Soliris (ekulizumab)

Soliris može smanjiti sposobnost imunosnog sustava u borbi protiv infekcija, **osobito meningokokne infekcije, koja zahtijeva hitnu medicinsku pomoć.**

Ako imate bilo koji od sljedećih simptoma, morate **odmah obavijestiti svojeg liječnika ili potražiti hitnu medicinsku skrb, po mogućnosti u većem centru za hitnu medicinsku pomoć:**

- glavobolja praćena mučninom ili povraćanjem
- glavobolja s ukočenim vratom ili ukočenim leđima
- vrućica
- osip
- smetenost
- teška bol u mišićima sa simptomima nalik gripi
- osjetljivost očiju na svjetlost.



Odmah potražite hitnu medicinsku pomoć ako imate bilo koji od navedenih znakova ili simptoma i pokažite ovu karticu.

Nosite ovu karticu sa sobom cijelo vrijeme tijekom liječenja i 3 mjeseca nakon uzimanja posljednje doze lijeka Soliris. Rizik od meningokokne infekcije može postojati i nekoliko tjedana nakon posljednje doze lijeka Soliris.

Informacije za zdravstvene radnike

- Ovom je bolesniku propisana terapija lijekom Soliris (ekulizumab), kojom se povećava osjetljivost bolesnika na meningokoknu infekciju (*Neisseria meningitidis*) ili druge opće infekcije.
- Svi bolesnici moraju biti cijepljeni najmanje 2 tjedna prije početka liječenja lijekom Soliris. Bolesnici u kojih liječenje započne u manje od 2 tjedna nakon primanja cjepiva protiv meningokoka moraju uzimati antibiotike do 2 tjedna nakon cijepljenja.
- Bolesnici moraju biti cijepljeni i ponovno cijepljeni sukladno važećim nacionalnim smjernicama za cijepljenje.
- Meningokokne infekcije mogu vrlo brzo postati opasne po život ili smrtonosne ako se ne prepoznaju i liječe rano.
- **Odmah procijenite ako se sumnja na infekciju i po potrebi liječite odgovarajućim antibioticima.**
- Čim prije se obratite liječniku koji propisuje terapiju (u nastavku).

Više informacija o lijeku Soliris potražite u sažetku opisa svojstava lijeka ili kontaktirajte tvrtku AstraZeneca d.o.o.

Kontakt podaci:

Ulica Vjekoslava Heinzela 70, 10 000 Zagreb

Tel. 01 4628 000

E-mail: MedicalInformationCRO@astrazeneca.com

www.astrazeneca.com

Ime i prezime bolesnika _____

Bolnica u kojoj se bolesnik liječi _____

Ime i prezime liječnika _____

Broj telefona _____

Datum(i) cijepljenja _____

Datum početka terapije lijekom Soliris _____

Informacije o cijepljenju protiv meningokokne infekcije:

Zaštićeni naziv cjepiva	Serogrupa cjepiva	Broj doze	Datum	Primarna serija/ Doza docjepljivanja	Primljena antibiotska profilaksa ako se terapija lijekom Soliris započne manje od 2 tjedna nakon cijepljenja
					☐ Nije primjenjivo ☐ Da, datum početka: _____
					☐ Nije primjenjivo ☐ Da, datum početka: _____
					☐ Nije primjenjivo ☐ Da, datum početka: _____

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u uputi o lijeku. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) putem internetske stranice www.halmed.hr. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.