

KONTROLNI POPIS ZA PROVJERU PRIJE PRIMJENE LIJEKA

Edukacijski materijal za zdravstvene radnike, bolesnike i njihove negovatelje
Ispunjava se prije supkutane (s.c.) primjene lijeka TYSABRI™ izvan bolničkog okruženja

U bolesnika koji su primali TYSABRI zabilježena je progresivna multifokalna leukoencefalopatija (PML), manje česta infekcija mozga koja može dovesti do teške onesposobljenosti ili smrti. Ovim Kontrolnim popisom trebaju se prije davanja injekcije lijeka Tysabri provjeriti znakovi i simptomi PML-a. Kontrolni popis za izvanbolničku primjenu lijeka Tysabri nije zamjena za zdravstvene preglede i pretrage koji su lokalno primjenjivi i provode ih zdravstveni radnici.

Prije ispunjavanja ovoga Kontrolnog popisa:

- **zdravstveni radnici** moraju pročitati EU Sažetak opisa svojstava lijeka TYSABRI s.c. i Tysabri (natalizumab) vodič za zdravstvene radnike
- **bolesnici i njihovi negovatelji** moraju proučiti Uputu o lijeku i Karticu za bolesnika.

KONTROLNI POPIS ZA PROVJERU PRIJE PRIMJENE LIJEKA

Br. PITANJE	AKO JE NA BILO KOJE PITANJE ODGOVOR "DA"	AKO JE NA SVA PITANJA ODGOVOR "NE"
1 Jesu li Vam se od zadnje primljene doze lijeka TYSABRI pojavili novi ili pogoršali postojeći simptomi od ovih navedenih u nastavku? • Promjene mentalnih sposobnosti i koncentracije • Promjene ponašanja • Slabost jedne strane tijela • Problemi s vidom • Novi simptomi povezani s mozgom ili živcima koji su za Vas neuobičajeni	 NEMOJTE primijeniti TYSABRI s.c. Odmah se obratite liječniku specijalistu.	 Možete primijeniti TYSABRI s.c.
2 Je li Vam od zadnje primljene doze lijeka TYSABRI dijagnosticirano neko novo zdravstveno stanje koje može oslabiti imunološki sustav (primjerice, nova infekcija ili rak)?		
3 Jeste li od zadnje primljene doze lijeka TYSABRI uzimali nove lijekove za liječenje multiple skleroze (MS) ili neke druge lijekove koji mogu oslabiti imunološki sustav?		