

RUCONEST® 2100 U prašak i otapalo za otopinu za injekciju

EDUKACIJSKI MATERIJAL / LISTA PROVJERE ZA BOLESNIKE

Opće informacije

- Postoje ograničeni podaci o primjeni Ruconesta za kućnu ili samostalnu primjenu.
- Vaš liječnik može odlučiti da se RUCONEST® može primjenjivati kod kuće, npr. samostalno ili od strane člana obitelji.
- Upotrijebite ovaj edukacijski materijal / listu provjere zajedno s uputom o lijeku. Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku.
- Osobe koje nisu zdravstveni radnici moraju steći nužne vještine prije primjene Ruconesta, kako bi se osigurala sigurna i učinkovita kućna primjena.

Podaci o bolesniku

(Molimo ispunite)

Vaše ime:

Vaša težina (kg):

Prije samostalne primjene Ruconesta Morate biti obaviješteni o navedenom:

Jeste li obaviješteni?
(Molimo označite ako je izvršeno.)

Indikacije: Liječenje akutnih napada nasljednog angioedema uslijed manjka C1 inhibitora esteraze, u odraslih osoba, adolescenata i djece u dobi od 2 godine i više,
Napomena: RUCONEST® se primjenjuje **samo za liječenje akutnih napada** uzrokovanih ovom bolesti.

Nemojte primjenjivati RUCONEST® ako ste alergični na kuniće ili sastojke Ruconesta.

Upozorenja i mjere opreza:

- Opasnost od alergijskih reakcija zbog prisutnosti tragova proteina kunića u Ruconestu. Za znakove i simptome alergijskih reakcija: vidjeti dio o nuspojavama u uputi o lijeku.
- Nemojte upravljati vozilima ni raditi sa strojevima ako osjetite vrtoglavicu ili glavobolju nakon primjene Ruconesta.

Primjena ostalih lijekova:

RUCONEST® se ne smije primjenjivati ako istodobno primete tkivni plazminogen, lijek za otapanje krvnih ugrušaka.

Trudnoća i dojenje: Ne preporučuje se primjena Ruconesta.

Doza za ubrizgavanje u venu za ranije navedenu tjelesnu težinu:

- Potreban broj** bočica s praškom i bočica s otapalom(Molimo ispunite)
(Od svake po jedna ako je tjelesna težina 42 kg ili manje i od svake po dvije ako je tjelesna težina iznad 42 kg).
- Potreban volumen** pripremljene otopine, sveukupno:ml
(= tjelesna težina u kg podijeljena s tri; najviše 28 ml).
- Volumen po štrcaljki** pripremljene otopine – prva štrcaljka: ml i druga štrcaljka: ml.

Može se primijeniti **dodatna doza** (ista doza kao gore) ako se simptomi ne poboljšaju nakon:

- 120 minuta za odrasle i adolescente.
- 60 minuta za djecu.

Moguće nuspojave: Pogledajte dio 4. upute o lijeku.

- Znakovi alergijskih reakcija, poput osipa, poteškoća s disanjem, oticanja lica ili jezika.
- Odmah zatražite liječničku pomoć ako se pojave nuspojave, osobito znakovi alergijske reakcije.

Pohrana:

Ne čuvati na temperaturi iznad 25 °C. Čuvati izvan pogleda i dohvata djece. Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Odmah primijenite pripremljenu otopinu lijeka RUCONEST®.

Jeste li obaviješteni?
(Molimo označite ako je izvršeno.)

Zbrinjavanje korištene opreme:

Pitajte svog liječnika o odgovarajućem zbrinjavanju svih korištenih materijala, uključujući djelomično iskorištene bočice i setove za infuziju, u skladu s propisima Vaše države.

Dokumentiranje svake primjene: npr. datum, vrijeme, broj serije.

Obuka za pripremu i primjenu otopine RUCONEST®:

- Dopustite liječniku da Vas podučí primjenjujući upute za uporabu u dijelu 3 priložene upute o lijeku – počevši od dijela „Prije početka“ i nastavljajući korak po korak do 14. koraka.
- Pažljivo **izvedite sve korake kako je opisano u tekstu i ilustracijama** u uputama za uporabu.
- Nikada nemojte** samostalno primjenjivati RUCONEST® ako Vas zdravstveni radnik **nije** prethodno **obučio** za to.

Pitajte liječnika ako imate bilo kakva pitanja u vezi uputa za uporabu i zapišite ih:

- Prije primjene:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Zabilježite bilo kakve dodatne informacije

Jeste li obaviješteni?
(Molimo označite ako je izvršeno.)

Procijenite: Možete li pripremiti i primijeniti otopinu RUCONEST®?

Nemojte samostalno primjenjivati RUCONEST® ako je Vaš odgovor na bilo koje navedeno pitanje „ne“ i obavijestite svog liječnika:

- Želite li samostalno pripremiti i samostalno si ubrizgavati RUCONEST® u venu? da ne
- Jeste li tjelesno sposobni za samostalnu pripremu i primjenu Ruconesta? da ne
- Jeste li razumjeli svaki korak u uputama za uporabu koje se nalaze u uputi o lijeku? da ne

Odmah zatražite liječničku pomoć ili, ako je potrebno, hitnu pomoć ako:

- Vi niste uspjeli probiti venu ili na neki drugi način niste uspjeli ubrizgati dozu.
- Vi doživite ozbiljan napad koji brzo napreduje, npr. oticanje grla.
- Vi niste sigurni kako ispravno izvesti sve korake.
- Ste Vi upotrijebili previše Ruconesta (više od preporučene doze).
- Ste Vi primijetili kako Vaši simptomi nisu počeli nestajati niti unutar 60 minuta (djeca 2-12 godina) ili unutar 120 minuta (adolescenti i odrasli) nakon ubrizgavanja druge doze Ruconesta.
- Vi primijetite znakove alergijske reakcije tijekom ili nakon primjene Ruconesta poput koprivnjače, osipa, svrbeža, vrtoglavice, piskanja, poteškoća s disanjem, oticanja lica ili jezika.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u uputi o lijeku. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) putem internetske stranice www.halmed.hr ili potražite HALMED aplikaciju putem Google Play ili Apple App Store trgovine. Prijavlivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.