

# UPOZORENJE

## Mogućnost netočnog očitavanja razine glukoze u krvi

Ime i prezime bolesnika

koristi **EXTRANEAL**  
otopinu za peritonejsku dijalizu

Koristiti **SAMO** one uređaje i test trake za određivanje glukoze koji su specifični za glukozu. Ove metode su uobičajene u kliničkim laboratorijima. Za popis kompatibilnih uređaja za određivanje glukoze, molimo posjetite internetsku stranicu [www.glucosesafety.com](http://www.glucosesafety.com). NEMOJTE koristiti uređaje ili test trake za određivanje glukoze koji se temelje na metodama glukoza dehidrogenaza pirolokinolinkinon (GDH-PQQ) ili glukoza-di-oksidoireduktaza. Osim toga, neki, ali ne svi uređaji ili test trake koji se temelje na metodi glukoza dehidrogenaza flavin-adenin dinukleotid (GDH-FAD) se ne smiju koristiti. Korištenje ovih metoda može dovesti do lažno povišenog očitavanja razine glukoze u krvi kod bolesnika koji koriste lijek **EXTRANEAL** zbog interferencije s maltozom. Lažno povišeno očitavanje razine glukoze u krvi može prikriti stvarnu hipoglikemiju ili dovesti do pogrešne dijagnoze hiperglikemije što može rezultirati događajima opasnim po život bolesnika. Za daljnje informacije kao i popis o kompatibilnosti uređaja za određivanje glukoze posjetite [www.glucosesafety.com](http://www.glucosesafety.com). Dodatno, možete kontaktirati proizvođača, odnosno zastupnika proizvođača u Republici Hrvatskoj, uređaja i test traka za određivanje glukoze kako biste saznali koja metoda se koristi u njihovim proizvodima.

**Baxter**

Verzija 4; studeni, 2022. HR-RC21-220002.

**BAXTER** i **EXTRANEAL** su zaštitni znakovi tvrtke Baxter International Inc.