

OBRAZAC ZA **NASTAVAK LIJEČENJA** TYSABRIJEM

Ovaj obrazac namijenjen je za podizanje svijesti o riziku od pojave PML-a i treba ga pažljivo pročitati prije nastavka liječenja TYSABRIJEM nakon više od 2 godine liječenja. Iako ste već primali TYSABRI tijekom 2 godine, važno je da se podsjetite da se rizik od pojave PML-a nakon tog vremena povećava. Molimo Vas da se pridržavate uputa iz ovog obrasca kako bi se osigurala potpuna informiranost i razumijevanje rizika od pojave PML-a (progresivne multifokalne leukoencefalopatije), IRIS-a (upalnog sindroma imunološke rekonstitucije) i ostalih važnih nuspojava lijeka TYSABRI.

Prije nastavka liječenja TYSABRIJEM trebate:

- pročitati uputu o lijeku koja je priložena svakoj kutiji TYSABRIJA
- pročitati Karticu za bolesnika koju će Vam dati Vaš liječnik
- razgovarati sa svojim liječnikom o koristima i rizicima koji su s povezani s ovim liječenjem

Uputa o lijeku i Kartica za bolesnika sadrže važne sigurnosne informacije o PML-u, manje čestoj infekciji mozga koja se pojavljivala u bolesnika koji su primali TYSABRI i koja može dovesti do teške invalidnosti ili smrti.

PML je povezan s nekontroliranim povećanjem JC virusa u mozgu, iako razlog tog povećanja u nekih bolesnika liječenih TYSABRIJEM nije poznat. JC virus je čest virus i zarazi mnogo ljudi, ali obično ne izaziva primjetnu bolest.

Rizik od pojave PML-a u bolesnika liječenih TYSABRIJEM je veći:

- ako imate prisutna protutijela na JC virus u krvi.
- što ste dulje liječeni TYSABRIJEM, posebno ako se liječite dulje od dvije godine.
- ako ste dobivali imunosupresiv (lijeak koji smanjuje aktivnost imunološkog sustava); bilo kada prije početka liječenja TYSABRIJEM.

Vaš liječnik bi Vam trebao pojasniti mogući rizik od razvoja PML-a prije nego što nastavite liječenje TYSABRIJEM.

Vaš liječnik može testirati Vašu krv kako bi provjerio imate li protutijela na JC virus prije nego što nastavite liječenje TYSABRIJEM.

Vaš liječnik može ponavljati ovaj test dok se liječite TYSABRIJEM kako bi provjerio je li se nešto promijenilo. Rizik od PML-a je veći ako imate sve čimbenike rizika opisane iznad ili ako niste uzimali imunosupresivni lijek prije početka liječenja TYSABRIJEM i imate povišene razine protutijela na JC virus i liječili ste se TYSABRIJEM dulje od 2 godine. Vaš liječnik će Vas pažljivo nadzirati ako ste u povećanom riziku od PML-a.

Trebate razmotriti sa svojim liječnikom je li TYSABRI najprikladniji lijek za Vas prije nego što nastavite liječenje TYSABRIJEM nakon više od dvije godine korištenja.

Kod bolesnika s PML-om, vjerojatna je pojava reakcije poznate kao IRIS (upalni sindrom imunološke rekonstitucije) nakon liječenja PML-a, kada je TYSABRI već uklonjen iz tijela. IRIS može dovesti do pogoršanja Vašeg stanja, uključujući pogoršanje funkcije mozga.

Uputu o lijeku trebate pročitati svaki put kada dobijete TYSABRI, jer u njoj može biti nova informacija koja je važna za Vaše liječenje.

Potrebno je da kod sebe imate Karticu za bolesnika kako bi Vas podsjetila na važne sigurnosne informacije, a posebno na sve simptome koji se mogu pojaviti i koji bi mogli upućivati na pojavu PML-a, te ako to bude primjenjivo, Karticu za bolesnika trebate pokazati svom partneru ili skrbniku.

Ako nemate uputu o lijeku ili Karticu za bolesnika, zamolite svog liječnika da Vam ih da prije započinjanja liječenja lijekom TYSABRI.

Potpisom na ovaj obrazac bolesnik potvrđuje kako je razumio rizik od nastanka PML-a, primio kopiju obrasca i Karticu za bolesnika.

Potpisom na ovaj obrazac liječnik potvrđuje kako je bolesniku ili njegovom skrbniku objasnio rizik od nastanka PML-a i IRIS-a.

Ime i prezime bolesnika:

Ime i prezime liječnika:

Potpis:

Potpis:

Datum potpisa:

Datum potpisa:

Datum nastavka liječenja:

Procjena rizika od PML-a:

STATUS ANTI-JCV PROTUTIJELA

Negativan status protutijela

0,1 / 1000 bolesnika

Pozitivan status protutijela

Procijenjen rizik od PML-a na 1000 bolesnika

Trajanje liječenja lijekom Tysabri	Bolesnici bez prethodne primjene imunosupresiva				Bolesnici s prethodnom primjenom imunosupresiva
	Bez vrijednosti indeksa	Indeks protutijela ≤ 0,9	Indeks protutijela > 0,9 ≤ 1,5	Indeks protutijela > 1,5	
1–12 mjeseci	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3
13–24 mjeseca	0,6	0,1	0,3	0,9	0,4
25–36 mjeseci	2	0,2	0,8	3	4
37–48 mjeseci	4	0,4	2	7	8
49–60 mjeseci	5	0,5	2	8	8
61–72 mjeseca	6	0,6	3	10	6

Bolesnici koji su negativni na anti-JCV protutijela

Na temelju globalnih podataka, ako nemate protutijela na JCV, vjerojatnost da dobijete PML je 0,1/1000 (ili 1 u 1000) bolesnika.

Bolesnici koji su pozitivni na anti-JCV protutijela

Ako imate protutijela na JCV, rizik od razvoja PML-a će se razlikovati ovisno o trajanju liječenja TYSABRIJEM, razini anti-JCV protutijela u Vašoj krvi te jeste li se prethodno liječili imunosupresivnim lijekovima. Vaš liječnik će razmotriti mogući rizik prije nego što nastavite liječenje.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u uputi o lijeku. Nuspojave možete prijaviti izravno Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) putem internetske stranice www.halmed.hr. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Ovaj edukacijski materijal možete pronaći na internetskim stranicama Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) u dijelu Farmakovigilancija/Mjere minimizacije rizika.