

# Paracetamol B. Braun

## 10 mg/ml otopina za infuziju



### Indikacije

- Kratkotrajno liječenje umjerene boli, osobito nakon operacije,
- Kratkotrajno liječenje vrućice kada je intravenska primjena klinički opravdana zbog potrebe za hitnim liječenjem boli ili hipertermije i/ili kada drugi putovi primjene nisu mogući.

### Mjere opreza pri uporabi

- Pazite kako ne biste pogriješili u doziranju uslijed zamjene miligrama (mg) i mililitara (ml) jer može doći do slučajnog predoziranja posebice kod djece.
- Doza ovisi o tjelesnoj težini, volumen primjene može biti vrlo mali.

### Doziranje i primjena

Skupina pacijenata	Novorođenčad, dojenčad i djeca ≤10 kg	Djeca >10 kg i ≤33 kg	Djeca, adolescenti i odrasli >33 kg i ≤50 kg	Adolescenti i odrasli >50 kg bez rizika hepatotoksičnosti	Adolescenti i odrasli >50 kg s rizikom hepatotoksičnosti
Doza	7,5 mg/kg Npr. 0,75 ml/kg	15 mg/kg Npr. 1,5 ml/kg	15 mg/kg Npr. 1,5 ml/kg	1000 mg Npr. 1 bočica od 100 ml	1000 mg Npr. 1 bočica od 100 ml
	Ne više od 4 puta dnevno u pojedinačnoj dozi od 7,5 mg/kg	Ne više od 4 puta dnevno u pojedinačnoj dozi od 15 mg/kg	Ne više od 4 puta dnevno u pojedinačnoj dozi od 15 mg/kg	Ne više od 4 puta dnevno u pojedinačnoj dozi od 1000 mg	Ne više od 4 puta dnevno u pojedinačnoj dozi od 750 mg
Minimalni interval	Minimalni interval između primjene: 4 sata				
Maksimalna doza unutar 24 sata	30 mg/kg (ne više od 300 mg)	60 mg/kg (ne više od 2000 mg)	60 mg/kg (ne više od 3000 mg)	4000 mg	3000 mg
Izgled Ecoflac plus bočice	50 ml Ecoflac® plus bočica: 1 ml = 10 mg za pacijente do 33 kg 		100 ml Ecoflac® plus bočica: 1 ml = 10 mg za pacijente teže od 33 kg 		

### Primjer (do 10 kg)

Težina	Doza za primjenu do 4 puta na dan		Maksimalna doza unutar 24 sata	
2 kg	15 mg	1,5 ml	60 mg	6 ml
4 kg	30 mg	3,0 ml	120 mg	12 ml
6 kg	45 mg	4,5 ml	180 mg	18 ml
8 kg	60 mg	6,0 ml	240 mg	24 ml
10 kg	75 mg	7,5 ml	300 mg	30 ml

- Kod djece s manjom tjelesnom težinom paracetamol se može razrijediti u 0,9% otopini natrijevog klorida ili u 5% otopini glukoze do jedne desetine (jedan volumen lijeka Paracetamol B.Braun na devet volumena otopine za razrjeđivanje)
- Kemijska i fizikalna stabilnost otopine je 48 sati na 23 °C, ali s obzirom na mogućnost mikrobiološke kontaminacije preporuča se upotrijebiti otopinu u roku od 1 sata nakon pripreme (uključujući u to i vrijeme infuzije). Ako se pripremljena otopina ne upotrijebi odmah, za uvijete i vrijeme skladištenja odgovoran je korisnik.
- Potrebno je pažljivo nadzirati infuziju, naročito pri završetku da bi se izbjegla zračna embolija.
- Detaljne informacije pogledajte u Sažetku opisa svojstava lijeka.

### Sve sumnje na nuspojave potrebno je prijaviti Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) putem:

- on-line obrasca za prijavu sumnji na nuspojave dostupne na internetskim stranicama [www.halmed.hr](http://www.halmed.hr). Ovu aplikaciju mogu koristiti zdravstveni radnici, kako bi proces prijavljivanja sumnji na nuspojave bio što jednostavniji. Napominjemo da se prijave poslane ovim putem jednako boduju od strane komore kao i prijave poslane poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom. Skrećemo pažnju da nam Vaše kontakt podatke prilikom slanja prijave putem ove aplikacije ostavite u polju „Dodatni komentari“. ili
- pisano putem obrasca dostupnog na internetskim stranicama [www.halmed.hr](http://www.halmed.hr). Prijave je moguće poslati poštom (Ksaverska cesta 4, 10 000 Zagreb), telefaksom (01/4884-110) ili elektronskom poštom u Word formatu ([nuspojave@halmed.hr](mailto:nuspojave@halmed.hr)).

**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE