

baqsimi[®]
(glukagon) prašak za nos 3 mg

UPUTE ZA UPORABU DEMONSTRACIJSKOG UREĐAJA ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE

Ovaj vodič predstavlja edukacijski materijal koji je obavezan kao uvjet za stavljanje lijeka Baqsimi u promet, u cilju dodatne minimizacije važnih odabranih rizika.

Informacije navedene u ovom edukacijskom materijalu ne zamjenjuju one navedene u sažetku opisa svojstava lijeka. Za potpune informacije prije primjene lijeka molimo da pročitate sažetak opisa svojstava lijeka (dostupan na www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova).

Ovaj edukacijski materijal možete pronaći na internetskim stranicama Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) u dijelu Farmakovigilancija/Mjere minimizacije rizika.

Ovdje su navedene upute za uporabu uređaja za demonstraciju primjene lijeka BAQSIMI i dodatne informacije o tom lijeku.

verzija 2, listopad, 2024

INDIKACIJA

BAQSIMITM je indiciran za liječenje teške hipoglikemije u odraslih, adolescenata i djece u dobi od 4 ili više godina sa šećernom bolešću.


Za potpune informacije prije primjene lijeka molimo da pročitate sažetak opisa svojstava lijeka (dostupan na www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova). Pročitajte upute za uporabu priložene uz BAQSIMI.

UREOAJ ZA DEMONSTRACIJU

Važne informacije:

- Ovaj je uređaj za demonstraciju namijenjen za podučavanje i vježbanje ključnih koraka u primjeni lijeka BAQSIMI (pogledajte sljedeće stranice za informacije o primjeni lijeka).
- Imajte na umu sljedeće ključne razlike između uređaja za demonstraciju i stvarnog lijeka. Uređaj:
 - ne sadrži lijek
 - služi samo za demonstraciju NE SMIJES ES TAVLJATI u nos zbog pridržavanja higijenskih mjera opreza
 - ne smije se nositi s lijekom BAQSIMI kako ne bi došlo do zamjene tijekom epizode teške hipoglikemije

Priprema uređaja za demonstraciju:



- DRŽITE** donji dio vrha prstima. Zakrećite tijelo uređaja za demonstraciju dok se klip ne vrati u početni položaj, a zelena linija ponovno postanevidljiva.

Za razliku od uređaja za demonstraciju, jedno-dozni spremnik s lijekom BAQSIMI može se koristiti samo jednom.

STO JE BAQSIMI?

BAQSIMI je oblik glukagona koji se primjenjuje kroz nos.

Kada koristiti BAQSIMI

- BAQSIMI se koristi u slučaju naglog pada razine šećera u krvi, kada osoba ne može jesti ni piti te joj je potrebna pomoć druge osobe.
- Važno je da su osobe oko Vas upoznate s mogućim znakovima naglog pada razine šećera u krvi kako bi bile spremne i kako biste se mogli osloniti na njih.

Ovo su mogući znakovi naglog pada razine šećera u krvi:

- omaglica
- poremećaj paznje iii smetenost
- napadaj iii gubitak svijesti
- promjene raspoloženja
- narušena koordinacija
- drhtanje iii znojenje

Pogledajtes ljedeces tranicez a informacijeo primjeni lijeka.

baqsimi[®]
(glukagon) prašak za nos 3 mg

Osobe sa šećernom bolešću kojimaje propisan BAQSIMI:

- moraju ga uvijek imati pri ruci
- trebaju pokazati drugima kako se on koristi
- trebaju reći drugima gdje drže BAQSIMI

Za vise informacija o lijeku BAQSIMI
pročitajte sažetak opisa svojstava lijeka
(dostupan na www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova)

Amphastar France Pharmaceuticals
Usine Saint Charles, Eragny Sur
Epte, 60590, Francuska
Tel 0800 790 080

SAMO ZA ZDRAVSIVENE RADNIKE
01-524-01-HR, 03-2024.



PRIMJENA LIJEKA BAQSIMI

Prije primjene pročitajte upute za uporabu lijeka BAQSIMI.

- Pokažite članovima obitelji i prijateljima gdje držite BAQSIMI i objasnite im kako se koristi. Moraju znati kako ga primijeniti prije nego što Varn zatreba.
- Nemojte skidati zaštitnu foliju niti otvarati plastičnu kutijicu sve dok ne budete spremni za primjenu lijeka. Ako je plastična kutijica bila otvorena, u lijekje mogla ući vlaga pa on možda neće djelovati kako bi trebao.
- Nemojte pritiskati klip dok ne budete spremni za primjenu doze. U protivnom će jedina doza sadržana u spremniku biti izgubljena.

Primjena doze



- **DRŽITE** jed nodozn ispremnik kao što je prikazano na slici. **Nemojte pritiskati klip dok ne stavite jednodozni spremnik u nos.**

- **STAVITE** vrh jednodoznog spremnika u jednu nosnicu.

- **PRITISNITE** klip do kraja tako da zelena linija više ne bude vidljiva.

Da biste pogledali video o primjeni lijeka BAQSIMI posjetite mrežne stranice Agencije za lijekove i medicinske proizvode: www.halmed.hr/Farmakovigilancija/Mjere-minimizacije-rizika-MMR/

Nakon primjene doze

- Ako je osoba bez svijesti, okrenite je na bok nakon primjene lijeka BAQSIMI.
- Odmah pozovite liječničku pomoć.
- Potaknite osobu da što prije pojede ili popije nešto bogato šećerom, poput slatkiša ili voćnog soka.
- Bacite upotrijebljeni spremnik i plastičnu kutijicu.



Ne otvarajte plastičnu kutijicu sve dok ne budete spremni za primjenu lijeka.

Prijavljivanje nuspojava

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivati sumnje na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Sve i medicinske proizvode (HALMED). HALMED poziva zdravstvene radnike da prijave sumnje na nuspojave putem informacijskog sustava OPeN koji je dostupan na internetskim stranicama HALMED-a (<https://open.halmed.hr>).

baqsimi[®]

(glukagon) prašak za nos 3 mg