

baqsimi®  
(glukagon) prašak za nos 3 mg

## INFORMACIJE O UREĐAJU ZA DEMONSTRACIJU

Ovdje su navedene upute za uporabu uređaja za demonstraciju primjene lijeka BAQSIMI i dodatne informacije o tom lijeku.

### INDIKACIJA

BAQSIMI® je indiciran za liječenje teške hipoglikemije u odraslih, adolescenata i djece u dobi od 4 ili više godina sa šećernom bolešću.


Za potpune informacije prije primjene lijeka molimo da pročitate sažetak opisa svojstava lijeka (dostupan na [www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova](http://www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova)). Pročitajte upute za uporabu priložene uz BAQSIMI.

## UREĐAJ ZA DEMONSTRACIJU

### Važne informacije:

- Ovaj je uređaj za demonstraciju namijenjen za podučavanje i vježbanje ključnih koraka u primjeni lijeka BAQSIMI (pogledajte sljedeće stranice za informacije o primjeni lijeka).
- Imajte na umu sljedeće ključne razlike između uređaja za demonstraciju i stvarnog lijeka. Uređaj:
  - **ne sadrži lijek**
  - **služi samo za demonstraciju** NE SMIJE SE STAVLJATI u nos zbog pridržavanja higijenskih mjera opreza
  - **ne smije se nositi s lijekom BAQSIMI** kako ne bi došlo do zamjene tijekom epizode teške hipoglikemije

### Priprema uređaja za demonstraciju:



- **DRŽITE** donji dio vrha prstima. Zakrećite tijelo uređaja za demonstraciju dok se klip ne vrati u početni položaj, a zelena linija ponovno postane vidljiva.

**Za razliku od uređaja za demonstraciju, jednodozni spremnik s lijekom BAQSIMI može se koristiti samo jednom.**

## ŠTO JE BAQSIMI?

BAQSIMI je oblik glukagona koji se primjenjuje kroz nos.

### Kada koristiti BAQSIMI

- **BAQSIMI se koristi u slučaju naglog pada razine šećera u krvi**, kada osoba ne može jesti ni piti te joj je potrebna pomoć druge osobe.
- Važno je da su osobe oko Vas upoznate s mogućim znakovima naglog pada razine šećera u krvi kako bi bile spremne i kako biste se mogli osloniti na njih.

**Ovo su mogući znakovi naglog pada razine šećera u krvi:**

- omaglica
- poremećaj pažnje ili smetenost
- napadaj ili gubitak svijesti
- promjene raspoloženja
- narušena koordinacija
- drhtanje ili znojenje

Pogledajte sljedeće stranice za informacije o primjeni lijeka.

baqsimi®  
(glukagon) prašak za nos 3 mg

## Osobe sa šećernom bolešću kojima je propisan BAQSIMI:

- moraju ga uvijek imati pri ruci
- trebaju pokazati drugima kako se on koristi
- trebaju reći drugima gdje drže BAQSIMI

**Za više informacija o lijeku BAQSIMI pročitate sažetak opisa svojstava lijeka (dostupan na [www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova](http://www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova))**

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.  
Ulica grada Vukovara 269G  
10000 Zagreb, Hrvatska  
Tel +385 1 2444 124  
Fax +385 1 23000 79

*Lilly*

SAMO ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE  
PP-GN-HR-0016, 26.9.2022.

# PRIMJENA LIJEKA BAQSIMI

Prije primjene pročitajte upute za uporabu lijeka BAQSIMI.

- Pokažite članovima obitelji i prijateljima gdje držite BAQSIMI i objasnite im kako se koristi. **Moraju znati kako ga primijeniti prije nego što Vam zatreba.**
- **Nemojte** skidati zaštitnu foliju niti otvarati plastičnu kutijicu sve dok ne budete spremni za primjenu lijeka. Ako je plastična kutijica bila otvorena, u lijek je mogla ući vlaga pa on možda neće djelovati kako bi trebao.
- **Nemojte** pritiskati klip dok ne budete spremni za primjenu doze. U protivnom će jedina doza sadržana u spremniku biti izgubljena.

## Primjena doze



- **DRŽITE** jednodozni spremnik kao što je prikazano na slici. **Nemojte pritiskati klip dok ne stavite jednodozni spremnik u nos.**



- **STAVITE** vrh jednodoznog spremnika u jednu nosnicu.



- **PRITISNITE** klip do kraja tako da **zelena linija više ne bude vidljiva.**

Da biste pogledali video o primjeni lijeka BAQSIMI posjetite mrežne stranice Agencije za lijekove i medicinske proizvode: [www.halmed.hr/Farmakovigilancija/Mjere-minimizacije-rizika-MMR/](http://www.halmed.hr/Farmakovigilancija/Mjere-minimizacije-rizika-MMR/)

## Nakon primjene doze

- Ako je osoba bez svijesti, okrenite je na bok nakon primjene lijeka BAQSIMI.
- **Odmah pozovite liječničku pomoć.**
- Potaknite osobu da što prije pojede ili popije nešto bogato šećerom, poput slatkiša ili voćnog soka.
- **Bacite upotrijebljeni spremnik i plastičnu kutijicu.**



Ne otvarajte plastičnu kutijicu sve dok ne budete spremni za primjenu lijeka.

**baqsimi**<sup>®</sup>  
(glukagon) prašak za nos 3 mg

verzija 1, prosinac 2021