

Vodič za bolesnike

Produodopa

(foslevodopa/foskarbidopa)

za uznapređovalu Parkinsonovu bolest

Ovaj Vodič za bolesnike predstavlja edukacijski materijal koji je obavezan kao uvjet za stavljanje lijeka Produodopa u promet, u cilju dodatne minimizacije važnih odabranih rizika.

Bez promidžbenog sadržaja.

Informacije navedene u ovom edukacijskom materijalu ne zamjenjuju one navedene u uputi o lijeku koja je priložena svakom pakiranju ovog lijeka. Lijekovi koji sadrže foslevodopu/foskarbidopu mogu biti na tržištu pod različitim nazivima. Za potpune informacije prije primjene lijeka pročitajte uputu o lijeku (dostupna u svakom pakiranju lijeka Produodopa i na www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova).

Ovaj edukacijski materijal možete pronaći na internetskim stranicama Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) u dijelu Farmakovigilancija/Mjere minimizacije rizika.

Ovaj vodič za bolesnike sadrži važne informacije o sigurnosti s kojima morate biti upoznati.

Imajte ovaj vodič pri ruci dok se pripremate za primjenu lijeka.

Zašto trebam pročitati ovaj vodič za bolesnike?

PRODUODOPA je lijek za liječenje simptoma uznapredovale Parkinsonove bolesti.

Koristi se kada drugi lijekovi za liječenje simptoma te bolesti više ne djeluju jednako dobro kao prije.

Ovaj lijek primjenjuje se samostalno ili uz pomoć njegovatelja, a daje se pod kožu plastičnom cjevčicom (kanilom) na području oko pupka. To se područje naziva mjestom infuzije.

Lijek se cjevčicom primjenjuje kontinuirano 24 sata na dan.

SAŽETAK VAŽNIH RIZIKA I PREPORUČENIH POSTUPAKA ZA NJIHOVU PREVENCIJU I/ILI MINIMIZACIJU

U nekih se osoba koje primjenjuju ovaj lijek mogu javiti kožne tegobe na području gdje se kanila uvodi u tijelo.

One mogu uključivati:

- kožnu infekciju, koja se javlja kad bakterije uđu u kožu.

Kožna infekcija može postati ozbiljna ako bakterije dospiju u krvotok i prošire se cijelim tijelom. To se naziva sepsom.

- kožnu reakciju, kod koje koža postaje nadražena/upaljena.

Uz ovaj vodič za bolesnike Vi i Vaš njegovatelj naučit ćete sljedeće:



Kako odabrati mjesto infuzije



Kako prepoznati infekciju ili reakciju na
mjestu infuzije



Kako smanjiti vjerojatnost pojave infekcije
ili reakcije na mjestu infuzije



Što učiniti u slučaju infekcije ili reakcije
na mjestu infuzije



Gdje pronaći više informacija o ovom lijeku



Kako odabrati mjesto infuzije

Važno je redovito mijenjati mjesto infuzije jer se tako čuva zdravlje kože i omogućuje pravilna isporuka lijeka.

Osim ako Vam liječnik ne kaže drugačije, za mjesto infuzije možete odabrati trbuh. Mjesto koje odaberete mora biti najmanje 5 cm (što približno odgovara duljini malog prsta) udaljeno od pupka.


- Izbjegavajte područje struka na kojemu bi pritisak pojasa o kožu mogao izazvati nadraženost.
- Izbjegavajte kožu koja je tvrda ili prekrivena ožiljcima ili strijama.
- Izbjegavajte kožne nabore ili mjesta na kojima se koža prirodno često pregiba.
- Kod svake promjene mjesta infuzije upotrijebite novi komplet za infuziju (kanilu/cjevčicu).

Mjesto infuzije mijenjajte svaka 3 dana ili češće, ovisno o promjenama na koži (kao što su crvenilo, oticanje i bol).

Novo mjesto infuzije mora biti najmanje 2,5 cm (što približno odgovara širini dva prsta) udaljeno od prethodnog.

Nakon primjene infuzije na jednom mjestu nemojte ponovno koristiti to mjesto 12 dana. Tako ćete omogućiti koži da potpuno zacijeli.

Postoje različiti načini da zapamtite koje ste mjesto infuzije koristili kako ga ne biste prerano ponovno upotrijebili. Jedan je od njih da zamislite sat na svom trbuhu. Kanilu svaki put možete uvesti u mjesto koje je od prethodnoga udaljeno „dva sata“: počnite s mjestom koje označava 12 sati, zatim 2 sata, 4 sata i tako dalje.




Bilježite datume i mjesta infuzije kako ih ne biste zaboravili.



Kako prepoznati infekciju ili reakciju na mjestu infuzije

Obratite pozornost na promjene na mjestu gdje kanila prolazi kroz kožu. One mogu, ali i ne moraju biti praćene vrućicom, a uključuju:

- crvenilo
- osjećaj topline na dodir
- oticanje
- osjetljivost na dodir/bol
- promjenu boje kože na pritisak





Kako smanjiti vjerojatnost pojave infekcije ili reakcije na mjestu infuzije

Na mjestu infuzije mogu se javiti infekcije ili reakcije. U nastavku se navode faktori koje treba uzeti u obzir kod primjene infuzije.



Infuziju pripremite na dobro osvijetljenoj, čistoj i ravnoj površini (primjerice stolu).



Tijekom pripreme infuzije pazite da su mjesto infuzije i komplet za infuziju čisti i sterilni.



Uvijek operite ruke sapunom i vodom i osušite ih papirnatim ručnikom. Nakon toga ne dirajte ništa što nije čisto.



Pazite da vrh štrcaljke, nastavak za bočicu, cjevčica ili priključak ne dođu u doticaj s površinom koja nije čista.



Pažljivo zbrinite sav upotrijebljen pribor koji bi mogao biti kontaminiran.



Nakon odabira mjesta infuzije obrišite kožu jastučićem ili blazinicom natopljenom alkoholom. Da biste izbjegli kontaminaciju očišćenog područja, kožu brišite u jednom smjeru. Pričekajte najmanje 1 minutu da se područje osuši.

Mijenjajte mjesto infuzije svaka 3 dana ili češće, ovisno o promjenama na koži (kao što su crvenilo, oticanje i bol).



Kad mijenjate mjesto infuzije, nemojte ponovno odabrati isto mjesto 12 dana. Tako ćete omogućiti koži da potpuno zacijeli.



Uvijek održavajte udaljenost od 2,5 cm (što približno odgovara širini dva prsta) u odnosu na prethodno mjesto infuzije.



Pri promjeni mjesta infuzije uvijek upotrijebite novu kanilu i cjevčicu.



Škaricama skratite dlake oko mjesta infuzije. Tako će ljepljiva traka kanile bolje prianjati uz kožu. Ako morate obrijati to područje, pričekajte jedan dan prije primjene infuzije na tom mjestu.



Nosite udobnu odjeću koja neće nadražiti kožu na mjestu infuzije.

verzija 1.1; prosinac 2025.



Što učiniti u slučaju infekcije ili reakcije na mjestu infuzije

Promijenite mjesto infuzije – nemojte čekati 3 dana. Nazovite liječnika, medicinsku sestru ili ljekarnika ako primijetite sljedeće simptome:

- crvenilo
- osjećaj topline na dodir
- oticanje
- osjetljivost na dodir/bol
- promjenu boje kože na pritisak

Nemojte ponovno koristiti mjesto infuzije zahvaćeno infekcijom tijekom najmanje 12 dana ili dok koža ne zacijeli.



Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u uputi o lijeku. Nuspojave možete prijaviti izravno Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) putem internetske stranice www.halmed.hr. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Nuspojave lijeka možete prijaviti i društvu AbbVie (01/5625-516 ili 091/2333-051).



Gdje pronaći više informacija o ovom lijeku

Za više informacija o svom lijeku pročitajte uputu o lijeku i upute za uporabu koje ste dobili s lijekom (foslevodopa/ foskarbidopa) i priborom za primjenu.

abbvie