



MOJ PRIRUČNIK ZA DEFERASIROKS PLIVA (DEFERASIROKS)

Ovaj vodič predstavlja edukacijski materijal koji je obavezan kao uvjet za stavljanje lijeka Deferasiroks Pliva u promet, u cilju dodatne minimizacije važnih odabranih rizika.

verzija 3, veljača 2026.



Bez promidžbenog sadržaja.

Informacije navedene u ovom edukacijskom materijalu ne zamjenjuju one navedene u uputi o lijeku koja je priložena svakom pakiranju lijeka Deferasiroks Pliva. Lijekovi koji sadrže deferasiroks mogu biti na tržištu pod različitim nazivima. Za potpune informacije prije primjene lijeka pročitajte uputu o lijeku (dostupna u svakom pakiranju lijeka i na www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova).

Ovaj edukacijski materijal možete pronaći na internetskim stranicama Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) u dijelu Farmakovigilancija/Mjere minimizacije rizika.

Sažetak važnih rizika i preporučenih postupaka za njihovu prevenciju i/ili minimizaciju

Prije nego što započnete terapiju lijekom Deferasiroks Pliva obaviti će se pretrage funkcije Vaših bubrega i jetre i bit će redovito praćeni tijekom liječenja.

Prije početka liječenja obaviti ćete sljedeće pretrage:


- mjerenje serumskog kreatinina (dva puta), klirensa kreatinina, serumskog feritina, jetrenih enzima te provjeru prisutnosti proteina u urinu,
- provjeru sluha, vida, visine i težine.

Nadalje:

- svaki mjesec mjeriti ćete serumski feritin i provjeravati prisutnost proteina u urinu,
- serumski kreatinin i klirens kreatinina mjeriti ćete tijekom prvog mjeseca ili nakon promjene doze jednom tjedno, kasnije jednom mjesečno,
- jetrene enzime mjeriti ćete svaka dva tjedna tijekom prvog mjeseca, zatim jednom mjesečno.

Jednom godišnje provjeravati ćete sluh, vid, visinu i težinu.

Pedijatrijskim bolesnicima prije početka liječenja i jednom godišnje procjenjivat će se tjelesni razvoj. Ako Vaš liječnik posumnja na probleme s bubrežima, može vas uputiti na pretragu koja se zove biopsija bubrega.



Što je Deferasiroks Pliva (deferasiroks) i zašto mi je propisan?

Deferasiroks Pliva je kelator željeza (ili kelatni agens) koji se koristi kako bi pomogao ukloniti višak željeza iz tijela.

Za mnoge vrste bolesti potrebne su transfuzije. Neke od njih su:

- Beta-talasemija major
- Bolest srpastih stanica, ili BSS
- Niskorizični mijelodisplastični sindromi, ili MDS
- Druge anemije

Ako imate jednu od ovih bolesti, vjerojatno ste primili nekoliko transfuzija. Transfuzije sadrže zdrave eritrocite koje Vaše tijelo treba i mogu Vam pomoći da se bolje osjećate.

Svaka transfuzija koju dobijete sadrži željezo. Željezo je važno jer ga eritrociti koriste kako bi prenosili kisik po Vašem tijelu. Međutim, tijelo nema svoj vlastiti način uklanjanja viška željeza.

Količina željeza raste sa svakom transfuzijom. To uzrokuje višak željeza u Vašem tijelu, što se zove kronično preopterećenje željezom. Previše željeza može biti štetno i oštetiti organe kao što su Vaše srce i jetra.

Važno je da uklonite ovaj višak željeza kako biste održali svoje željezo na sigurnoj, zdravoj razini. Svakog čete mjeseca posjetiti svog liječnika kako biste pratili svoj napredak prema ostvarenju cilja liječenja.

Uzimanje lijeka Deferasiroks Pliva (deferasiroks)



Deferasiroks Pliva filmom obložene tablete su plave, ovalne tablete koje se mogu progutati cijele na prazan želudac ili uz lagani obrok. Ako ne možete progutati cijele tablete, Deferasiroks Pliva filmom obložene tablete mogu se smrviti i posuti po mekoj hrani.



Važno je da uzimate svoj lijek prema uputama svog liječnika.

 Tablete nisu prikazane u stvarnoj veličini

verzija 3, veljača 2026.



Kako trebam uzimati Deferasiroks Pliva filmom obložene tablete?

Koju dozu ću uzimati?

Vaša propisana doza temelji se na Vašoj tjelesnoj težini, trenutačnoj razini željeza i na funkciji jetre i bubrega, te na tome koliko često primete transfuzije.

Ako prelazite na deferasiroks filmom obložene tablete s infuzija deferoksamina, Vaš liječnik može odrediti Vašu dozu lijeka na temelju toga koliko ste deferoksamina uzimali.

Koju tabletu (tablete) ću uzimati?

Deferasiroks Pliva filmom obložene tablete dostupne su u različitim veličinama, a možda ćete morati uzimati više od jedne. Liječnik će Vam reći koliko tableta i koje veličine (veličina) trebate uzimati svaki dan.



Kada trebam uzimati Deferasiroks Pliva filmom obložene tablete?

Deferasiroks Pliva filmom obložene tablete treba uzimati jedanput na dan, po mogućnosti u isto vrijeme svakoga dana, a mogu se uzeti na prazan želudac ili uz lagani obrok.

Kako uzimati Deferasiroks Pliva filmom obložene tablete?

Deferasiroks Pliva filmom obložene tablete treba progutati cijele s malo vode. Za bolesnike koji nisu u stanju progutati cijele tablete, Deferasiroks Pliva filmom obložene tablete mogu se smrviti i uzeti tako da se puna doza prospe po maloj količini meke hrane, kao što su jogurt ili jabučna kaša (pire od jabuka). Dozu je potrebno konzumirati odmah i u cijelosti, a ne čuvati je za buduću upotrebu.

Što ako zaboravim uzeti svoju dozu?

Ako propustite uzeti dozu lijeka, trebate je uzeti kada se sjetite, čak i ako to bude kasnije toga dana. Uzmite svoju sljedeću dozu prema rasporedu. Nemojte uzeti dvostruku dozu sljedećeg dana kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu (tablete).

Što ako uzmem više Deferasiroks Pliva tableta nego što bi trebalo?

Ako uzmete više Deferasiroks Pliva tableta nego što biste trebali, odmah obavijestite svog liječnika ili kontaktirajte hitnu službu, jer će Vam možda biti potrebna liječnička pomoć.




Kako će se pratiti moje liječenje?

Dok uzimate deferasiroks, obavljat ćete redovite laboratorijske pretrage. Tim će se pretragama pratiti kako odgovarate na liječenje.

Vaša će doza možda morati biti povećana ili smanjena na temelju tih pretraga. Nakon što ste **3 do 6 mjeseci** uzimali deferasiroks, provjerite sa svojim liječnikom napredujete li kako je planirano. Ako ne napredujete, upitajte svog liječnika koji je njegov/njezin plan da Vam se pomogne dostići cilj Vašeg liječenja.

PRETRAGA	PRIJE POČETKA TERAPIJE LIJEKOM DEFERASIROKS PLIVA	SVAKOG MJESECA	JEDANPUT GODIŠNJE
ŽELJEZO	✓	✓	
Serumski feritin			
FUNKCIJA BUBREGA	✓	✓	
Serumski kreatinin	Ova će krvna pretraga biti obavljena DVAPUT prije početka terapije lijekom Deferasiroks Pliva	Prvog mjeseca i u prvom mjesecu nakon bilo kakvih promjena doze, obavljat ćete pretragu jedanput tjedno; zatim jedanput mjesečno	
Klirens kreatinina	✓	✓ Tijekom prvog mjeseca od početka terapije ili promjene doze, obavljat ćete pretragu jedanput tjedno; zatim jedanput mjesečno.	
FUNKCIJA JETRE	✓	✓	
(serumske transaminaze, bilirubin, alkalna fosfataza)		Prvog mjeseca obavljat ćete pretragu svaka 2 tjedna; zatim jedanput mjesečno	
URIN	✓	✓	
(Protein u urinu)			
SLUH I VID	✓		✓
PEDIJATRIJSKI BOLESNICI:	✓		✓
procjena tjelesnog razvoja (npr. težina, spolni razvoj i koliko narastete u godinu dana)			
TEŽINA I VISINA	✓		✓



Vaš liječnik također može

- obaviti pretragu zvanu magnetska rezonancija ili MR, kako bi provjerio razine željeza u Vašem srcu i jetri
- obaviti biopsiju Vaših bubrega ako sumnja na važne probleme s bubrezima
- prema potrebi obaviti druge pretrage

Između posjeta

Između posjeta liječniku mogu se dogoditi važni događaji. Trebate ih bilježiti i podijeliti ih sa svojim liječnikom.

Oni uključuju:

- razvoj nuspojava
- uzimanje drugih lijekova
- bilo kakva odstupanja od propisane doze.

Prijavljivanje nuspojava



Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u uputi u lijeku. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) putem internetske stranice www.halmed.hr.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Ako imate bilo kakve ozbiljne nuspojave, **PRESTANITE** uzimati svoj lijek i odmah se obratite liječniku.

Osnovne informacije o meni




OPĆE INFORMACIJE

Ime: Prezime:

Datum rođenja:

Dijagnoza:



Početak terapije lijekom Deferasiroks Pliva

Možete početi pratiti svoj napredak kada liječnik odluči koja je Vaša ciljana razina serumskog feritina (SF) i doza lijeka Deferasiroks Pliva. Surađujte sa svojim liječnikom kako biste popunili svoj cilj liječenja i druge informacije u nastavku.

DATUM:

Moja trenutna razina SF-a:

Cilj mog liječenja je smanjiti moju razinu SF-a na:

Moja težina:

Moj Deferasiroks Pliva režim doziranja

Koliko ću tableta uzimati svaki dan?

Deferasiroks Pliva filmom obložene tablete:

Mogu progutati tablete cijele

Smrvit ću tablete i posuti ih po mekoj hrani, kao što je jogurt ili pire od jabuka, i odmah ih pojesti

U koje ću vrijeme uzimati svoj lijek svakog dana?

