

Periolimel i Olimel

PARENTERALNA PREHRANA

VODIČ ZA PRIMJENU

	PeriOLIMEL N4E			OLIMEL N7E			OLIMEL N9E			OLIMEL N9			OLIMEL N12E		
	Sadrži elektrolite			Sadrži elektrolite			Sadrži elektrolite						Sadrži elektrolite		
Put primjene	Za intravensku primjenu putem centralne ili periferne vene			Za intravensku primjenu samo putem centralne vene			Za intravensku primjenu samo putem centralne vene			Za intravensku primjenu samo putem centralne vene			Za intravensku primjenu samo putem centralne vene		
Najveća brzina primjene po satu tekućine (ml/kg/h)	2 - 11 godina	12 - 18 godina	odrasli	2 - 11 godina	12 - 18 godina	odrasli	2 - 11 godina	12 - 18 godina	odrasli	2 - 11 godina	12 - 18 godina	odrasli	2 - 11 godina	12 - 18 godina	odrasli
	4.3	3.2	3.2	2.6	1.7	1.7	3.3	2.1	1.8	3.3	2.1	1.8	2.6	1.6	1.3
Preporučena brzina infuzije	Odrasli: brzina infuzije mora se povećavati postepeno tijekom prvog sata primjene, a nakon toga se mora prilagoditi ovisno o primijenjenoj dozi, dnevnom unosu volumena i trajanju infuzije. Mala djeca: započeti infuziju u male djece s malom dnevnom dozom i postepeno ju povećavati do najveće doze														
Preporučeno trajanje infuzije	12-24 sata														
Intradijalička parenteralna prehrana (IDPN)	Olimel N9: najveća brzina infuzije po satu je 3,6 ml/kg/sat, što odgovara 0,2 g/kg/sat aminokiselina, 0,40 g/kg/sat glukoze i 0,14 g/kg/sat lipida primijenjenih tijekom 4 sata.														

1



PODERITE ZAŠTITNU VREĆICU

Poderite prednju stranu zaštitne vrećice pomoću ureza na njoj. Uklonite zaštitnu vrećicu.

2



PRESAVIJAJTE VREĆICU

Stavite vrećicu na podlogu i ručno presavijajte vrećicu, počevši na gornjem dijelu (gdje se nalazi otvor za vješalicu). Savijajte vrećicu dok se nepropusne pregrade ne otvore do približno pola njihove dužine.

3



PROMIJEŠAJTE SADRŽAJ

Miješajte okrećući vrećicu najmanje 3 puta.

4



DODAJTE MIKRONUTRIJENTE [ako je potrebno]

Kapacitet vrećice je dovoljan za primanje dodatnih vitamina, elektrolita i elemenata u tragovima. Vitamini se mogu dodati u odjeljak s glukozom prije nego što je mješavina pripremljena. Bilo koji drugi dodaci mogu se uvesti u pripremljenu mješavinu. Nakon bilo kojeg dodavanja izmiješajte sadržaj vrećice i dodatke.

5



PRIMJENITE PeriOLIMEL/OLIMEL

Objesite vrećicu. Uklonite plastični štitič s nastavka za primjenu i čvrsto utaknite infuzijski šiljak u nastavak za primjenu. Preporučeno trajanje infuzije je između 12 i 24 sata.



Sadržaj po vrećici: dušik, ukupne kcal, neproteinske kalorije

Volumen

Sadržaj dušika g/l

Identifikacija odjeljka

Nastavak za ubrizgavanje [dodatak]

DOBRA PRAKSA

KOD PRIMJENE PERIOLIMEL/OLIMEL

- Osigurajte da lijek bude zagrijan na sobnu temperaturu tijekom otvaranja nepropusnih pregrada.
- Provjerite je li unutarnja vrećica cijela i jesu li cijele nepropusne pregrade. Koristite lijek samo ako je vrećica neoštećena, ako nepropusne pregrade nisu uklonjene (npr. ukoliko nije došlo do miješanja sadržaja 3 odjeljka), ako su otopine aminokiselina i glukoze bistre, bezbojne ili žućkaste i praktički bez vidljivih čestica, te ako je emulzija lipida homogena tekućina mliječnog izgleda.
- Nemojte nikada povlačiti za pregrade.
- Preporučuje se korištenje lijeka odmah nakon otvaranja nepropusnih pregrada između 3 odjeljka. Međutim, pokazalo se da je pripremljena emulzija stabilna najviše 7 dana (na temperaturi od 2°C do 8°C) nakon čega se može čuvati još najviše 48 sati na temperaturi ispod 25°C.



NADOPUNA ELEKTROLITA

	PeriOLIMEL N4E			OLIMEL N7E			OLIMEL N9E			OLIMEL N9			OLIMEL N12E		
	Sadrži elektrolite			Sadrži elektrolite			Sadrži elektrolite			Sadrži elektrolite			Sadrži elektrolite		
	Uključena količina	Najveća ^a dodana količina	Najveća ^c ukupna količina	Uključena količina	Najveća ^a dodana količina	Najveća ^c ukupna količina	Uključena količina	Najveća ^a dodana količina	Najveća ^c ukupna količina	Uključena količina	Najveća ^a dodana količina	Najveća ^c ukupna količina	Uključena količina	Najveća ^a dodana količina	Najveća ^c ukupna količina
natrij	21 mmol	129 mmol	150 mmol	35 mmol	115 mmol	150 mmol	0 mmol	150 mmol	150 mmol	35 mmol	115 mmol	150 mmol	0 mmol	150 mmol	150 mmol
kalij	16 mmol	134 mmol	150 mmol	30 mmol	120 mmol	150 mmol	0 mmol	150 mmol	150 mmol	30 mmol	120 mmol	150 mmol	0 mmol	150 mmol	150 mmol
magnezij	2.2 mmol	3.4 mmol	5.6 mmol	4.0 mmol	1.6 mmol	5.6 mmol	0 mmol	5.6 mmol	5.6 mmol	4.0 mmol	1.6 mmol	5.6 mmol	0 mmol	5.6 mmol	5.6 mmol
kalcij	2.0 mmol	3.0[1.5 ^a] mmol	5.0[3.5 ^a] mmol	3.5 mmol	1.5[0.0 ^a] mmol	5.0[3.5 ^a] mmol	0 mmol	5.0[3.5 ^a] mmol	5.0[3.5 ^a] mmol	3.5 mmol	1.5 mmol	5.0 mmol	0 mmol	5.0 mmol	5.0 mmol
anorganski fosfat	0 mmol	8.0 mmol	8.0 mmol	0 mmol	3.0 mmol	3.0 mmol	0 mmol	8.0 mmol	8.0 mmol	0 mmol	0/10 mmol ^d	0/10 mmol ^d	0 mmol	0/10 mmol ^d	0/10 mmol ^d
ili organski fosfat	8.5 mmol ^b	15.0 mmol	23.5 mmol ^b	15 mmol ^b	10 mmol	25 mmol ^b	3 mmol ^b	22 mmol	25 mmol ^b	15 mmol ^b	10/0 mmol ^d	25/15 mmol ^{b,d}	15 mmol ^b	10/0 mmol ^d	25/15 mmol ^{b,d}

a: Vrijednost koja odgovara dodatku anorganskog fosfata; b: Uključujući fosfate iz emulzije lipida; c: Prema najvećoj ukupnoj količini ispitanoj u studijama stabilnosti; d: Vrijednosti ovise o vrsti dodanog fosfata [tj. 0 mmol anorganskog fosfata + 10 mmol organskog fosfata ili 10 mmol anorganskog fosfata + 0 mmol organskog fosfata]; e: Vrijednosti ovise o vrsti dodanog fosfata [tj. 0 mmol anorganskog fosfata + 22 mmol organskog fosfata ili 10 mmol anorganskog fosfata + 12 mmol organskog fosfata].

Za detaljne informacije prije primjene PeriOLIMEL N4E i OLIMEL N7E, N9E, N9, N12E emulzije za infuziju, molimo proučite zadnji odobreni Sažetak opisa svojstva lijeka.

SAMO ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE

Baxter, PeriOlimel i Olimel su zaštitni znakovi Baxter International Inc.

Baxter

HR-CN16-250007