

Vaš praktični vodič za REVOLADE (eltrombopag)

HALMED verzija 1, 28.10.2016.

Eltrombopag je indiciran za liječenje bolesnika u dobi od 1 godine i starijih s kroničnom imunom (idiopatskom) trombocitopeničnom purpurom (ITP), koji su refrakterni na druge vidove liječenja (npr. kortikosteroide, imunoglobuline).

O Vama

Podaci o bolesniku

Ime i prezime:

Adresa:

Broj telefona/mobitela:

Datum rođenja:

Alergije:

Kontakt za hitne situacije:

Podaci o Vašem liječniku i bolnici u kojoj se liječite

Ime i prezime liječnika:

Ime i prezime medicinske sestre:

Adresa:

Broj telefona:

Broj telefona bolnice:

SADRŽAJ

Vašeg praktičnog vodiča

- 4** Podrška u primjeni eltrombopaga
- 6** Važne činjenice o Vama (Vašem dijetetu)
- 8** Što je kronični ITP?
- 9** Što je eltrombopag?
- 10** Što morate znati kad uzimate eltrombopag
- 12** Kada trebate (Vi ili Vaše dijete) uzeti eltrombopag?
- 22** Što možete očekivati od eltrombopaga
- 24** Što učiniti ako (Vi ili Vaše dijete) osjetite nuspojave
- 28** Često postavljana pitanja

Podrška u primjeni eltrombopaga

Liječnik je Vama ili Vašem djetetu propisao eltrombopag kako bi Vam pomogao liječiti kroničnu imunu trombocitopeničnu purpuru (kronični ITP) i dao Vam je ovaj praktični vodič.

Važan je dobar početak

Ako odvojite dovoljno vremena da pročitate ove materijale, oni će Vam pomoći da bolje razumijete kako eltrombopag djeluje, kako ga pravilno uzimati i na koje nuspojave treba paziti, a pružit će Vam i neke praktične savjete kako biste sa što manje poteškoća ukloplili eltrombopag u svoju dnevnu rutinu. Ali ne zaboravite, za dodatne savjete uvijek se trebate obratiti svom liječniku ili medicinskoj sestri.

**Ovi materijali nisu predviđeni kao nadomjestak za informacije u uputu o lijeku koju ste dobili u svom pakiranju eltrombopaga.
Svakako pročitajte uputu o lijeku kako biste dobili više informacija o eltrombopagu.**

Važne ČINJENICE o Vama (Vašem djetetu)

Obavijestite svog liječnika ako Vi ili Vaše dijete...

- imate problema s jetrom. Bit ćete pod pažljivim nadzorom dok budete uzimali eltrombopag
- uzimate lijekove koji sprječavaju nastanak krvnih ugrušaka, kao što su antikoagulansi ili antitrombocitni lijekovi
- imate rizik od stvaranja krvnih ugrušaka u venama ili arterijama (npr. zbog pušenja, primjene oralnih kontraceptiva, hormonskog nadomjesnog liječenja ili ako ste nedavno imali operaciju/traumu), ako je netko u Vašoj obitelji imao krvni ugrušak ili ako imate kroničnu bolest jetre
- ste imali kataraktu (zamućenje leće oka)
- imate problem s koštanom srži, uključujući oblike raka krvnih stanica, kao što su mijelodisplastični sindrom (MDS) ili mijelofibroza
- ste trudni, sumnjate na trudnoću ili planirate zatrudnjeti
- dojite ili planirate dojiti

Obavijestite svog liječnika ako Vi ili Vaše dijete...

- uzimate ili planirate uzeti bilo koji drugi lijek. Ovo uključuje:
 - ‡ antacide (lijekovi koji se uzimaju kod loše probave, žgaravice ili čireva na želucu) koji sadrži minerale, poput aluminija, kalcija ili magnezija
 - ‡ statine, koji se koriste za snižavanje kolesterol-a
 - ‡ lijekove za liječenje HIV infekcije, poput lopinavira ili ritonavira
 - ‡ lijekove ili dodatke koji sadrže kalcij, aluminij, željezo, magnezij, selen ili cink. To uključuje i neke lijekove dostupne bez recepta, biljne pripravke, mineralne i multivitaminske dodatke i proteinske pripravke
 - ‡ lijekove koji se koriste za liječenje raka, poput metotreksata ili topotekana
 - ‡ lijekove koji sprječavaju zgrušavanje krvi, poput antikoagulansa ili antitrombocitnih lijekova
 - ‡ bilo koje druge lijekove za ITP, kao što su kortikosteroidi, danazol ili azatioprin

- ste istočnoazijskog podrijetla (primjerice, iz Kine, Japana, Tajvana ili Koreje), jer to može značiti da trebate započeti liječenje eltrombopagom u smanjenoj dozi

Ne smijete primati eltrombopag ako:

- ste alergični (preosjetljivi) na aktivne sastojke eltrombopaga ili na bilo koji drugi sastojak sadržan u ovom proizvodu
- ‡ Provjerite sa svojim liječnikom ako mislite da bi se ovo moglo odnositi na Vas

Što je KRONIČNI ITP?

Vašu krv tvori mnoštvo različitih vrsta stanica, uključujući trombocite. To su sićušne stanice koje pomažu Vašoj krvi kod zgrušavanja i stvaranja krastica kako bi se spriječilo krvarenje, primjerice kada se porežete ili ogrebete.

Trombociti se stvaraju u koštanoj srži i u normalnim ih okolnostima prirodno uklanjuju slezena i jetra nakon otprilike sedam dana.

Međutim, kod bolesnika s ITP-om, antitijela napadaju trombocite i sprječavaju ih da pravilno rade. Ti se trombociti zatim uklanjuju iz tijela brže no što je uobičajeno.

Antitijela također ostvaruju međudjelovanje sa stanicama koje stvaraju nove trombocite, što znači da se proizvodi manje trombocita.

Kada broj uklonjenih trombocita premaši broj stvorenih trombocita, Vaš broj trombocita opada, što znači da se krv ne može normalno zgrušati. Pritom možete osjetiti simptome kao što su modrice, purpura (vrsta točkastog osipa), krvarenja iz nosa, krvarenje desni i nemogućnost kontroliranja krvarenja u slučaju da se porežete ili ozlijedite.

Ako Vi ili Vaše dijete bolujete od ITP-a duže od 12 mjeseci, to se naziva „kronični ITP“.

Što je eltrombopag?

Eltrombopag se koristi u liječenju imune (idiopatske) trombocitopenične purpure (ITP) u bolesnika u dobi od 1 godine i starijih koji su već uzimali druge lijekove, a bez odgovarajućeg učinka.

Kako djeluje

Djeluje na sličan način kao i prirodni hormoni u Vašem tijelu (zvani čimbenici rasta) koji povećavaju proizvodnju trombocita u koštanoj srži. To pak može povećati broj trombocita u Vašoj krvi.

Možda ste već primali druge lijekove čije djelovanje usporava uništavanje trombocita. TPO-R agonist, poput eltrombopaga, djeluje drugačije, pomažući Vašem tijelu da proizvede više trombocita. To bi trebalo povisiti broj trombocita i pomoći Vam da bolje kontrolirate svoj kronični ITP.

Što morate znati kad uzimate eltrombopag

Eltrombopag je dostupan
u četiri tablete različitih jačina:



12.5 mg



25 mg



50 mg



75 mg

Vaša tableteta eltrombopaga
može se razlikovati od gore prikazanih slika.

Liječnik će Vam reći koja je odgovarajuća
doza za Vas. Ovisno o tome kako reagirate na
liječenje, to se s vremenom može mijenjati.

Liječnik će Vas obavijestiti ako je potrebno
promijeniti Vaš plan liječenja. Nemojte mijenjati
broj tableta eltrombopaga koje uzimate, osim
ako Vas je tako uputio Vaš liječnik.

Kako uzimati eltrombopag

Eltrombopag trebate uzimati:

- u jednoj dnevnoj dozi
‡ Ako trebate uzeti više od jedne tablete, uzmite
ih sve istovremeno
- kroz usta, jednu po jednu, s vodom

Kako čuvati eltrombopag

Vašem eltrombopagu nisu potrebni nikakvi
posebni uvjeti za čuvanje, ali trebate ga držati
izvan pogleda i dohvata djece.

Nemojte koristiti eltrombopag nakon isteka roka
valjanosti navedenog na pakiranju.

Stvari koje treba znati kada se daje eltrombopag prašak za oralnu suspenziju

Za pedijatrijske bolesnike u dobi od 1 do 5 godina, eltrombopag je dostupan u obliku vrećica koje sadrže 25 mg praška za oralnu suspenziju.



Kako dati lijek

- Ne otvarajte foliju vrećice dok niste spremni za uporabu.
- Eltrombopag prašak smije se miješati samo s vodom.
- Prilikom pripreme oralne suspenzije eltrombopaga koristite bocu za miješanje za višekratnu uporabu i dozirnu štrcaljku za usta za višekratnu uporabu koje se nalaze u Vašem eltrombopag kompletu.



- Napunite čašu s vodom i, s klipom gurnutim do kraja u štrcaljku, gurnite vršak štrcaljke do kraja u vodu, povucite klip natrag do oznake za 20 ml. Ispraznite vodu u otvorenu bocu za miješanje.
- Stavite prašak iz vrećice u bocu, pazeći da ne prospete prašak izvan boce za miješanje.
- Zatvorite poklopac na boci i polako mučkajte bocu najmanje 20 sekundi. Ne tresite bocu joko, od toga bi se lijek mogao zapjenit.
- Umetnите vršak štrcaljke u rupu na poklopcu boce i okrenite bocu za miješanje naopako zajedno sa štrcaljkom te napunite štrcaljku s lijekom.
- Dajte lijek dijetetu tako da postavite vršak štrcaljke s unutarnje strane obraza dijeteta polako gurajući klip do kraja. Pazite da dijetet ima vremena da proguta otopinu.
- Kako biste bili sigurni da je dijetete dobilo sav lijek napunite bocu s 10 ml pitke vode i dajte dijetetu.



Dozu lijeka treba dati dijetetu unutar 30 minuta od pripreme. Ako ne upotrijebite lijek unutar 30 minuta od kad ste ga zamiješali, morat ćete zamiješati novu dozu.

Kada trebate (Vi ili Vaše dijete) uzeti eltrombopag?

Eltrombopag trebate uzimati jedanput na dan. O Vama ovisi u koje doba dana (ili noći) ćete ga uzimati. Međutim, bit će Vam lakše prisjetiti se ako ga uzimate u isto vrijeme svakog dana.

VAŽNO: Eltrombopag ne smijete uzimati s određenim namirnicama, pićima ili drugim lijekovima koji sadrže visoke koncentracije kalcija, željeza, magnezija, aluminija, selena ili cinka.

Međudjelovanje nije štetno, ali ipak sprječava Vaše tijelo da pravilno apsorbira eltrombopag, što znači da neće djelovati jednako dobro.

Zato morate uzimati eltrombopag najmanje 2 sata prije ili 4 sata poslije određenih namirnica, pića ili lijekova.

Kako praktično uklopiti eltrombopag u Vašu (dječju) dnevnu rutinu

Korisno je razmisliti o tome koje je najbolje vrijeme da uzmete svoju dozu eltrombopaga. To je naročito važno budući da eltrombopag ne smijete uzimati s određenim namirnicama, pićima ili lijekovima koji sadrže visoke koncentracije kalcija, željeza, magnezija, aluminija, selena ili cinka.


**Na sljedećim stranicama pronaći ćete preporuke
za to kako učiniti eltrombopag dijelom Vaše
dnevne rutine**

- Uzimanje eltrombopaga navečer prije spavanja
- Uzimanje eltrombopaga ujutro čim se probudite

Kako biste bili sigurni da postižete najbolje rezultate s eltrombopagom...


...uzmite eltrombopag

najmanje 2 sata prije...



...ili 4 sata poslije određenih
namirnica, pića i drugih lijekova

Uzimanje eltrombopaga prije odlaska na spavanje Vas ili Vašeg djeteta



Ako želite uzeti eltrombopag prije 22 sata, evo nekih namirnica koje možete jesti za večeru:

- Meso poput piletine, nemasne šunke ili govedine
- Bijela riba, npr. bakalar ili koljak
- Bezlisno povrće
- Krumpir, smeđa riža, tjestenina
- Voće
- Neobogaćeni (bez dodatka minerala) voćni sok
- Crna kava/čaj

ZAPAMTITE...

Uzmite eltrombopag najmanje 2 sata prije ili 4 sata poslije određenih namirnica:

- namirnice, pića ili lijekovi s visokim udjelom kalcija*
- mineralni dodaci ili obogaćene namirnice, tj. namirnice s dodatkom kalcija, željeza, magnezija, aluminija, selena ili cinka



Sir



Energetska pločica



Frapé




Sladoled

Trebate se posavjetovati sa svojim liječnikom ako imate dvojbi oko bilo kojeg aspekta uzimanja eltrombopaga

* 'S visokim udjelom kalcija' znači namirnice, pića ili lijekovi koji sadrže 50 mg ili više kalcija. Svakako proučite nutritivne informacije na pakiranju, ili, ako niste sigurni, posavjetujte se sa svojim liječnikom.

Uzimanje eltrombopaga čim se probudite



Namirnice koje možete jesti za doručak su:

- Zobena kaša
- Neobogaćeno sojino mlijeko
- Hladni naresci poput nemasne šunke
- Voće
- Male porcije oraha ili grožđica
- Crna kava/čaj
- Neobogačeni voćni sok

ZAPAMTITE...

Uzmite eltrombopag najmanje 2 prije ili 4 sata poslije određenih namirnica:

- namirnice, pića ili lijekovi s visokim udjelom kalcija*
- mineralni dodaci ili obogaćene namirnice, tj. namirnice s dodatkom kalcija, željeza, magnezija, aluminija, selena ili cinka



Mlijeko



Jogurt



Obogaćene žitarice



Obogaćeni sokovi

Trebate se posavjetovati sa svojim liječnikom ako imate dvojbi oko bilo kojeg aspekta uzimanja eltrombopaga

* 'S visokim udjelom kalcija' znači namirnice, pića ili lijekovi koji sadrže 50 mg ili više kalcija. Svakako proučite nutritivne informacije na pakiranju, ili, ako niste sigurni, posavjetujte se sa svojim liječnikom.

Druge stvari koje TREBATE UZETI U OBZIR

Minerali koji ostvaruju međudjelovanje s eltrombopagom nalaze se i u nekim lijekovima. Kao što vrijedi i za namirnice bogate kalcijem, pazite da uzmete eltrombopag najmanje 2 sata prije ili 4 sata poslije uzimanja sljedećih lijekova:

- određene antacide (lijekove koji se uzimaju kod loše probave, žgaravice ili čireva na želucu)
- lijekove i dodatke koji sadrže kalcij, aluminij, željezo, magnezij, selen ili cink. To uključuje neke lijekove dostupne bez liječničkog recepta, mineralne i multivitaminske dodatke te proteinske pripravke.

Ako morate uzeti neki antacid, budite sigurni da ste eltrombopag uzeli najmanje 2 sata prije ili 4 sata poslije uzimanja antacida.

- Zamolite svog liječnika da Vam savjetuje za koju je vrstu antacida manje vjerojatno da će utjecati na Vaš lijek za ITP.



Obavijestite svog liječnika ako uzimate ikakve druge lijekove, uključujući:

- statine, koji se koriste za snižavanje kolesterola
- lijekove koji se koriste za liječenje HIV-a, poput lopinavira ili ritonavira
- lijekove za kemoterapiju, poput topotekana ili metotreksata
- lijekove koji sprječavaju zgrušavanje krvи, poput antikoagulansa ili antitrombocitnih lijekova
- druge lijekove za ITP, poput kortikosteroida, danazola ili azatioprina
- oralne kontraceptive ili hormonsko nadomjesno liječenje
- biljne pripravke i druge lijekove koje ste nabavili bez liječničkog recepta

Ako ste trudni ili dojite

Ne smijete uzimati eltrombopag ako ste trudni, osim ako Vam Vaš liječnik to izričito preporuči. Učinak uzimanja eltrombopaga tijekom trudnoće nije poznat.

- Obavijestite svog liječnika ako zatrudnите, ili ako planirate zatrudnjeti tijekom uzimanja eltrombopaga
- Koristite pouzdanu metodu kontracepcije dok uzimate eltrombopag

Ne smijete dojiti dok uzimate eltrombopag. Obavijestite svog liječnika ako dojite ili planirate dojiti.

Vaš liječnik Vam može preporučiti da obavite pretrage za otkrivanje katarakte

U ispitivanjima na životinjama primijećene su katarakte (zamućenje leće oka) kod primjene eltrombopaga. Klinička značajnost ovih nalaza nije poznata, a kod ispitivanja na ljudima za sada nije otkriven povećani rizik od katarakti. Vaš liječnik Vam može preporučiti da obavite pretrage za katarakte u sklopu rutinskih pretraga očiju.

Što možete očekivati od eltrombopaga

Kada se ispravno uzima, eltrombopag bi Vam (ili Vašem dijetetu) trebao pomoći da kontrolirate svoj kronični ITP te smanjiti učinke koje ima na Vaše tijelo, primjerice krvarenje.

Tijekom prvih tjedana

Kod lijekova koji se uzimaju svaki dan, kao što je eltrombopag, može biti potrebno nešto vremena dok lijek ne počne djelovati. Obično može proći do 2 tjedna dok Vaše tijelo ne počne reagirati na eltrombopag, zato se nemojte brinuti ako odmah ne primijetite promjene.

Kad prvi put počnete uzimati eltrombopag, liječnik će Vam morati obaviti krvne pretrage svakog tjedna kako bi provjerio broj Vaših krvnih stanica i trombocita. Također će Vam se provjeriti funkcije jetre prije i tijekom terapije eltrombopagom. Ovisno o Vašoj početnoj reakciji na terapiju, liječnik Vam može preporučiti da promijenite jačinu tablete.

Kada liječnik utvrđi da Vam jačina tablete može ostati ista, morat ćete obavljati krvne pretrage samo jednom mjesечно. Vaš liječnik će nastaviti pratiti kako reagirate na terapiju kako bi odlučio trebate li nastaviti uzimati eltrombopag.

Što učiniti ako Vi ili Vaše dijete osjetite NUSPOJAVE

Kao i kod svih lijekova, možda ćete osjetiti neke nuspojave uzimanja eltrombopaga i kada se pojave morate o tome obavijestiti svog liječnika, medicinsku sestru ili ljekarnika. Liječnik će Vas također pomno nadzirati kako bi se utvrdilo je li došlo do nuspojava tijekom liječenja eltrombopagom.

**Nemojte prestati uzimati lijek, a da se prethodno
niste posavjetovali sa svojim liječnikom.**

Priprema će Vam pomoći da kontrolirate moguće nuspojave, ako do njih dođe. U nastavku su navedeni neki prijedlozi koji Vam mogu pomoći da kontrolirate češće nuspojave koje eltrombopag može prouzročiti:

Ako osjetite glavobolju:

- pijte puno vode
- ograničite unos kofeina
- izbjegavajte jarku svjetlost, glasne zvukove, snažne mirise

Ako osjećate mučninu:

- Promijenite svoje prehrambene navike:
 - ‡ jedite prije nego što osjetite glad
 - ‡ jedite male obroke tijekom dana
 - ‡ pijte tekućinu u malim gutljajima tijekom dana
 - ‡ izbjegavajte masnu, vrlo slatku ili začinjenu hranu

Ako imate proljev:

- Pokušajte promijeniti način na koji jedete:
 - ‡ pijte puno vode
 - ‡ jedite nemasnu hranu bogatu bjelančevinama, kao što su nemasni naresci umjesto pržene, masne ili začinjene hrane
 - ‡ izbjegavajte mlijeko i mliječne proizvode, uključujući sladoled
 - ‡ jedite kuhanu povrće umjesto sirovog i ogulite voće prije nego ga pojedete
 - ‡ izbjegavajte biljne pripravke jer neki od njih mogu uzrokovati proljev

**NE ZABORAVITE uzeti eltrombopag
najmanje 2 sata prije ili 4 sata
poslije korištenja određenih
namirnica, pića i lijekova**

Ostale nuspojave koje se mogu pojaviti kod uzimanja eltrombopaga

Veliki broj trombocita

Ako Vaš broj trombocita postane previsok, liječnik Vam može prilagoditi jačinu tablete ili Vas zamoliti da prestanete uzimati eltrombopag.

Problemi s jetrom

Trebate se odmah posavjetovati sa svojim liječnikom ako primijetite znakove ili simptome problema s jetrom, kao što su:

- omamljenost
- hiperventilacija
- drhtanje ruku
- žutilo kože ili bjeloočnica (žutica)
- otečeni trbuh ili gležnjevi
- vrlo tamna mokraća

Krvarenje (nakon prestanka liječenja)

U 8% bolesnika koji su sudjelovali u kliničkim ispitivanjima, nakon prestanka uzimanja eltrombopaga broj trombocita pao je niže od razine prije uzimanja eltrombopaga. Obavijestite svog liječnika ako krvarite ili imate modrice u 4 tjedna nakon što prestanete uzimati eltrombopag.

Rizik od krvnih ugrušaka

Eltrombopag Vam može povećati rizik od razvoja krvnih ugrušaka. Rizik Vam je povećan ako: pušite, u poodmakloj ste dobi, uzimate oralne kontraceptive ili hormonsko nadomjesno liječenje, nedavno ste imali operaciju/traumu, imate prekomjernu tjelesnu težinu (pretili ste), proveli ste dugo vremena u krevetu, imate neku genetsku predispoziciju u obitelji ili imate kroničnu bolest jetre. Trebate se odmah posavjetovati sa svojim liječnikom ako imate bilo kakve simptome krvnog ugruška, kao što su:

- oticanje, bol ili osjetljivost u jednoj nozi
- iznenadni nedostatak zraka, naročito ako uz to imate oštru bol u prsim, i/ili ubrzano disanje

- bol u trbuhu, povećan (otečen) trbuh ili krvava stolica

Problemi s koštanom srži

Oboljeli od ITP-a mogu imati probleme sa koštanom srži (tkivom u kostima), a lijekovi, uključujući eltrombopag, mogu pogoršati ovaj problem. Vaš liječnik će možda obaviti pretrage kako bi ispitalo Vašu koštanu srž tijekom liječenja eltrombopagom.

Pogoršanje oblika raka krvnih stanica

Prije nego što počnete uzimati eltrombopag Vaš liječnik će obaviti pretrage kako bi provjerio da li imate ITP, a ne neku drugu bolest, kao što je mijelodisplastični sindrom (MDS). Ako imate MDS i primate eltrombopag, stanje Vašeg MDS-a može se pogoršati. Upitajte svog liječnika za dodatni savjet.

Često postavljana PITANJA

Ovaj dio pokriva neka od često postavljanih pitanja o eltrombopagu. Ako imate pitanje na koje ovdje nije ponuđen odgovor, obratite se svom liječniku.

?

Zaboravio/la sam uzeti svoju dozu eltrombopaga, što da učinim?

Uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme i obavijestite svog liječnika. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljene doze.

?

Uzeo/la sam previše eltrombopaga, što da učinim?

Odmah se posavjetujte sa svojim liječnikom, medicinskom sestrom ili ljekarnikom. Ako je moguće, pokažite im pakiranje u kojem se lijek nalazi ili uputu koju ste dobili uz njega. Vaš liječnik bi Vas trebao pratiti radi mogućih znakova nuspojava i pobrinuti se da odmah dobijete odgovarajuće liječenje.

?

Što da učinim ako povratim nakon uzimanja eltrombopaga?

Pričekajte do sljedećeg dana i uzmite dozu u uobičajeno vrijeme. Ako Vam je često mučno nakon uzimanja eltrombopaga, posavjetujte se o tome sa svojim liječnikom.

? Konzumirao/la sam mlijecne proizvode i uzeo/la dozu eltrombopaga, što da učinim?

Moguće je da Vaše tijelo nije do kraja apsorbiralo dozu lijeka. Uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme. Posavjetujte se sa svojim liječnikom ako imate nedoumica i pridržavajte se njegovih preporuka da uzmete eltrombopag najmanje 2 sata prije ili 4 sata poslije uzimanja izbjegavate kalcija i mlijecnih proizvoda.

Također je važno prisjetiti se da treba uzeti eltrombopag najmanje 2 sata prije ili 4 sata poslije određenih namirnica, pića ili lijekova koji sadrže visoke koncentracije željeza, magnezija, aluminija, selena ili cinka, kao i kalcija.

? Što ako mi nuspojave budu prejake da bih ih kontrolirao/la?

Ako nuspojave postanu prejake, posavjetujte se sa svojim liječnikom; on/ona Vam može dati savjet o tome kako ih bolje kontrolirati. Nemojte prestati uzimati eltrombopag a da se prethodno niste posavjetovali sa svojim liječnikom.

? Što ako zatrudnim?

Ako zatrudnite, odmah obavijestite svog liječnika. On/ona će Vam dati savjet o tome kako najbolje postupiti.

? Što da učinim ako imam preostalih tableta eltrombopaga, ili tableta kojima je istekao rok valjanosti?

Nemojte koristiti eltrombopag nakon isteka roka valjanosti otisnutog na kartonskom i blister pakiranju. Ako imate preostalih tableta eltrombopaga ili tableta kojima je istekao rok valjanosti, trebate upitati svog ljekarnika kako ih baciti. Ne smije ih se baciti u odvod niti u kantu zajedno s ostalim otpadom iz kućanstva.

? Kada ču prestati uzimati eltrombopag?

Nemojte prestati uzimati eltrombopag a da se prije niste posavjetovali sa svojim liječnikom. Ako Vi i Vaš liječnik odlučite da biste trebali prestati uzimati eltrombopag, liječnik će Vam provjeravati broj trombocita barem 4 tjedna nakon što uzmete svoju zadnju dozu lijeka kako bi se nadziralo Vaše stanje.

Bilješke:

O svim sumnjama na nuspojave lijeka trebate obavijestiti svog liječnika ili ljekarnika, odnosno drugog zdravstvenog radnika s kojim ste u stupili u kontakt. O sumnji na nuspojavu možete izvijestiti Agenciju za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) putem

- on-line prijave nuspojava dostupne na internetskoj stranici www.halmed.hr ili
- pisano putem obrasca za prijavu nuspojave za pacijenta/korisnika dostupnog na internetskoj stranici www.halmed.hr. Nuspojavu može prijaviti korisnik lijeka, roditelj, zakonski zastupnik ili skrbnik poštom na adresu Ksaverska cesta 4, 10000 Zagreb, telefaksom (01/4884-110) ili elektroničkom poštom u Word formatu (nuspojave@halmed.hr)

