

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

Abemot 1 mg filmom obložene tablete

Abemot 2 mg filmom obložene tablete

prukaloprid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

1. Što je Abemot i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Abemot
3. Kako uzimati Abemot
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Abemot
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Abemot i za što se koristi

Abemot sadrži djelatnu tvar prukaloprid.

Abemot pripada skupini lijekova koji pojačavaju kretanje probavne cijevi (probavni prokinetici). On djeluje na mišićnu stijenku crijeva i pomaže da se ponovno uspostavi normalno funkcioniranje crijeva. Abemot se primjenjuje za liječenje kroničnog zatvora u odraslih u kojih laksativi ne djeluju dovoljno dobro.

Nije za primjenu u djece i adolescenata mlađih od 18 godina.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Abemot

Nemojte uzimati Abemot:

- ako ste alergični na prukaloprid ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6),
- ako ste na bubrežnoj dijalizi,
- ako bolujete od perforacije (puknuća) ili opstrukcije (začepljenosti) crijeva ili teške upalne bolesti crijeva, kao što su Crohnova bolest, ulcerozni kolitis ili toksični megakolon/megarektum.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Abemot:

- ako bolujete od teške bolesti bubrega,
- ako bolujete od teške bolesti jetre,
- ako ste trenutno pod liječničkim nadzorom zbog ozbiljnog zdravstvenog stanja, kao što su bolest pluća ili srca, problemi sa živčanim sustavom ili mentalnim zdravljem, rak, SIDA ili hormonski poremećaj.

Ako imate vrlo jak proljev, kontracepcijske tablete možda neće ispravno djelovati pa se preporučuje dodatna metoda kontracepcije. Pročitajte uputu o lijeku za kontracepcijske tablete koje uzimate.

Drugi lijekovi i Abemot

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Abemot s hranom i pićem

Abemot se može uzimati s hranom i pićem ili bez njih, u bilo koje doba dana.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ne preporučuje se primjena lijeka Abemot tijekom trudnoće. Obavijestite svog liječnika ako ste trudni ili planirate imati dijete. Koristite pouzdanu metodu kontracepcije dok uzimate Abemot, kako biste spriječili trudnoću. Ako zatrudnite za vrijeme liječenja lijekom Abemot, obavijestite svog liječnika.

Ako dojite, prukaloprid može prijeći u majčino mlijeko. Za vrijeme liječenja lijekom Abemot, dojenje se ne preporučuje. Razgovarajte o tome sa svojim liječnikom.

Upravljanje vozilima i strojevima

Abemot najvjerojatnije neće utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima ili rada na strojevima. Međutim, Abemot ponekad može uzrokovati omaglicu i umor, osobito prvog dana liječenja, i to može utjecati na sposobnost upravljanja vozilima ili rada na strojevima.

Abemot sadrži laktozu

Abemot 1 mg: Jedna filmom obložena tableta sadrži 77,18 mg laktoze hidrata.

Abemot 2 mg: Jedna filmom obložena tableta sadrži 154,36 mg laktoze hidrata.

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se svom liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

3. Kako uzimati Abemot

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Uzimajte Abemot svaki dan onoliko dugo koliko Vam je to propisao liječnik.

Liječnik će možda htjeti provjeriti Vaše zdravstveno stanje i korist od nastavka liječenja nakon prva 4 tjedna te u redovitim vremenskim razmacima nakon toga.

Preporučena doza lijeka Abemot za većinu je bolesnika jedna tableta od 2 mg jedanput na dan.

Ako ste stariji od 65 godina ili imate tešku bolest jetre, početna doza je jedna tableta od 1 mg jedanput na dan, koju Vaš liječnik može po potrebi povisiti na 2 mg jedanput na dan.

Ako imate tešku bolest bubrega, liječnik Vam može preporučiti i dozu koja je niža od jedne tablete od 1 mg na dan.

Uzimanje doze koja je viša od preporučene neće pojačati djelovanje lijeka.

Primjena u djece i adolescenata

Abemot je namijenjen samo odraslima, a djeca i adolescenti u dobi do 18 godina ne smiju ga uzimati.

Ako uzmete više lijeka Abemot nego što ste trebali

Važno je da se pridržavate doze koju Vam je propisao liječnik. Ako ste uzeli više lijeka Abemot nego što ste trebali, postoji mogućnost da dobijete proljev, glavobolju i/ili mučninu. U slučaju proljeva, pazite da pijete dovoljno tekućine.

Ako ste zaboravili uzeti Abemot

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu. Jednostavno uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme.

Ako prestanete uzimati Abemot

Ako prestanete uzimati Abemot, mogu Vam se vratiti simptomi zatvora.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se neće javiti kod svakoga. Nuspojave uglavnom nastaju na početku liječenja i obično nestaju u roku od nekoliko dana s nastavkom liječenja.

Sljedeće nuspojave zabilježene su vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba): glavobolja, mučnina, proljev i bol u trbuhu.

Sljedeće nuspojave zabilježene su često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba): smanjen apetit, omaglica, povraćanje, probavne tegobe (dispepsija), vjetrovi, neprirodni probavni zvukovi, umor.

Opažene su i sljedeće manje česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba): nevoljno drhtanje, lupanje srca, krvarenje iz debelog crijeva, učestalo mokrenje (polakizurija), vrućica i loše osjećanje. U slučaju lupanja srca, molimo obratite se svom liječniku.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: [navedenog u Dodatku V](#).

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Abemot

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na blisteru i kutiji iza oznake "EXP". Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Abemot sadrži

- Djelatna tvar je prukaloprid.

Abemot 1 mg: Jedna filmom obložena tableta sadrži 1 mg prukaloprida (u obliku prukalopridsukcinata).

Abemot 2 mg: Jedna filmom obložena tableta sadrži 2 mg prukaloprida (u obliku prukalopridsukcinata).

- Drugi sastojci su:

Jezgra tablete: laktoza hidrat, mikrokristalična celuloza, silicijev dioksid koloidni bezvodni, magnezijev stearat;

Ovojnica tablete: Opadry II white 32K280000: hipromeloza, laktoza hidrat, titanijev dioksid (E171), triacetin; željezov oksid, crveni (E172) (samo za jačinu 2 mg)

Kako Abemot izgleda i sadržaj pakiranja

Abemot 1 mg filmom obložene tablete su bijele, okrugle, bikonveksne filmom obložene tablete, s utisnutom oznakom "10" na jednoj strani i bez oznaka na drugoj strani, promjera jezgre 6 mm.

Abemot 2 mg filmom obložene tablete su ružičaste, okrugle, bikonveksne filmom obložene tablete, s utisnutom oznakom "20" na jednoj strani i bez oznaka na drugoj strani, promjera jezgre 8 mm.

Abemot filmom obložene tablete su pakirane u Alu/Alu blistere.

Pakiranje sadrži 28 filmom obloženih tableta.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet i proizvođač**Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet**

Abela Pharm d.o.o.

Radnička cesta 218

10000 Zagreb

Republika Hrvatska

Proizvođač

Medochemie Ltd. (Factory AZ),

2 Michael Erakleous Street, Agios Athanassios Industrial Area,

Agios Athanassios,

Limassol, 4101, Cipar

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u ožujku 2026