

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Alprazolam Grindeks 0,25 mg tablete Alprazolam Grindeks 0,5 mg tablete Alprazolam Grindeks 1 mg tablete

alprazolam

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Alprazolam Grindeks i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Alprazolam Grindeks
3. Kako uzimati Alprazolam Grindeks
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Alprazolam Grindeks
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Alprazolam Grindeks i za što se koristi

Alprazolam Grindeks je sedativ i pripada skupini lijekova nazvanih benzodiazepini. Alprazolam Grindeks se primjenjuje u odraslih osoba za liječenje simptoma tjeskobe koji su teški, onesposobljavajući ili bolesniku uzrokuju veliku duševnu bol. Ovaj lijek je namijenjen samo za kratkotrajnu primjenu.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Alprazolam Grindeks

Nemojte uzimati Alprazolam Grindeks:

- ako ste alergični na alprazolam ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
- ako bolujete od bolesti koja se zove mijastenija gravis i koja uzrokuje slabost i umor mišića
- ako imate ozbiljnih poteškoća s disanjem (npr. kronični bronhitis ili emfizem)
- ako bolujete od apneje u snu - to je stanje gdje disanje tijekom spavanja postaje nepravilno, čak na kratko i prestaje
- ako imate teško oštećenje jetre

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Alprazolam Grindeks:

- ukoliko zlorabite ili ste zlorabili alkohol, opojne droge i lijekove
- ako ste uzimali alprazolam kroz dulje vrijeme je učinak bi mogao biti oslabljen
- ako ste općeg lošeg stanja
- ako imate problema s plućima, bubrezima ili jetrom
- ako uzimate druge lijekove za liječenje psihičkih bolesti

Ovisnost

Primjena lijeka Alprazolam Grindeks može dovesti do fizičke i psihičke ovisnosti o lijeku. Rizik od

ovisnosti se povećava s dozom i trajanjem liječenja. Zbog toga trajanje liječenja mora biti što je moguće kraće. Slijedite preporuke liječnika o dozi (vidjeti dio 3). Ako primijetite da ne želite prestati uzimati ovaj lijek, možda ste psihički ovisni o njemu. Psihička ovisnost znači da se simptomi ustezanja javljaju kada se naglo prekine liječenje ovim lijekom. Rizik je također veći u bolesnika koji zlorabe ili su zlorabili alkohol i lijekove (vidjeti također dio 3. „Ako prestanete uzimati Alprazolam Grindeks“). Zloupotreba je poznat rizik za Alprazolam Grindeks. Zloupotreba ovog lijeka može dovesti do predoziranja i smrti. Uvijek slijedite preporuke liječnika o dozi. Ovaj lijek može biti poželjan za osobe koje zloupotrebljavaju lijekove na recept i treba ga držati izvan dohvata drugih osoba.

Učinci na pamćenje

Tijekom liječenja alprazolamom može doći do poremećaja pamćenja. Problemi se obično javljaju nekoliko sati nakon uzimanja lijeka. Obratite se svom liječniku ako primijetite ovakav simptom. Kako biste smanjili rizik, morate osigurati da ćete imati cjelonoćni san (7-8 sati) za vrijeme uzimanja lijeka.

Mentalna bolest (psihoza)

Ukoliko imate psihozu, ozbiljnu mentalnu bolest koja izaziva poremećaj u ponašanju, aktivnostima i samokontroli, tada Alprazolam Grindeks nije primjeren.

Učinci na raspoloženje

Liječenje lijekom Alprazolam Grindeks može povećati rizik od pojave epizoda hipomanije (blaži oblik manije) ili manije (hiperaktivno mentalno, pretjerano ushićenje i energiziranost) u bolesnika s depresijom. Odmah se obratite svom liječniku ako se razviju simptomi manije ili hipomanije.

Depresija, misli o samoozljeđivanju ili samoubojstvu

Liječenje alprazolamom može povećati rizik od misli o samoozljeđivanju i samoubojstvu ukoliko imate depresiju. Posavjetujte se sa svojim liječnikom prije početka liječenja alprazolamom. Ako je liječenje alprazolamom neophodno, a Vi imate depresiju ili ste prije imali misli o samoozljeđivanju ili samoubojstvu, Vaš liječnik će pažljivo pratiti Vaše liječenje. **Odmah** se javite svom liječniku ili otidite u najbližu bolnicu ako Vam se pojave misli o samoozljeđivanju ili samoubojstvu.

Starije osobe

Budite posebno pažljivi kod korištenja alprazolama ako ste starije dobi jer može uzrokovati povećani umor i/ili slabost mišića što povećava rizik od padova.

Djeca i adolescenti

Ovaj lijek se ne preporučuje u djece i adolescenata mlađih od 18 godina jer nije utvrđena sigurnost i djelotvornost.

Drugi lijekovi i Alprazolam Grindeks

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Učinak liječenja može se promijeniti ukoliko se Alprazolam Grindeks primijenjuje istodobno s lijekovima koji se koriste za liječenje dolje navedenih stanja. Vaš liječnik će možda trebati prilagoditi dozu.

- Problemi s mentalnim zdravljem (antipsihotički lijekovi, uključujući klopazin)
- Poremećaji spavanja (tablete za spavanje)
- Alergije ili peludna groznica (određeni antihistaminici)
- Ako planirate veći operativni zahvat (anestetici)
- Jaka bol (narkotički analgetici, npr. dekstropropoksifen)
- Odkikavanje od opojnih droga (zamjenska terapija)

- Problemi s anksioznosti i depresijom (određeni antidepresivi koji sadrže fluoksetin, fluvoksamin, nefazodon ili imipramin)
- Zatajenje srca (digoksin)
- Infekcije (antibiotici koji sadrže eritromicin, klaritromicin i telitromicin)
- Gljivične infekcije (itrakonazol, flukonazol, ketokonazol, posakonazol, vorikonazol)
- Angina pektoris i visoki krvni tlak (npr. diltiazem)
- HIV infekcija (inhibitori proteaze HIV-a, npr. ritonavir)
- Žgaravica i čir želuca (npr. cimetidin, omeprazol)
- Astma i bronhitis (npr. teofilin)
- Epilepsija (npr. karbamazepin)
- Lijekovi za opuštanje mišića. Kada se koriste zajedno s alprazolamom mogu povećati učinak na opuštanje mišića, čime se povećava rizik od pada.

Istodobna primjena lijeka Alprazolam Grindeks i opioida (jaki lijekovi protiv boli, lijekovi za nadomjesnu terapiju i neki lijekovi protiv kašlja) povećava rizik od omamljenosti, poteškoća u disanju (depresije disanja), kome te može biti opasno po život. Zbog toga se istodobna primjena treba uzeti u obzir samo ako druge mogućnosti liječenja nisu moguće.

Međutim, ako Vaš liječnik propiše Alprazolam Grindeks zajedno s opioidima, mora ograničiti dozu i trajanje istodobnog liječenja.

Obavijestite liječnika o svim opioidnim lijekovima koje uzimate i pomno pratite preporuke liječnika o doziranju. Bilo bi korisno obavijestiti prijatelje ili rodbinu da budu svjesni gore navedenih znakova i simptoma. Obratite se liječniku ako se pojave opisani simptomi.

Također postoji mogućnost utjecaja na učinak alprazolama kod istodobnog liječenja s bilo kojim od slijedećih lijekova: kontracepcijska pilula, rifampicin (protiv infekcija) i gospina trava (biljni lijek).

Alprazolam Grindeks s alkoholom

Nužno je suzdržati se od alkohola tijekom liječenja lijekom Alprazolam Grindeks jer alkohol može promijeniti i pojačati učinak lijeka Alprazolam Grindeks na nepredvidljive načine.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća

Morate odmah reći svom liječniku ako ste trudni ili planirate imati dijete. Iskustva u ljudi ukazuju da alprazolam može štetiti nerođenom djetetu (povećan rizik od malformacije kao što je rascjep nepca). Alprazolam se može uzimati tijekom trudnoće samo ako je Vaš liječnik prosudio da korist primjene lijeka nadmašuje rizike primjene na nerođeno dijete i da je primjeren za Vas.

Ako koristite Alprazolam Grindeks sve do poroda, obavijestite svog liječnika jer novorođenče može imati neke simptome odvikavanja nakon rođenja.

Dojenje

Alprazolam Grindeks se ne smije uzimati tijekom dojenja. Alprazolam se izlučuje u majčino mlijeko. Ukoliko liječnik odluči da trebate uzimati ovaj lijek, morate prekinuti dojenje.

Upravljanje vozilima i strojevima

Čak i kad se Alprazolam Grindeks uzima na preporučeni način, može ozbiljno utjecati na sposobnost reakcije do te mjere da je narušena sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima. Ovaj rizik je posebno visok na početku liječenja., kad se povisuje doza, ukoliko niste dovoljno spavali ili ste

konzumirali alkohol ili uzeli druge tvari koje djeluju na središnji živčani sustav. Zbog toga nemojte voziti niti upravljati strojevima ili poduzimati druge rizične radnje, barem prvih dana liječenja. Liječnik koji propisuje liječenje odlučuje o tome u svakom individualnom slučaju.

Alprazolam Grindeks sadrži laktozu, natrij i natrijev benzoat (E211)

Laktoza: Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka.
Natrij: Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po dozi, tj. zanemarive količine natrija.
Natrijev benzoat: Ovaj lijek sadrži 0,12 mg natrijevog benzoata u jednoj tableti.

3. Kako uzimati Alprazolam Grindeks

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Ukoliko Vaš liječnik nije drugačije propisao, primjenjuje se sljedeća smjernica:

Početna doza: općenito, liječenje treba započeti dozom od 0,25 do 0,5 mg alprazolama, tri puta dnevno.

Doza održavanja: ukoliko je klinički potrebno Vaš liječnik može postepeno povisiti dozu do 3 ili 4 mg, podijeljeno u nekoliko doza tijekom dana.

Starije osobe, bolesnici osjetljivi na sedativne učinke alprazolama ili oslabljeni bolesnici

Ukoliko ste stariji i osjetljiviji bolesnik i trebate niže doze, normalno ćete započeti liječenje dozom od 0,25 mg tri puta dnevno. Ukoliko je potrebno i ukoliko nemate nuspojave, ova se doza može postepeno povisiti.

Bolesnici s oštećenjem bubrega i jetre

Ukoliko imate problema s bubrezima i jetrom, Vaš će liječnik prilagoditi dozu.

Primjena u djece i adolescenata

Djeca i adolescenti u dobi ispod 18 godina ne smiju uzimati Alprazolam Grindeks.

Način primjene

Alprazolam Grindeks se primjenjuje kroz usta. Uzmite tabletu uz nešto tekućine (npr. pola čaše vode). Tablete imaju na sebi razdjelni urez i tableta se može podijeliti u dvije jednake doze.

Trajanje liječenja

Rizik od ovisnosti i zlouporabe može se povećati s dozom i trajanjem liječenja. Liječnik će stoga propisati najmanju moguću učinkovitu dozu i trajanje liječenja, te će često ponovno procjenjivati potrebu za nastavkom liječenja.

Maksimalno trajanje liječenja ne smije biti dulje od 2-4 tjedna. Ne preporučuje se dugotrajno liječenje. Može doći do smanjenog učinka lijeka ako se koristi dulje od nekoliko tjedana.

Ako uzmete više lijeka Alprazolam Grindeks nego što ste trebali

Uzmete li veću dozu lijeka Alprazolam Grindeks nego što ste trebali, odmah se javite svom liječniku ili idite u najbližu bolnicu. Znakovi blagog predoziranja mogu biti omamljenost, ošamućenost, problemi s vidom, nerazgovjetan govor, pad krvnog tlaka, nesiguran hod/pokreti i slabost mišića. U slučaju teškog trovanja mogu se javiti dubok san, moguća nesvjesnost, isprekidano disanje i cirkulatorni kolaps. Nužna je intenzivna njega i nadzor bolesnika.

Liječnik mora napraviti procjenu težine otrovanja i odlučiti o mjerama liječenja.

Ako ste zaboravili uzeti lijek Alprazolam Grindeks

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Preskočite zaboravljenu dozu i uzmite sljedeću dozu lijeka Alprazolam Grindeks prema rasporedu koji je propisao Vaš liječnik.

Ako prestanete uzimati lijek Alprazolam Grindeks

Uvijek se savjetujte sa svojim liječnikom prije nego što prestanete uzimati lijek Alprazolam Grindeks jer se doza treba postupno smanjivati. U slučaju naglog prekida liječenja, mogu doći do povratnog djelovanja što može privremeno prouzročiti veću tjeskobu i nemir ili poteškoće sa spavanjem. Kod nekih osoba mogu se javiti simptomi ustezanja (vidjeti dio 4 „Ovisnost i simptomi ustezanja“). Ovi će simptomi nestati kad se tijelo prilagodi. Ukoliko ste zabrinuti, Vaš liječnik će Vam reći više o tome. Stoga će Vaš liječnik postupno smanjivati dozu prilikom prekida liječenja. Smanjenje doze je prilagođeno individualnim potrebama i ovisi o nekoliko čimbenika (kao što je duljina trajanja liječenja i Vaša dnevna doza). Razgovarajte s Vašim liječnikom o postupnom smanjenju doze.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Razlozi zbog kojih se morate odmah obratiti liječniku

Ako dobijete bilo koju od sljedećih nuspojava, odmah se obratite Vašem liječniku jer će Vam se liječenje morati prekinuti. Vaš liječnik će Vam reći na koji način treba prekinuti liječenje.

- Liječenje alprazolamom može uzrokovati ozbiljne učinke na ponašanje i psihijatrijske učinke – primjerice. uznemirenost, nemir, agresivnost, razdražljivost, nasilan bijes, lažna uvjerenja, noćne more i halucinacije ili drugo neprikladno ponašanje.
- Iznenadno piskanje, poteškoće s gutanjem ili disanjem, oticanje očnih kapaka, lica ili usana, osip ili svrbež (osobito ako je zahvaćeno cijelo tijelo).

Razlozi zbog kojih se morate što prije obratiti liječniku

Ako dobijete bilo koji od sljedećih simptoma, što prije se obratite Vašem liječniku jer će možda biti potrebno promijeniti dozu lijeka ili liječenje.

- Gubitak pamćenja (amnezija).
- Žuta boja kože i bjeloočnica (žutica).

Ovisnost i simptomi ustezanja:

Može se razviti ovisnost o lijekovima kao što je alprazolam kada ih uzimate, a što povećava mogućnost pojave simptoma ustezanja nakon prestanka uzimanja lijeka. Simptomi ustezanja će biti češći ako:

- iznenada prekinete liječenje
- uzimate visoke doze
- uzimate lijek kroz dulje vrijeme
- imate u povijesti bolesti zlouporabu alkohola ili lijekova.

Ovo može izazvati simptome kao što su glavobolja, bol u mišićima, iznimna tjeskoba, napetost, nemir, smetenost, promjene raspoloženja, poteškoće sa spavanjem i razdražljivost.

U težim slučajevima ustezanja, također se mogu javiti sljedeći simptomi: mučnina (osjećaj da ćete povratiti), povraćanje, znojenje, grčevi u želucu, grčevi u mišićima, osjećaj nerealnosti i odvojenosti, neobična preosjetljivost na zvuk, svjetlo ili fizički dodir, utrnulost i trnci u stopalima i dlanovima, halucinacije (vidna ili slušna priviđenja stvari koje ne postoje dok ste budni), nevoljno drhtanje, epileptički napadaji. Molimo obavijestite svog liječnika ukoliko se bilo koji od simptoma ustezanja

pogorša ili ne prestaje.

Ostale moguće nuspojave koje se mogu javiti su:

Vrlo često: mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba

- depresija
- pospanost i omamljenost
- grčeviti ili nekontrolirani pokreti
- nemogućnost pamćenja podataka
- nerazgovjetan govor
- omaglica, ošamućenost
- glavobolja
- zatvor
- suha usta
- umor
- razdražljivost

Često: mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba

- smanjen apetit
- smetenost i dezorijentacija
- promjene spolnog nagona (kod muškaraca i žena)
- nervoza ili osjećaj tjeskobe ili uznemirenosti
- nesаница (nemogućnost spavanja ili poremećaj spavanja)
- poremećaj ravnoteže i nestabilnost (slično osjećaju opijenosti) osobito tijekom dana
- gubitak budnosti ili koncentracije
- nemogućnost održavanja budnosti, osjećaj tromosti
- tresenje ili drhtanje
- dvoslike i zamućen vid
- mučnina
- kožna upala
- promjene tjelesne mase

Manje često: mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba

- osjećaj ushićenja ili previše uzbuđenja što uzrokuje neuobičajeno ponašanje
- halucinacije (vidna ili slušna priviđenja stvari koje ne postoje)
- osjećaj uznemirenosti ili ljutnje
- povraćanje
- mišićna slabost
- nemogućnost kontroliranja mokrenja (inkontinencija)
- grčevi i bol u donjem dijelu leđa i bedrima što može ukazivati na poremećaj menstrualnog ciklusa
- ovisnost o lijeku
- simptomi ustezanja lijeka

Nepoznato: učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka

- u žena, neredovite menstruacije ili proizvodnja previše prolaktina (hormon koji potiče proizvodnju mlijeka)
- neprijateljsko ili agresivno ponašanje
- abnormalne misli
- uvijajući ili brzi, nevoljni, nesvršishodni pokreti
- hiperaktivnost
- nadraženi želudac
- problemi s funkcijom jetre (ovo je vidljivo iz nalaza krvi), upala jetre (hepatitis)
- neravnoteža žičanog sustava. Simptomi mogu uključivati: brzi otkucaji srca i nestabilan krvni tlak (osjećaj omaglice, ošamućenosti ili nesvjesticе).
- teška alergijska reakcija koja uzrokuje oticanje lica ili grla

- oticanje gležnjeva, stopala ili prstiju
- kožna reakcija uzrokovana osjetljivošću na sunčevu svjetlost
- otežano mokrenje ili poteškoće s kontrolom mjehura
- povećan tlak u očima, što može utjecati na vid
- zlouporaba lijeka

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Alprazolam Grindeks

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza oznake „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne čuvati na temperaturi iznad 25 °C.

Nikada nemojte nikakve lijekove baciti u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Alprazolam Grindeks sadrži

Djelatna tvar je alprazolam.

- Alprazolam Grindeks 0,25 mg tablete
Jedna tableta sadrži 0,25 mg alprazolama.
- Alprazolam Grindeks 0,5 mg tablete
Jedna tableta sadrži 0,5 mg alprazolama.
- Alprazolam Grindeks 1 mg tablete
Jedna tableta sadrži 1 mg alprazolama.

Drugi sastojci su: laktoza hidrat, mikrokristalična celuloza (E460), prethodno geliran kukuruzni škrob, natrijev dokuzat, natrijev benzoat (E211), magnezijev stearat, koloidni, bezvodni silicijev dioksid (E551), crveni željezov oksid, (E172) (samo tablete od 0,5 mg), indigo *carmine lake* (E132) (samo tablete od 1 mg).

Kako Alprazolam Grindeks izgleda i sadržaj pakiranja

Alprazolam Grindeks 0,25 mg tablete su bijele ili gotovo bijele ovalne tablete (10 mm x 5 mm) s urezom na jednoj strani i s utisnutom oznakom „0,25“ na drugoj strani.

Alprazolam Grindeks 0,5 mg tablete su blijedo ružičaste ili ružičaste ovalne tablete (10 mm x 5 mm) s urezom na jednoj strani i s utisnutom oznakom „0,5“ na drugoj strani.

Alprazolam Grindeks 1 mg tablete su blijedo plave ili plave ovalne tablete (10 mm x 5 mm) s urezom na jednoj strani i s utisnutom oznakom „1“ na drugoj strani.

Alprazolam Grindeks je dostupan u OPA/Alu/PVC/Alu blisterima s 10, 20, 30, 50, 60 ili 100 tableta.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač
GRINDEKS AS

Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Latvija

Telefon: +371 67083205

E-mail: grindeks@grindeks.com

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Clinres farmacija d.o.o.

Srebrnjak 61, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Tel: 01 23 96 900

Ovaj lijek je odobren u zemljama članicama Europskog gospodarskog prostora pod sljedećim nazivima:

Njemačka	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg Tabletten
Austrija	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg Tabletten
Belgija	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg comprimés
Bugarska	Алпразолам Гриндекс 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg таблетики
	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tablets
Hrvatska	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tablete
Češka	Alprazolam Grindeks
Danska	Alprazolam Grindeks
Estonija	Ixhalanex
Finska	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tabletit
Francuska	ALPRAZOLAM GRINDEKS 0,25 mg comprimé sécable
	ALPRAZOLAM GRINDEKS 0,5 mg comprimé sécable
	ALPRAZOLAM GRINDEKS 1 mg comprimé sécable
Grčka	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg δισκία
Mađarska	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tableta
Irska	Alprazolam Grindeks 250 microgram, 500 microgram, 1 mg tablets
Italija	Alprazolam Grindeks
Latvija	Ixhalanex 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tabletēs
Litva	Ixhalanex 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tabletės
Luksembourg	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg Pëllen
Nizozemska	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tabletten
Poljska	Alprazolam Grindeks
Portugal	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg comprimidos
Rumunjska	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg comprimate
Slovačka	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tablety
Slovenija	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tablete
Španjolska	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg comprimidos
Švedska	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tabletter

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u lipnju 2024.