

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Ambroksolklorid Galenika 20 mg pastile

ambroksolklorid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao ljekarnik.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se svom ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
- Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Ambroksolklorid Galenika i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Ambroksolklorid Galenika
3. Kako uzimati Ambroksolklorid Galenika
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Ambroksolklorid Galenika
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Ambroksolklorid Galenika i za što se koristi

Ambroksolklorid Galenika sadrži djelatnu tvar ambroksolklorid. Djelatna tvar je dio pastila koji omogućuje terapijski učinak koji Vam je potreban.

Ambroksolklorid ima lokalni anestetički učinak.

Ambroksol se koristi za ublažavanje boli kod akutne grlobolje.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Ambroksolklorid Galenika

Nemojte uzimati Ambroksolklorid Galenika

- ako ste alergični na ambroksolklorid ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Ambroksolklorid Galenika.

- Ako ste mlađi od 12 godina ne biste smjeli uzimati Ambroksolklorid Galenika.
- Ne smijete koristiti Ambroksolklorid Galenika više od 3 dana. Ako nakon 3 dana i dalje imate simptome ili ako imate visoku temperaturu, obratite se liječniku.
- Ako imate problema s jetrom ili bubrežima, posavjetujte se s liječnikom prije uzimanja lijeka Ambroksolklorid Galenika.
- Ambroksolklorid Galenika nije prikladan za liječenje bolnih lezija u ustima (npr. ulkusi ili ranice). Ako imate ulkuse u ustima, obratite se liječniku.
- Otežano disanje (dispneja) može se primijetiti zbog pojave neke osnovne bolesti (npr. otečenog grla). Drugi razlog može biti osjećaj stezanja u grlu zbog lokalnog anestetičkog učinka lijeka Ambroksolklorid Galenika. Dodatni uzrok može biti alergijska reakcija koja također može uzrokovati oticanje usta i grla.

- Vaše grlo i usta mogu biti manje osjetljivi nego inače (utrnulost). Stoga treba biti oprezan pri uzimanju vruće hrane i pića neposredno nakon primjene ovog lijeka.
- Bilo je izvješća o teškim kožnim reakcijama povezanim s primjenom lijeka Ambroksolklorid Galenika. Ako se pojavi osip na koži (uključujući lezije sluznice usta, grla, nosa, očiju, genitalija), prestanite uzimati lijek Ambroksolklorid Galenika i odmah se obratite svom liječniku.

Drugi lijekovi i Ambroksolklorid Galenika

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku za savjet, prije uzimanja ovog lijeka.

Ambroksolklorid Galenika može utjecati na nerođeno dijete. Ne smijete uzimati Ambroksolklorid Galenika ako ste trudni, osobito ne tijekom prva tri mjeseca trudnoće.

Ambroksolklorid Galenika prelazi u majčino mlijeko. Ako dojite, ne smijete uzimati lijek Ambroksolklorid Galenika.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije poznato da lijek Ambroksolklorid Galenika utječe na Vašu sposobnost upravljanja vozilima ili strojevima.

3. Kako uzimati Ambroksolklorid Galenika

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je:

Za ublažavanje boli, odrasli i djeca starija od 12 godina trebaju u ustima otopiti 1 pastilu. Ne smijete uzimati više od 6 pastila dnevno.

Pastile se ne smiju žvakati niti progutati.

Ne smijete koristiti lijek Ambroksolklorid Galenika više od 3 dana. Ako nakon 3 dana i dalje imate simptome ili ako imate visoku temperaturu, obratite se liječniku.

Klinički podaci su pokazali brzi početak djelovanja (najkasnije unutar 20 minuta). Učinak će trajati najmanje 3 sata.

Ako uzmete više Ambroksolklorid Galenika pastila nego što ste trebali

Ako uzmete previše pastila (više od 6 dnevno), obratite se liječniku ili ljekarniku za savjet ako primijetite bilo kakve simptome.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se one neće javiti kod svakoga.

Ako se pojavi jedna od sljedećih nuspojava, prestanite uzimati Ambroksolklorid Galenika i odmah se obratite liječniku:

- alergijska reakcija s lokaliziranim oticanjem lica, usana, usta, jezika i/ili grla (angioedem). To može uzrokovati osjećaj stezanja u grlu, poteškoće s gutanjem ili disanjem.

- brzo nastupajuće alergijske reakcije koje zahvaćaju cijelo tijelo (anafilaktičke reakcije uključujući anafilaktički šok)

Ozbiljnost alergijskih reakcija može se povećati ako ponovno uzmete lijek ili ako uzmete drugi lijek s istom tvari (pogledajte dio 2, Prije nego uzmete Ambroksolklorid Galenika).

Mogu se pojaviti sljedeće dodatne nuspojave:

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 bolesnika):

- mučnina
- utrnulost usta, jezika i grla (oralna i faringealna hipoesteziya)
- poremećaj okusa (disgeuzija)

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 bolesnika):

- proljev
- probavne smetnje (dispepsija)
- bol u truhu (bol u gornjem dijelu abdomena)
- suha usta

Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 bolesnika):

- reakcija preosjetljivosti
- osip, koprivnjača

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

- teška alergijska reakcija. Znakovi uključuju osip koji svrbi, oticanje, ponekad lica ili usta što uzrokuje poteškoće u disanju.

Široko rasprostranjeni osip s mjehurićima i ljuštenjem kože ili drugim kožnim promjenama s pustulama ili upalom. (Ovo mogu biti znakovi Stevens-Johnsonovog sindroma/toksične epidermalne nekrolize, multififormnog eritema ili akutne generalizirane egzantematozne pustuloze).

- alergijske reakcije (druge preosjetljivosti)
- povraćanje
- suha usta

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u [Dodatku V](#). Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Ambroksolklorid Galenika

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati na temperaturi ispod 30 °C.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Ambroksolklorid Galenika sadrži

- Djelatna tvar je ambroksolklorid. Jedna pastila sadrži 20 mg ambroksolklorida.
- Drugi sastojci su izomalt (E953), saharinnatrij, racemični mentol i ulje peperminta.

Kako Ambroksolklorid Galenika izgleda i sadržaj pakiranja

Ambroksolklorid Galenika pastile su bistre, prozirne, okrugle pastile, promjera 18,9 mm. Obje strane su plosnate.

Pastile su dostupne u propilen/aluminijskim blister pakiranjima.

Veličina pakiranja: 18 pastila.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja

Galenika International Kft.
2040 Budaors, Baross utca 165/3
Mađarska

Proizvođači

NETPHARMALAB CONSULTING SERVICES
Carretera de Fuencarral 22
28108 Alcobendas (Madrid)
Španjolska

INFARMADE SL.

C/Torre de los Herberos, 35
P.I."Carretera de la Isla", Dos Hermanas, 41703 (Sevilla)
Španjolska

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Galenika Adria d.o.o.
Trg žrtava fašizma 6
10000 Zagreb
tel. 01 6685323

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u lipnju 2023.