

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Atorvastatin Pliva 10 mg filmom obložene tablete
Atorvastatin Pliva 20 mg filmom obložene tablete
Atorvastatin Pliva 40 mg filmom obložene tablete
Atorvastatin Pliva 80 mg filmom obložene tablete

atorvastatin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

1. Što je Atorvastatin Pliva i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Atorvastatin Pliva
3. Kako uzimati Atorvastatin Pliva
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Atorvastatin Pliva
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Atorvastatin Pliva i za što se koristi

Atorvastatin Pliva je jedan od lijekova koji pripadaju skupini pod nazivom statini, a to su lijekovi za regulaciju masnoća (lipida) u krvi.

Atorvastatin Pliva se koristi za snižavanje lipida (kolesterola i triglicerida) u krvi u slučajevima kada ishrana sa smanjenim unosom masnoća i promjena načina života nisu dale očekivani rezultat. Ukoliko ste osoba s povećanim rizikom od srčanih oboljenja, Atorvastatin Pliva se također može koristiti u svrhu snižavanja toga rizika, čak i u slučaju da su Vam razine kolesterola u granicama normale. Tijekom liječenja morate se i dalje pridržavati standardne dijete za snižavanje kolesterola.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Atorvastatin Pliva

Nemojte uzimati Atorvastatin Pliva

- ako ste alergični na atorvastatin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
- ako imate ili ste imali neko oboljenje jetre
- ako ste imali neobjašnjiva odstupanja od normale u testovima jetrenih funkcija
- ako ste žena koja može rađati, a ne primjenjujete pouzdane metode sprječavanja neželjene trudnoće (kontracepcijske mjere)
- ako ste trudni ili pokušavate zatrudnjeti
- ako dojite
- ako uzimate kombinaciju glekaprevira/pibrentasvira za liječenje hepatitisa C

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Atorvastatin Pliva

- ako bolujete od ozbiljnih problema s disanjem
- ako uzimate ili ste uzeli lijek u zadnjih 7 dana koji se zove fusidatna kiselina (lijek za bakterijsku infekciju) kroz usta ili kao injekciju. Kombinacija fusidatne kiseline i lijeka Atorvastatin Pliva može dovesti do ozbiljnih problema sa mišićima (rabdomiolize)

- ako ste pretrpjeli moždani udar s krvarenjem u mozgu, ili u mozgu imate male tekućinom ispunjene prostore zaostale od prethodnih moždanih udara
- ako imate problema s bubrežima
- ako bolujete od smanjene funkcije štitnjače (hipotireoze)
- ako imate neobjašnjive ili ponavljajuće bolove u mišićima, odnosno ako ste u prošlosti Vi ili netko od Vaših bliskih rođaka imali problema s mišićima
- ako ste prethodno imali mišićnih problema tijekom uzimanja nekih drugih lijekova za snižavanje masnoća u krvi (npr. drugi lijekovi iz skupine „statina“ ili „fibrata“)
- ako imate ili ste imali miasteniju (bolest s općom slabosti mišića, uključujući u nekim slučajevima mišiće koji se koriste pri disanju) ili okularnu miasteniju (bolest koja uzrokuje slabost očnog mišića) jer statini ponekad mogu pogoršati stanje ili dovesti do pojave miastenije (vidjeti dio 4.)
- ako redovito konzumirate veće količine alkohola
- ako ste imali ili imate problema s jetrom
- ako ste stariji od 70 godina

Ako se bilo što od gore navedenoga odnosi na Vas, Vaš će liječnik morati napraviti krvnu pretragu prije, a možda i tijekom, Vašeg liječenja lijekom Atorvastatin Pliva kako bi predvidio Vaš rizik od mogućih mišićnih nuspojava. Poznato je da se rizik od mogućih mišićnih nuspojava, npr. rabdomiolize, povećava prigodom istodobnog uzimanja određenih lijekova (pogledajte dio 2. „Drugi lijekovi i Atorvastatin Pliva“).

Također obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako imate konstantnu mišićnu slabost. Možda će biti potrebni dodatni testovi i lijekovi kako bi se to dijagnosticiralo i liječilo.

Dok uzimate ovaj lijek, liječnik Vas može pomnije pratiti ako imate šećernu bolest ili imate rizik od razvoja šećerne bolesti. Postoji veća vjerojatnost za rizik od razvoja šećerne bolesti ako imate visoke razine šećera i masnoća u krvi, prekomjernu tjelesnu težinu ili visok krvni tlak.

Drugi lijekovi i Atorvastatin Pliva

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Postoje određeni lijekovi koji mogu promijeniti učinak lijeka Atorvastatin Pliva ili se njihov učinak može promijeniti uzimanjem lijeka Atorvastatin Pliva. Ovakva vrsta interakcije može dovesti do smanjenog učinka jednog ili obaju lijekova. U suprotnom slučaju, može doći i do povećanja rizika ili izraženosti nuspojava, uključujući i ozbiljno stanje razgradnje mišića pod nazivom rabdomioliza, opisano u dijelu 4.:

- lijekovi koji mijenjaju rad Vašeg imunološkog sustava, npr. ciklosporin
- određeni lijekovi za liječenje infekcija, poput antibiotika ili lijekova protiv gljivičnih oboljenja, npr. eritromicin, klaritromicin, telitromicin, ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, flukonazol, posakonazol, rifampicin, fusidatna kiselina
- drugi lijekovi za regulaciju razina masnoća u krvi, npr. gemfibrozil, drugi fibrati, kolestipol
- lijekovi koji se koriste za liječenje angine pectoris ili povišenog krvnog tlaka, npr. amlodipine, diltiazem, lijekovi za regulaciju srčanoga ritma, npr. digoksin, verapamil, amiodaron
- letermovir, lijek koji pomaže spriječiti razvoj bolesti koju uzrokuje citomegalovirus
- lijekovi koji se koriste u liječenju infekcije HIV-om, npr. ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir, kombinacija tipranavir/ritonavir itd.
- neki lijekovi koji se koriste za liječenje infekcije virusnog hepatitisa C, npr. telaprevir, boceprevir i kombinacija elbasvira/grazoprevira, ledipasvira/sofosbuvira
- drugi lijekovi za koje je poznato da stupaju u interakciju sa lijekom Atorvastatin Pliva uključujući ezetimib (liječnik koji se koristi za snižavanje kolesterola), varfarin (liječnik koji sprečava stvaranje krvnih ugrušaka), oralne kontraceptive, stiripentol (liječnik protiv epileptičkih napadaja), cimetidin (liječnik koji se koristi u liječenju žgaravice i čira na želucu), fenazon (liječnik protiv bolova), kolhicin (liječnik za liječenje gihta), i lijekove za smanjivanje želučane kiseline (liječnikove protiv probavnih tegoba, koji sadrže aluminij ili magnezij)
- lijekove koji se mogu nabaviti bez recepta, poput gospine trave

- ako trebate uzeti fusidatnu kiselinu kroz usta za liječenje bakterijskih infekcija, morat ćete privremeno prestati uzimati ovaj lijek. Liječnik će Vam reći kad je sigurno da ponovno počnete uzimati Atorvastatin Pliva. Uzimanjem lijeka Atorvastatin Pliva sa fusidatnom kiselinom može rijetko doći do slabosti u mišićima, pojačane osjetljivosti ili boli (rabdomioliza). Za više informacija o rabdomiolizi pogledajte dio 4.
- daptomicin (lijek koji se koristi za liječenje kompliciranih infekcija kože i strukture kože kao i bakterija prisutnih u krvi).

Atorvastatin Pliva s hranom i pićem

Pogledajte dio 3. „Kako uzimati Atorvastatin Pliva“ za uputu o uzimanju lijeka Atorvastatin Pliva. Molimo obratite pozornost na sljedeće:

Sok od grejpa

Nemojte uzimati više od jedne do dvije male čaše soka od grejpa na dan jer sok od grejpa u velikim količinama može promijeniti učinke lijeka Atorvastatin Pliva.

Alkohol

Izbjegavajte uzimanje alkohola u većim količinama tijekom liječenja ovim lijekom. Za detalje pogledajte dio 2. „Upozorenja i mjere opreza“.

Trudnoća i dojenje

NEMOJTE uzimati Atorvastatin Pliva ukoliko ste trudni ili pokušavate zatrudnjeti.

NEMOJTE uzimati Atorvastatin Pliva ukoliko ste žena u dobi kad možete ostati trudni, a ne primjenjujete pouzdane kontracepcijske mjere.

NEMOJTE uzimati Atorvastatin Pliva ukoliko dojite.

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Sigurnost primjene atorvastatina tijekom trudnoće i dojenja zasada nije dokazana.

Obratite se liječniku ili ljekarniku za savjet prije uzimanja lijeka.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ovaj lijek ima zanemariv utjecaj na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i strojevima. Međutim, ukoliko osjetite da ovaj lijek utječe na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i strojevima, nemojte voziti odnosno nemojte koristiti alate.

Atorvastatin Pliva sadrži natrij

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po tableti, tj. zanemarive količine natrija.

3. Kako uzimati Atorvastatin Pliva

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Prije nego što započnete s liječenjem, Vaš će Vam liječnik odrediti dijetu za snižavanje kolesterola, s kojom morate nastaviti i tijekom uzimanja lijeka Atorvastatin Pliva.

Uobičajena početna doza lijeka Atorvastatin Pliva je 10 mg jednom na dan za odrasle osobe i djecu u dobi od 10 godina i stariju. Ukoliko je potrebno, liječnik može povišivati dozu sve dok se ne postigne željeni terapijski učinak.

Liječnik će dozu prilagođavati u razmacima od 4 tjedna ili dulje. Maksimalna doza Atorvastatin Pliva je 80 mg jednom na dan.

Atorvastatin Pliva tablete treba progutati cijele uz malo vode, a mogu se uzimati u bilo koje doba dana, s ili bez hrane. Ipak, pokušajte svoju tabletu uzimati u isto vrijeme svakoga dana.

Atorvastatin Pliva 20 mg, 40 mg i 80 mg

Tableta se može podijeliti na jednake doze.

Trajanje liječenja lijekom Atorvastatin Pliva određuje Vaš liječnik.

Obratite se Vašem liječniku ukoliko Vam se čini da je učinak lijeka Atorvastatin Pliva prejak ili preslab.

Ako uzmete više lijeka Atorvastatin Pliva than you should

Ako slučajno uzmete previše Atorvastatin Pliva tableta (više od svoje uobičajene dnevne doze), odmah za savjet kontaktirajte svog liječnika ili najbližu bolnicu.

Ako ste zaboravili uzeti Atorvastatin Pliva

Ako ste zaboravili uzeti jednu dozu, sljedeću dozu uzmite prema uobičajenom rasporedu. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Atorvastatin Pliva

Ako imate dodatnih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, ili ako želite prekinuti liječenje, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Ukoliko dođe do pojave bilo koje od niže navedenih ozbiljnih nuspojava ili simptoma, prestanite s uzimanjem tableta i odmah obavijestite svog liječnika ili se uputite u hitnu službu najbliže bolnice.

Rijetko: mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba

- ozbiljna alergijska reakcija s oticanjem lica, jezika i grla koja može prouzročiti teške dišne tegobe.
- ozbiljna bolest s jakim ljuštenjem i oticanjem kože, stvaranjem plikova na koži, ustima, očima i spolnim organima, uz povišenu tjelesnu temperaturu. Kožni osip s ružičasto-crvenim mrljama, posebice na dlanovima i tabanima, uz moguću pojavu plikova.
- mišićna slabost, osjetljivost, bol ili puknuće mišića ili crveno-smeđa promjena boje mokraćne, ukoliko pritom osjećate i slabost ili imate visoku temperaturu, moguće je da je došlo do neuobičajenog oštećenja mišića (rabdomioliza). Neuobičajeno oštećenje mišića može ostati i nakon prestanka uzimanja atorvastatina, te može biti opasno po život i dovesti do problema s bubrezima.

Vrlo rijetko: mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba

- ukoliko se pojavi neočekivano ili neuobičajeno krvarenje ili se pojave modrice, to može ukazivati na oštećenje jetre. U tom se slučaju što je prije moguće posavjetujte s liječnikom.
- Sindrom sličan lupusu (uključujući osip, poremećaje u zglobovima i utjecaj na krvne stanice).

Druge moguće nuspojave lijeka Atorvastatin Pliva

Često: mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba

- upala nosnih putova, grlobolja, krvarenje iz nosa
- alergijske reakcije
- porast vrijednosti šećera u krvi (ukoliko bolujete od šećerne bolesti, nastavite pažljivo pratiti razinu šećera u krvi), porast vrijednosti kreatin kinaze u krvi
- glavobolja

- mučnina, zatvor, vjetrovi, probavne tegobe, proljev
- bolovi u zglobovima i mišićima, bolovi u leđima, bol u udovima
- rezultati krvnih pretraga koji ukazuju na promjenu funkcije jetre

Manje često: mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba

- gubitak apetita (anoreksija), porast tjelesne težine, pad vrijednosti šećera u krvi (ukoliko bolujete od šećerne bolesti, nastavite pažljivo pratiti razinu šećera u krvi)
- noćne more, nesanica
- omaglica, obamrlost ili trnci u prstima ruku i nogu, smanjen osjet boli ili dodira, promjene osjeta okusa, gubitak pamćenja
- zamućen vid
- zvonjenje u ušima i/ili glavi
- povraćanje, podrigivanje, bol u želucu i trbuhu, upala gušterače povezana s bolovima u želucu (pankreatitis)
- upala jetre (hepatitis)
- osip, kožni osip i svrbež, urtike, ispadanje kose
- bolovi u vratu, zamor mišića
- umor, osjećaj malaksalosti, slabost, bolovi u prsištu, oticanje udova - posebice gležnjeva (edemi), povišena tjelesna temperatura
- urin pozitivan na bijele krvne stanice

Rijetko: mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba

- smetnje vida
- neočekivana krvarenja ili pojava modrica
- žutilo kože i bjeloočnica (kolestaza)
- ozljede tetiva
- osip koji se može pojaviti na koži ili rane u usnoj šupljini (lihenoidna reakcija na lijek)
- ljubičaste lezije na koži (znakovi upale krvnih žila, vaskulitisa)

Vrlo rijetko: mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba

- alergijska reakcija – simptomi mogu uključivati naglu pojavu piskutavog disanja praćenu bolovima ili osjećajem stezanja u prsištu, oticanje očnih kapaka, lica, usana, usta, jezika ili grla, otežanog disanja, kolapsa (anafilaksija)
- gubitak sluha
- povećanje dojki u muškaraca (ginekomastija)

Nepoznato: učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka:

- mišićna slabost koja je konstantna
- miastenija gravis (bolest koja uzrokuje opću slabost mišića, uključujući u nekim slučajevima mišiće koji se koriste pri disanju)
- okularna miastenija (bolest koja uzrokuje slabost očnog mišića)

Obratite se svojem liječniku ako primijetite slabost u rukama ili nogama koja se pogoršava nakon razdoblja aktivnosti, dvostruku sliku ili spuštanje očnih kapaka, otežano gutanje ili nedostatak zraka.

Moguće nuspojave zabilježene pri uporabi nekih statina (lijekova iste vrste):

- seksualne tegobe
- depresija
- tegobe s disanjem, uključujući stalni kašalj i/ili nedostatak zraka, ili povišena tjelesna temperatura
- šećerna bolest. Razvoj šećerne bolesti je vjerojatniji ako imate visoke razine šećera i masnoća u krvi, prekomjernu tjelesnu težinu ili visok krvni tlak. Liječnik će Vas nadzirati dok uzimate ovaj lijek.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u [Dodatku V](#). Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Atorvastatin Pliva

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na blisteru, kutiji i bočici iza oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Atorvastatin Pliva sadrži

- Djelatna tvar je atorvastatin.
Svaka filmom obložena tableta sadrži 10 mg atorvastatina (u obliku atorvastatinkalcija).
Svaka filmom obložena tableta sadrži 20 mg atorvastatina (u obliku atorvastatinkalcija).
Svaka filmom obložena tableta sadrži 40 mg atorvastatina (u obliku atorvastatinkalcija).
Svaka filmom obložena tableta sadrži 80 mg atorvastatina (u obliku atorvastatinkalcija).
- Druge pomoćne tvari su:
Jezgra tablete: mikrokristalična celuloza (E 460), kalcijev karbonat (E 170), maltoza, umrežena karmelozanatrij (E 466), polisorbit 80 (E 433), magnezijev aluminometasilikat i magnezijev stearat (E 470b).
Ovojnica: hipromeloza (E 464), hidroksipropilceluloza (E 463), trietilcitrat (E 1505), polisorbit 80 (E 433) i titanijev dioksid (E171).

Kako Atorvastatin Pliva izgleda i sadržaj pakiranja

Atorvastatin Pliva 10 mg su bijele do gotovo bijele, eliptične, bikonveksne filmom obložene tablete s utisnutom oznakom “10” na jednoj i bez oznake na drugoj strani. Dimenzija: cca. 8 mm x 4 mm.

Atorvastatin Pliva 20 mg su bijele do gotovo bijele, eliptične, bikonveksne filmom obložene tablete s utisnutom oznakom “20” na jednoj i s razdjelnom crtom na drugoj strani. Dimenzija: cca. 10 mm x 6 mm.

Atorvastatin Pliva 40 mg su bijele do gotovo bijele, eliptične, bikonveksne filmom obložene tablete s utisnutom oznakom “40” na jednoj i s razdjelnom crtom na drugoj strani. Dimenzija: cca. 13 mm x 7 mm.

Atorvastatin Pliva 80 mg su bijele do gotovo bijele, eliptične, bikonveksne filmom obložene tablete s utisnutom oznakom “80” na jednoj i s razdjelnom crtom na drugoj strani. Dimenzija: cca. 16 mm x 9 mm.

Atorvastatin Pliva 10 mg je dostupan u blisterima od 10, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 ili 105 tableta, i blisterima djeljivim na jedinične doze u pakiranjima od 10x1, 14x1, 15x1, 28x1, 30x1, 50x1, 56x1, 60x1, 90x1, 98x1, 100x1 ili 105x1 tableta i u bočicama od 28, 30, 50, 90, 100, 250 ili 500 tableta.

Atorvastatin Pliva 20 mg je dostupan u blisterima od 10, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 ili 105 tableta, i blisterima djeljivim na jedinične doze u pakiranjima od 10x1, 14x1, 15x1, 28x1, 30x1, 50x1,

56x1, 60x1, 90x1, 98x1, 100x1 ili 105x1 tableta i u bočicama od 28, 30, 50, 90, 100, 250, 500 ili 1000 tableta.

Atorvastatin Pliva 40 mg je dostupan u blisterima od 10, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 ili 105 tableta, i blisterima djeljivim na jedinične doze u pakiranjima od 10x1, 14x1, 15x1, 28x1, 30x1, 50x1, 56x1, 60x1, 90x1, 98x1, 100x1 ili 105x1 tableta i u bočicama od 28, 30, 50, 90, 100, 250 ili 500 tableta.

Atorvastatin Pliva 80 mg je dostupan u blisterima od 10, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 ili 105 tableta, i blisterima djeljivim na jedinične doze u pakiranjima od 10x1, 14x1, 15x1, 28x1, 30x1, 50x1, 56x1, 60x1, 90x1, 98x1, 100x1 ili 105x1 tableta i u bočicama od 28, 30, 50, 90, 100 ili 250 tableta.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja:

PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25
10 000 Zagreb

Proizvođači:

Teva Operations Poland Sp. z.o.o.
ul. Mogilska 80
Kraków, 31-546
Poljska

Teva Pharma S.L.U.
C/C, n° 4, Poligono Industrial Malpica
Zaragoza, 50016
Španjolska

Ovaj lijek odobren je u državama članicama Europskog gospodarskog prostora pod sljedećim nazivima:

Austrija:	Atorvastatin ratiopharm GmbH 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg Filmdabletten
Belgija:	Atorvastatine Teva 10 mg, 20 mg 40 mg & 80 mg filmomhulde tabletten / comprimés pelliculés / Filmdabletten
Bugarska:	Avanor 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg film-coated tablets
Češka:	Atorvastatin ratiopharm
Danska:	Atorvastatin Teva B.V.
Estonija:	Atorvastatin TevaPharm
Finska:	Atorvastatin ratiopharm 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg kalvopäällysteiset tabletit
Francuska:	ATORVASTATINE TEVA 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg comprimé pelliculé
Irska:	Atorvastatin Teva Pharma 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg film-coated tablets
Island:	Atacor
Italija:	ATORVASTATINA TEVA
Latvija:	Atorvastatin TevaPharm 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg plēvele dengtos tabletes
Litva:	Atorvastatin TevaPharm 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg apvalkotās tabletes
Mađarska:	Atorvastatin Teva GmbH 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg filmdabletta
Nizozemska:	Atorvastatine Teva 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg filmomhulde tabletten
Norveška:	Atorvastatin Teva B.V.
Njemačka:	Atorvastatin-ratiopharm 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg Filmdabletten
Poljska:	Atorvastatin Teva B.V.
Portugal:	Atorvastatina Teva

Slovačka: Atorvastatin Teva 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg
Španjolska: Atorvastatina Teva-ratio 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg comprimidos
recubiertos con película EFG
Švedska: Atorvastatin Teva B.V.

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u veljači 2025.