

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Augmentin 400 mg + 57 mg/5 ml prašak za oralnu suspenziju s okusom voća

amoksicilin, klavulanska kiselina

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete svom djetetu primjenjivati ovaj lijek jer sadrži za njega važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.
- Ovaj se lijek obično propisuje djetetu. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki onima Vašeg djeteta.
- Ako kod Vašeg djeteta primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

1. Što je Augmentin i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Augmentin
3. Kako primjenjivati Augmentin
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Augmentin
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Augmentin i za što se koristi

Augmentin je antibiotik koji djeluje tako da ubija bakterije koje uzrokuju infekcije. Sadrži dva različita lijeka koji se zovu amoksicilin i klavulanska kiselina. Amoksicilin pripada skupini lijekova koje zovemo penicilini i njihovo djelovanje ponekad može biti zaustavljeno (postanu inaktivni). Druga djelatna komponenta lijeka (klavulanska kiselina) sprječava da se tako nešto dogodi.

Augmentin se koristi odraslih i djece za liječenje sljedećih infekcija:

- infekcije srednjeg uha i sinusa
- infekcije dišnih puteva
- infekcije mokraćnih puteva
- infekcije kože i mekih tkiva uključujući infekcije zuba i desni
- infekcije kostiju i zglobova

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Augmentin

Nemojte Vašem djetetu primijeniti Augmentin:

- ako je alergično na amoksicilin, klavulansku kiselinu, peniciline ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).
- ako je ikad imalo tešku alergijsku reakciju na bilo koji drugi antibiotik. Ovo može uključivati kožni osip ili oticanje lica ili vrata.
- ako je ikada imalo problema s jetrom ili žuticu tijekom uzimanja antibiotika.

➔ **Ako se nešto od navedenog odnosi na Vaše dijete, nemojte mu primijeniti Augmentin.** Ako niste sigurni, razgovarajte s liječnikom ili ljekarnikom prije primjene Augmentina.

Upozorenja i mjere opreza

Razgovarajte s liječnikom Vašeg djeteta, ljekarnikom ili medicinskom sestrom prije primjene lijeka Augmentin ako Vaše dijete:

- ima vrućicu s otečenim limfnim čvorovima
- se liječi zbog problema s jetrom ili bubrezima
- ne mokri redovito.

Ako niste sigurni odnosi li se nešto od navedenog na Vaše dijete, razgovarajte s liječnikom ili ljekarnikom prije primjene lijeka Augmentin.

U nekim slučajevima Vaš liječnik će istražiti koji tip bakterije uzrokuje infekciju kod Vašeg djeteta. Ovisno o rezultatima, liječnik može propisati drugu jačinu lijeka Augmentin ili drugi lijek.

Stanja koja zahtijevaju poseban oprez

Augmentin može pogoršati određena postojeća stanja ili uzrokovati ozbiljne nuspojave. To uključuje alergijske reakcije, konvulzije (napadaje) i upalu debelog crijeva. Kako bi smanjili rizik od bilo kakvih problema morate obratiti pažnju na određene simptome kod Vašeg djeteta tijekom uzimanja lijeka Augmentin. Pogledajte "*Stanja na koja trebate obratiti pažnju*" u **dijelu 4**.

Pretrage krvi i urina

Ako je Vašem djetetu potrebno napraviti krvne pretrage (kao što su broj crvenih krvnih stanica ili pretrage funkcije jetre) ili pretrage urina (na glukozu), obavijestite liječnika ili medicinsku sestru da dijete uzima Augmentin. Razlog tome je što Augmentin može utjecati na rezultate ovih tipova pretraga.

Drugi lijekovi i Augmentin

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako Vaše dijete uzima, nedavno je uzimalo ili bi moglo uzeti bilo koje druge lijekove.

Ako Vaše dijete uzima alopurinol (koristi se u liječenju gihta) zajedno s lijekom Augmentin, veća je vjerojatnost da će dobiti kožnu alergijsku reakciju.

Ako Vaše dijete uzima probenecid (koristi se u liječenju gihta), liječnik može prilagoditi dozu lijeka Augmentin.

Ako se uz Augmentin uzimaju lijekovi koji sprječavaju zgrušavanje krvi (poput varfarina), možda će biti potrebno provesti dodatne krvne pretrage.

Augmentin može utjecati na djelovanje metotreksata (lijek koji se koristi za liječenje raka ili reumatskih bolesti).

Augmentin može utjecati na djelovanje mofetilmikofenolata (lijek koji se koristi za sprječavanje odbacivanja transplantiranih organa).

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako je Vaše dijete kojem je propisan Augmentin, trudno ili doji, misli da bi moglo biti trudno ili planira imati dijete, potrebno je obratiti se liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzme ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Augmentin može imati nuspojave i simptome koji mogu utjecati na Vašu sposobnost vožnje. Nemojte voziti ili upravljati strojevima ako se ne osjećate dobro.

Augmentin sadrži aspartam, benzilni alkohol i maltodekstrin

- Ovaj lijek sadrži 2,5 mg aspartama u svakom ml. Aspartam je izvor fenilalanina. To može biti štetno za djecu koja boluju od fenilketonurije (PKU), rijetki genetski poremećaj kod kojeg dolazi do nakupljanja fenilalanina jer ga tijelo ne može ukloniti na odgovarajući način.
- Augmentin sadrži benzilni alkohol u tragovima. Benzilni alkohol može izazvati alergijske reakcije.
- Augmentin sadrži maltodekstrin (glukoza). Ako Vam je liječnik rekao da Vaše dijete ne podnosi neke šećere, obavijestite liječnika o tome prije početka primjene ovog lijeka.

3. Kako primjenjivati Augmentin

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Odrasli i djeca tjelesne težine 40 kg ili više

- Ova suspenzija se obično ne preporučuje odraslima i djeci tjelesne težine više od 40 kg. Upitajte svog liječnika ili ljekarnika za savjet.

Djeca tjelesne težine manje od 40 kg

Sve doze ovise o tjelesnoj težini djeteta u kilogramima.

- Liječnik će Vam savjetovati koliko lijeka Augmentin morate primijeniti Vašem djetetu.
 - Kao dodatni pribor može biti priložena plastična mjerna žličica ili dozirna štrcaljka. Upute za uporabu štrcaljke nalaze se na kraju ove upute. Morate ih koristiti kako biste Vašem djetetu dali ispravnu dozu lijeka.
- Preporučena doza - od 25 mg/3,6 mg/kg na dan (0,4 ml suspenzije po kg na dan) do 45 mg/6,4 mg/kg na dan (0,6 ml suspenzije po kg na dan), podijeljeno u 2 odvojene doze.
- Viša doza - do 70 mg/10 mg/kg na dan (1,0 ml suspenzije po kg na dan), podijeljeno u 2 odvojene doze.

Bolesnici koji imaju problema s bubrezima i jetrom

- Ako Vaše dijete ima problema s bubrezima, doza se može smanjiti. Vaš liječnik može odabrati drugu dozu ili drugi lijek.
- Ako Vaše dijete ima problema s jetrom, možda će biti potrebno češće provoditi neke krvne pretrage kako bi se provjerio rad jetre.

Kako primijeniti Augmentin

- Prije svake doze uvijek dobro protresite bočicu
- Dozu primijenite na početku obroka ili malo ranije
- Podijelite doze jednakomjerno tijekom dana uz najmanje 4 sata razlike. Nemojte dati 2 doze unutar 1 sata.
- Nemojte primjenjivati Augmentin Vašem djetetu duže od 2 tjedna. Ako se Vaše dijete i dalje ne osjeća dobro, morate ponovo posjetiti liječnika.

Ako primijenite više lijeka Augmentin nego što ste trebali

Ako Vašem djetetu primijenite previše lijeka Augmentin to može izazvati nadražen želudac (mučnina, povraćanje ili proljev) ili konvulzije. Obratite se liječniku što je prije moguće. Ponesite bočicu s lijekom kako biste ju pokazali liječniku.

Ako ste zaboravili primijeniti Augmentin

Ako zaboravite Vašem djetetu primijeniti dozu lijeka, primijenite je čim se sjetite. Sljedeću dozu ne smijete primijeniti prerano već pričekajte najmanje 4 sata prije primjene sljedeće doze. Nemojte dati dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako Vaše dijete prestane uzimati Augmentin

Nastavite Vašem djetetu primjenjivati Augmentin sve do kraja propisanog liječenja, čak i ako se već osjeća bolje. Svaka doza je potrebna kako bi se obranilo od infekcije. Ako neke bakterije prežive, mogu uzrokovati ponavljanje infekcije.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

4. **Moguće nuspojave**

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Kod uzimanja ovog lijeka mogu se javiti niže navedene nuspojave.

Stanja na koja trebate obratiti pažnju

Alergijske reakcije:

- kožni osip
- upala krvnih žila (*vaskulitis*) koja može biti vidljiva kao crvene ili purpurne uzdignute točkice na koži, ali mogu zahvatiti i ostale dijelove tijela
- vrućica, bolovi u zglobovima, natečene žlijezde u vratu, pazuhu ili preponama
- oticanje, ponekad lica ili grla (*angioedem*), koje uzrokuje poteškoće u disanju
- kolaps.
- bol u prsnom košu u sklopu alergijskih reakcija, koja može biti simptom srčanog infarkta izazvanog alergijom (*Kounisov sindrom*).

➔ Ako Vaše dijete razvije neke od ovih simptoma **odmah se obratite liječniku. Prestanite primjenjivati Augmentin.**

Upala debelog crijeva

Upala debelog crijeva uzrok je vodenastog proljeva, uobičajeno praćenog krvlju i sluzi, boli u truhu i/ili vrućicom.

Sindrom enterokolitisa izazvanog lijekom (engl. *drug-induced enterocolitis syndrome, DIES*)

DIES je prijavljen prvenstveno u djece liječene amoksicilinom/klavulanskom kiselinom. Radi se o vrsti alergijske reakcije čiji je glavni simptom ponavljajuće povraćanje (1-4 sata nakon primjene lijeka). Dodatni simptomi mogu uključivati bol u truhu, letargiju, proljev i nizak krvni tlak.

Akutna upala gušterače (akutni pankreatitis)

Ako imate jaku i dugotrajnu bol u području trbuha, to bi mogao biti znak akutne upale gušterače.

➔ Ako Vaše dijete razvije neke od ovih simptoma **čim prije se obratite liječniku.**

Česte nuspojave

Mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba

- gljivična infekcija kandidom (*candida* - gljivična infekcija u ustima, rodnici ili na kožnim naborima)
- mučnina, posebice kod uzimanja visokih doza
→ ako se to odnosi na Vaše dijete primijenite mu Augmentin prije obroka
- povraćanje
- proljev (u djece).

Manje česte nuspojave

Mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba

- kožni osip, svrbež
- osip s uzdignućima na koži praćen svrbežom (*koprivnjača*)

- probavne tegobe
- omaglica
- glavobolja.

Manje česte nuspojave koje se mogu pokazati u krvnim pretragama:

- povišene vrijednosti nekih tvari (*enzima*) koje proizvodi jetra

Rijetke nuspojave

Mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba

- kožni osip, koji može imati mjehuriće i izgledati kao male mete (središnja tamna točka, okružena svjetlijim krugom te s tamnim prstenom na rubu - *erythema multiforme*)

➔ Ako primijetite bilo koji od ovih simptoma hitno se obratite liječniku.

Rijetke nuspojave koje se mogu pokazati u krvnim pretragama:

- smanjen broj stanica koje su uključene u zgrušavanje krvi
- smanjen broj bijelih krvnih stanica.

Nepoznata učestalost

Učestalost se ne može procijeniti na temelju dostupnih podataka.

- Alergijske reakcije (vidjeti gore)
- Upala debelog crijeva (vidjeti gore)
- Upala membrane koja okružuje mozak i kralježničnu moždinu (*aseptični meningitis*)
- Ozbiljne kožne reakcije:
 - široko rasprostranjeni osip s mjehurićima i ljuštećom kožom, posebno oko usta, nosa, očiju i genitalija (*Steven-Johnsonov sindrom*) kao i teži oblik koji uzrokuje opsežno ljuštenje kože (više od 30 % tjelesne površine - *toksična epidermalna nekroliza*)
 - široko rasprostranjeni crveni kožni osip s malim gnojnim mjehurićima (*bulozni ekfolijativni dermatitis*)
 - crveni, ljuskasti osip, s potkožnim uzdignućima i mjehurićima (*exanthemous pustulosis*)
 - simptomi nalik gripi s osipom, vrućicom, natečenim žlijezdama te odstupanjem u rezultatima krvnih pretraga (uključujući povećan broj bijelih krvnih stanica (*eozinofilija*) i jetrenih enzima) (*Reakcija na lijek s eozinofilijom i sistemskim simptomima (DRESS)*)
 - crvenilo koje se uobičajeno javlja na obje strane stražnjice, unutarnjem dijelu bedara, pod pazusima i na vratu (*simetrični intertriginozni i pregibni egzantem povezan s lijekom (SDRIFE)*).

➔ **Odmah se javite liječniku ako Vaše dijete razvije neke od navedenih simptoma.**

- osip praćen mjehurićima koji mogu biti raspoređeni kružno s krastom u sredini ili nanizani jedan do drugoga (linearna IgA bolest)
- upala jetre (hepatitis)
- žutica, uzrokovana porastom vrijednosti bilirubina u krvi (tvar koju proizvodi jetra), on uzrokuje da koža i bjeloočnice Vašeg djeteta poprime žućkastu boju
- upala kanalića (tubula) u bubrezima
- produženo vrijeme zgrušavanja krvi
- hiperaktivnost
- konvulzije (u ljudi koji uzimaju visoke doze lijeka Augmentin te imaju problema s bubrezima)
- crni jezik koji izgleda dlakavo
- obojenost zubi (u djece), koja se obično uklanja četkanjem zubi.

Nuspojave koje se mogu pokazati u krvnim i mokraćnim pretragama:

- jako smanjenje broja bijelih krvnih stanica
- smanjeni broj crvenih krvnih stanica (*hemolitička anemija*)
- kristali u urinu koji mogu odvesti do akutnog oštećenja bubrega

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u [Dodatku V](#). Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Augmentin

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Prašak za oralnu suspenziju

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage. Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji iza oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Pripremljena suspenzija

Čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C).

Ne zamrzavati.

Jednom pripremljenu suspenziju upotrijebiti unutar 7 dana.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Augmentin sadrži

- Djelatne tvari su amoksicilin i klavulanska kiselina. Jedan ml suspenzije sadrži amoksicilin trihidrat što odgovara 80 mg amoksicilina i kalijev klavulanat što odgovara 11,4 mg klavulanske kiseline.
- Drugi sastojci su aspartam (E951), ksantanska guma, koloidni bezvodni silicijev dioksid, silicijev dioksid, sukcinatna kiselina, hipromeloza, okus naranče 1* (uključujući benzilni alkohol), okus naranče 2*, okus maline* i okus zlatnog sirupa* (*također uključuje maltodekstrin).
- Vidjeti dio 2 za dodatne važne informacije vezano uz aspartam, benzilni alkohol i maltodekstrin u Augmentinu.

Kako Augmentin izgleda i sadržaj pakiranja

Augmentin 400 mg + 57 mg/5 ml prašak za oralnu suspenziju s okusom voća je bijeli do gotovo bijeli prašak u bezbojnoj staklenoj bočici. Nakon pripreme, bočica sadrži 35 ml, 70 ml ili 140 ml bijele do žutosmeđe tekuće mješavine koja se zove suspenzija.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

GlaxoSmithKline Trading Services Limited,
12 Riverwalk,
Citywest Business Campus,
Dublin 24,
Irska

Proizvođač

Glaxo Wellcome Production
Z.I. de la Peyenniere
53100 Mayenne Cedex
Francuska

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Pharmakos Consulting d.o.o.
Ul. Andrije Žaje 43
10000 Zagreb
Tel: +385 1 207 92 37

Ovaj lijek je odobren u državama članicama Europskog gospodarskog prostora i Ujedinjenoj Kraljevini (Sjeverna Irska) pod sljedećim nazivima:

Austrija – Augmentin 400 mg/57 mg/5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen
Multifruktgeschmack
Bugarska – Augmentin
Hrvatska – Augmentin 400 mg + 57 mg/5 ml prašak za oralnu suspenziju s okusom voća
Cipar – Augmentin Mixed Fruit
Češka Republika – Augmentin
Estonija – Augmentin Fruit
Francuska – Augmentin 80 mg - 11.4 mg par ml Poudre pour suspension buvable
Njemačka – Augmentan
Grčka – Augmentin MF
Mađarska – Augmentin Duo
Irska – Augmentin Duo Mixed Fruit
Italija – Augmentin
Latvija – Augmentin Fruit 400 mg/57 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas
pagatavošanai
Litva – Augmentin
Malta – Augmentin Duo Mixed Fruit
Norveška – Augmentin
Poljska – Augmentin MFF
Portugal – Augmentin Duo
Rumunjska – Augmentin FP
Slovačka – Augmentin DUO s príchuťou miešaného ovocia
Ujedinjena Kraljevina (Sjeverna Irska) – Augmentin Duo

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u prosincu 2024.

Savjeti/medicinske informacije

Antibiotici se koriste za liječenje infekcija uzrokovanih bakterijama. Nemaju nikakav učinak na infekcije koje uzrokuju virusi.

Ponekad su infekcije uzrokovane bakterijama na koje antibiotici ne djeluju. Jedan od najčešćih razloga te pojave je to što su bakterije razvile rezistenciju na antibiotike. To znači da mogu preživjeti te se umnožavati unatoč primjeni antibiotika.

Bakterije mogu razviti rezistenciju na antibiotike iz mnogih razloga. Pažljivo korištenje antibiotika može pomoći u smanjenju vjerojatnosti da bakterije postanu rezistentne na njih.


Kada Vam liječnik propiše terapiju antibiotikom, namjera je liječiti samo trenutnu bolest. Pažljivo slijeđenje liječnikovih savjeta spriječit će nastanak rezistentnih bakterija na koje antibiotici ne djeluju.

1. Vrlo je važno da antibiotik uzimate u odgovarajućoj dozi, u pravo vrijeme te odgovarajući broj dana. Pročitajte upute o korištenju, a ako nešto ne razumijete zamolite liječnika ili ljekarnika da Vam pojasni.
2. Antibiotike ne smijete uzimati ako ih liječnik nije propisao baš za Vas. Smijete ih koristiti samo za liječenje infekcija protiv kojih su Vam propisani.
3. Ne smijete uzimati antibiotike koji su bili propisani drugim ljudima, iako su imali infekciju sličnu Vašoj.
4. Ne smijete davati drugim ljudima antibiotike koji su propisani Vama.
5. Ako Vam je nakon isteka terapije koju Vam je propisao liječnik preostala određena količina antibiotika, morate odnijeti preostale antibiotike u ljekarnu kako bi bili odgovarajuće zbrinuti.

Upute za rekonstituciju

Skinite zatvarač bočice. Prije upotrebe provjerite je li zaštitna folija neoštećena. Vratite zatvarač na bočicu.

1. Protresite bočicu kako biste rastresli prašak.



2. Skinite zatvarač bočice.



3. Odlijepite zaštitnu foliju.



4. Dodajte volumen vode (kako je prikazano ispod). Vratite zatvarač na bočicu, okrenite naopako i dobro protresite.

Veličina pakiranja (ml)	Volumen vode koji se dodaje za rekonstituciju (ml)
35	31
70	62
140	124

Dodatni tekst za tržišta koja imaju označenu crtu do koje se dodaje voda na bočici ili naljepnici: Alternativno, dodajte volumen vode neposredno ispod crte na bočici ili naljepnici. Vratite zatvarač na bočicu, okrenite bočicu naopako i dobro protresite, zatim dopunite vodu točno do crte. Vratite zatvarač na bočicu, okrenite bočicu naopako i ponovno dobro protresite.

5. Bočicu čuvajte u hladnjaku i uvijek protresite prije primjene. Jednom pripremljenu suspenziju upotrijebiti unutar 7 dana.

Dodatni tekst za tržišta na kojima se lijek isporučuje s dozirnom štrcaljkom:

Upute za uporabu štrcaljke


Augmentin dolazi sa štrcaljkom koja služi za njegovu primjenu

Štrcaljka je namijenjena samo za uporabu s lijekom Augmentin i ne smije s koristiti za primjenu drugih lijekova jer su oznake na njoj specifične za ovaj lijek. Uz štrcaljku dolazi i nastavak koji omogućuje njezino pričvršćivanje za bočicu.

Doza je na dozirnoj štrcaljki za peroralnu primjenu navedena u mililitrima (ml). Djetetu dajte dozu koju je preporučio liječnik.

Prije uporabe provjerite jesu li štrcaljka i nastavak čisti te ih po potrebi isperite čistom vodom.


1. Dobro protresite bočicu suspenzije prije primjene svake doze.
2. Skinite nastavak sa štrcaljke. Čvrsto držite bočicu i umetnite nastavak u vrat bočice (nastavak mora biti čvrsto uglavljen).



3. Uvedite štrcaljku u nastavak i uvjerite se da je čvrsto pričvršćena.




4. Preokrenite bočicu držeći štrcaljku na mjestu i izvucite dozu koju je odredio liječnik.




5. Ponovno okrenite bočicu uspravno i izvadite štrcaljku.




6. Da biste primijenili dozu, pažljivo stavite vrh štrcaljke u usta i polako pritisnite klip štrcaljke (ako je za primjenu doze potrebno više od sadržaja jedne štrcaljke, ponovite 3., 4., 5. i 6. korak).



7. Dobro isperite štrcaljku čistom vodom. Pričekajte da se potpuno osuši prije ponovne upotrebe.



8. Vratite zatvarač na bočicu.



9. Bočicu čuvajte u hladnjaku i uvijek dobro protresite prije primjene. Jednom pripremljenu suspenziju upotrijebiti unutar 7 dana.