

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Bepanthen Plus 50 mg/g + 5 mg/g krema dekspantenol, klorheksidinklorid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se svom ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
- Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3-4 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Bepanthen Plus krema i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Bepanthen Plus kremu
3. Kako primjenjivati Bepanthen Plus kremu
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Bepanthen Plus kremu
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Bepanthen Plus krema i za što se koristi

Krema Bepanthen Plus primjenjuje se za sprječavanje infekcije i poticanje zacjeljivanja manjih površinskih rana i lezija kože kao što su:

- oguljotine, posjekotine, ogrebotine, ragade, opekotine, vrjedovi, dermatitis,
- kronične rane poput ulkusa na potkoljenicama i dekubitalnih ulkusa,
- sekundarno inficirani ekcem i neurodermatitis,
- popucala koža bradavica u dojilja,
- rane nakon manjih kirurških zahvata.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3-4 dana.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Bepanthen Plus kremu

Nemojte primjenjivati Bepanthen Plus kremu

- ako ste alergični na djelatne tvari ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).
- na oštećenu opnu bubnjača

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Bepanthen Plus kremu.

- Primjena na velikim površinama kože mora se izbjegavati. Mora se izbjegavati dodir s ušima i sluznicama.
- Lijek Bepanthen Plus krema ne smije doći u dodir s okom zbog opasnosti od oštećenja vida. Ako dođe u dodir s očima, odmah ih obilno isperite vodom. U slučaju bilo kakve nadraženosti, crvenila ili boli u oku ili smetnji vida, odmah zatražite liječnički savjet.

Ozbiljni slučajevi trajne ozljede rožnice (ozljede površine oka) koja može zahtijevati transplantaciju rožnice prijavljeni su kada su slični lijekovi slučajno došli u dodir s okom tijekom kirurških zahvata u bolesnika u općoj anesteziji (dubok i bezbolan san).

- Ako se Bepanthen Plus krema koristi za liječenje popucale kože bradavica u razdoblju dojenja, mora se isprati prije dojenja.

Bepanthen Plus krema nije namijenjena za liječenje nadražene kože koja se najvjerojatnije neće inficirati (npr., opekotine od sunca). U takvim slučajevima potrebno je koristiti kremu koja sadrži samo dekspantenol.

Ako dođe do pojave lokalnog nadražaja kože treba privremeno prekinuti primjenu kreme.

Ukoliko infekcija potraje ili se stanje pogorša, posavjetujte se s liječnikom.

Neophodno je potražiti savjet liječnika ako rana ostaje ista i ne pokazuje tendenciju zarastanja ili ako se rubovi rane intenzivno crvene, a oko rane se pojavi otok ili se javi povišena temperatura.

Zabilježene su rijetke, ali ozbiljne alergijske reakcije, uključujući anafilaksiju tijekom primjene antiseptika koji sadrže klorheksidin. Ako se pojave simptomi teške alergijske reakcije (kao što su zviždanje u plućima ili otežano disanje, oticanje lica, koprivnjača koja može brzo napredovati u ozbiljnije simptome, teški osip ili šok), liječenje se odmah mora prekinuti i treba se posavjetovati s liječnikom.

Česta lokalna primjena na istom mjestu može dovesti do nadražaja kože. Bepanthen Plus krema je namijenjena liječenju manjih oštećenja kože, stoga je potrebno izbjegavati prekomjernu uporabu.

Primjena na velikim površinama kože mora se izbjegavati.

Drugi lijekovi i Bepanthen Plus krema

Krema Bepanthen Plus ne smije se koristiti istodobno s drugim antisepticima.

Klorheksidin nije kompatibilan s boratima, bikarbonatima, karbonatima, kloridima, citratima, fosfatima i sulfatima.

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ako se Bepanthen Plus krema koristi za liječenje popucale kože bradavica u razdoblju dojenja, mora se isprati prije dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije primijećen utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima ili rada na strojevima.

Bepanthen Plus krema sadrži cetilni i stearylni alkohol i lanolin

Cetilni i stearylni alkohol te lanolin mogu uzrokovati lokalne kožne reakcije (npr. kontaktni dermatitis).

3. Kako primjenjivati Bepanthen Plus kremu

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Kremu Bepanthen Plus nanijeti na očišćenu ranu ili upaljena područja kože 1 – 2 puta dnevno, po potrebi i češće ako je tako odredio liječnik.

Tretirana područja kože mogu se ukoliko je potrebno, pokriti gazom.

Ako primijenite više Bepanthen Plus kreme nego što ste trebali

Dekspantenol se dobro podnosi čak i u visokim dozama, pa se stoga u literaturi navodi da nije toksičan. Nije poznat slučaj hipervitaminoze. Opisano je povećanje aminotransferaze nakon otrovanja klorheksidinom.

Ako ste zaboravili primijeniti Bepanthen Plus kremu

Ako ste zaboravili primijeniti kremu Bepanthen Plus, nastavite je primjenjivati u skladu s uputama. Nemojte nanositi dvostruku ili veću količinu kreme kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletnu dozu. U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Prijavljene su alergijske kožne reakcije te druge reakcije preosjetljivosti, uključujući anafilaktičku reakciju i anafilaktički šok.

Alergijske kožne reakcije uključuju simptome kao što su kontaktni dermatitis, alergijski dermatitis, svrbež, crvenilo, ekcem, osip, koprivnjača i pojavu mjehurića na koži.

Preosjetljivost, anafilaktička reakcija i anafilaktički šok (potencijalno opasan po život) uključuju sljedeće simptome: sindrom astme (piskanje, otežano disanje, nedostatak zraka), blage do umjerene reakcije koje potencijalno zahvaćaju kožu, dišni i probavni sustav te probleme sa srcem i disanjem.

Ostale moguće nuspojave, za koje nije poznato koliko se često javljaju, jesu:

- alergijski poremećaji kože kao što su dermatitis (upala kože), pruritus (svrbež), eritem (crvenilo kože), ekcem, osip, urtikarija (koprivnjača), iritacija kože i mjehurići.
- ozljeda rožnice (ozljeda površine oka) i trajno oštećenje očiju, uključujući trajno oštećenje vida (nakon nehotičnog izlaganja očiju tijekom kirurških zahvata na glavi, licu i vratu) u bolesnika u općoj anesteziji (dubok bezbolan san).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: [navedenog u Dodatku V](#).

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Bepanthen Plus kremu

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
Čuvati na temperaturi do 25 °C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca. Rok valjanosti nakon prvog otvaranja je 12 mjeseci.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Bepanthen Plus krema sadrži

Djelatne tvari su: 50 mg dekspantenola i 5 mg klorheksidindiklorida.

Pomoćne tvari su: vazelin, bijeli, parafin, tekući; lanolin (E 913); makrogolstearat; cetilni alkohol; stearilni alkohol; DL-pantolakton; voda, pročišćena.

Kako Bepanthen Plus krema izgleda i sadržaj pakiranja

Bepanthen Plus krema je homogena, glatka emulzija, žućkaste boje bez mirisa.

Pakiranje: aluminijska tuba od 30 g kreme.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja:

Bayer d.o.o., Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

Proizvođač:

GP Grenzach Produktions GmbH, Emil-Barell-Str. 7, 79639 Grenzach-Wyhlen, Njemačka

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i u specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima.

Ova uputa je posljednji put revidirana u studenom 2024.