

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Bosentan Cipla 62,5 mg filmom obložene tablete **Bosentan Cipla 125 mg filmom obložene tablete** bosentan

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Bosentan Cipla i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Bosentan Cipla
3. Kako uzimati Bosentan Cipla
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Bosentan Cipla
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Bosentan Cipla i za što se koristi

Bosentan Cipla sadrže bosentan, blokator prirodnog hormona endotelina-1 (ET-1) koji sužava krvne žile. Zbog toga Bosentan Cipla širi krvne žile i ubraja se u skupinu lijekova pod nazivom “antagonisti endotelinskih receptora”.

Bosentan Cipla se koristi za liječenje:

- **plućne arterijske hipertenzije (PAH):** PAH je bolest u kojoj jako suženje krvnih žila u plućima izaziva visok krvni tlak u krvnim žilama (plućnim arterijama) koje prenose krv od srca prema plućima. Taj tlak smanjuje količinu kisika koja u plućima ulazi u krv i na taj način otežava fizičku aktivnost. Bosentan Cipla širi plućne arterije olakšavajući srcu pumpanje krvi kroz njih. Na taj način snižava se krvni tlak i olakšavaju simptomi.

Bosentan Cipla se koristi u liječenju bolesnika s III. stupnjem PAH kako bi se poboljšalo podnošenje fizičkog opterećenja (mogućnost izvođenja fizičke aktivnosti) i simptomi. Stupanj odražava ozbiljnost bolesti: „III. stupanj“ uključuje značajna ograničenja fizičke aktivnosti. Dokazana su neka poboljšanja i u bolesnika s II. stupnjem PAH. „II. stupanj“ uključuje lagano ograničenje fizičke aktivnosti. PAH za koju je indiciran Bosentan Cipla može biti:

- primarna (bez poznatog uzroka ili obiteljska);
- uzrokovana sklerodermijom (također nazvanom i sistemska skleroza, bolest s abnormalnim rastom vezivnog tkiva koje podržava kožu i druge organe);
- uzrokovana kongenitalnim (urođenim) srčanim greškama sa šantovima (abnormalnim prolazima) koji uzrokuju nenormalno protjecanje krvi kroz srce i pluća.
- **ulceracija na prstima** (rane na prstima ruku i nogu) koje se javljaju kod odraslih oboljelih od sklerodermije. Bosentan Cipla smanjuje pojavljivanje novih ulceracija na prstima ruku i nogu.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Bosentan Cipla

Nemojte uzimati Bosentan Cipla:

- **ako ste alergični na bosentan** ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6)

- **ako imate problema s jetrom** (pitajte svog liječnika)
- **ako ste trudni ili biste mogli zatrudnjeti** zbog toga što ne koristite pouzdane metode kontracepcije. Molimo vas pročitajte informacije pod "Kontracepcijska sredstva" i "Drugi lijekovi i Bosentan Cipla "
- **ako uzimate ciklosporin A** (lijek koji se koristi nakon transplantacije ili za liječenje psorijaze).

Ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas, obratite se svom liječniku.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Bosentan Cipla.

Pretrage koje će Vaš liječnik zatražiti prije liječenja

- krvni nalazi za provjeru funkcije Vaše jetre
- krvni nalazi za provjeru anemije (snižena koncentracija hemoglobina)
- test na trudnoću ako ste žena reproduktivne dobi

Kod nekih bolesnika koji uzimaju Bosentan Cipla utvrđeni su abnormalni testovi funkcije jetre te anemija (snižena koncentracija hemoglobina).

Pretrage koje će vaš liječnik raditi tijekom liječenja

Tijekom liječenja lijekom Bosentan Cipla Vaš liječnik će Vam osigurati redovite krvne pretrage kako bi provjerio ima li promjena u funkciji Vaše jetre te razini hemoglobina.

Molimo da za sve ove pretrage pogledate i Karticu s upozorenjima za bolesnika (unutar Vašeg pakiranja Bosentan Cipla tableta). Važno je da tijekom uzimanja Bosentan Cipla provodite redovite krvne pretrage. Predlažemo da zabilježite datum zadnje pretrage te datum iduće pretrage (upitajte liječnika za datum) u Karticu za bolesnika kako biste si pomogli upamtiti datum iduće pretrage.

Krvne pretrage za jetrenu funkciju

Ove pretrage će se provoditi svakog mjeseca tijekom liječenja s Bosentan Cipla. Nakon povećanja doze treba napraviti nove nalaze nakon 2 tjedna.

Krvne pretrage za anemiju

S obzirom na to da bolesnici koji uzimaju Bosentan Cipla mogu dobiti anemiju, te pretrage se provode svakog mjeseca tijekom prva 4 mjeseca liječenja, a potom svaka 3 mjeseca.

Ako rezultati nisu uredni, liječnik će odlučiti da li smanjiti dozu ili prekinuti liječenje lijekom Bosentan Cipla te će možda provesti dodatne pretrage kako bi ispitao moguće razloge.

Djeca i adolescenti

Bosentan Cipla se ne preporučuje pedijatrijskim bolesnicima sa sistemskom sklerozom i prisutnim ulceracijama na prstima. Bosentan Cipla se također ne preporučuje za primjenu u djece s plućnom arterijskom hipertenzijom, čija je tjelesna masa manja od 31 kg. Molimo Vas pročitajte i 3. dio "Kako uzimati Bosentan Cipla".

Drugi lijekovi i Bosentan Cipla

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta. Naročito je važno da obavijestite svog liječnika ako uzimate:

- ciklosporin A (lijek koji se uzima nakon transplantacije i za liječenje psorijaze) koji se ne smije koristiti zajedno s Bosentan Cipla
- sirolimus ili takrolimus, lijekovi koji se uzimaju nakon transplantacije, budući da nije preporučljivo uzimati ih zajedno s Bosentan Cipla
- glibenklamid (lijek za dijabetes), rifampicin (lijek za tuberkulozu), flukonazol (lijek za gljivične infekcije), ketokonazol (lijek za liječenje Cushingovog sindroma), nevirapin (za

liječenje HIV infekcije) budući da nije preporučljivo uzimati te lijekove zajedno s Bosentan Cipla

- druge lijekove za liječenje HIV infekcije koji mogu zahtijevati poseban nadzor ako se koriste zajedno s Bosentan Cipla
- hormonske kontraceptive koji nisu učinkoviti kao jedina metoda kontracepcije kod uzimanja Bosentan Cipla. U Vašem pakiranju tableta Bosentan Cipla naći ćete Karticu s upozorenjima za bolesnika koju trebate pažljivo pročitati. Vaš liječnik i/ili ginekolog odredit će kontracepciju prikladnu za Vas.
- drugi lijekovi za liječenje plućne hipertenzije: sildenafil i tadalafil
- varfarin (antikoagulans)
- simvastatin (koristi se za liječenje hiperkolesterolemije)

Bosentan Cipla s hranom i pićem

Bosentan Cipla se može uzimati s hranom ili bez nje.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Žene reproduktivne dobi

NEMOJTE uzimati Bosentan Cipla ako ste trudni ili ako planirate zatrudnjeti.

Testovi na trudnoću

Bosentan Cipla može naškoditi nerođenoj djeci začetoj prije početka ili tijekom liječenja. Ako ste žena koja može zatrudnjeti, Vaš liječnik će tražiti da napravite test na trudnoću prije nego što počnete uzimati Bosentan Cipla te da ga redovito ponavljate tijekom uzimanja Bosentan Cipla.

Kontracepcijska sredstva

Ako postoji mogućnost da ostanete trudni, koristite pouzdan oblik kontrole začeća (kontracepciju) za vrijeme uzimanja Bosentan Cipla. Vaš liječnik ili ginekolog savjetovat će Vas o sigurnim kontracepcijskim metodama tijekom uzimanja Bosentan Cipla. Budući da Bosentan Cipla smanjuje učinkovitost hormonske kontracepcije (npr. tablete, u obliku injekcije, implantata ili kožnih flastera), ta metoda, samostalno primijenjena, nije sigurna. Stoga, ako koristite hormonsku kontracepciju, ujedno morate koristiti i metodu barijere (npr. ženski kondom, dijafragmu, kontracepcijsku spužvu ili Vaš partner mora koristiti kondom). Unutar pakovanja tableta Bosentan Cipla naći ćete Karticu s upozorenjima za bolesnika. Trebate je popuniti i uzeti je sa sobom kada idući put idete liječniku kako bi Vaš liječnik ili ginekolog ocijenio trebate li dodatnu ili drugu pouzdanu kontracepcijsku metodu. Ako ste reproduktivne dobi, preporučuju se mjesečni testovi na trudnoću tijekom uzimanja Bosentan Cipla.

Odmah recite svom liječniku ako zatrudnite tijekom uzimanja Bosentan Cipla ili planirate zatrudnjeti u skoroj budućnosti.

Dojenje

Bosentan prelazi u Vaše majčino mlijeko. Prekinite s dojenjem ako Vam je propisan Bosentan Cipla jer nije poznato može li bosentan u majčinom mlijeku naškoditi Vašem djetetu. Razgovarajte o tome sa svojim liječnikom.

Plodnost

Ako ste muškarac i uzimate Bosentan Cipla, moguće je da Vam taj lijek smanji broj spermija. Ne može se isključiti mogućnost da to utječe na Vašu sposobnost da imate dijete. Ako imate bilo kakvih pitanja ili ste zabrinuti zbog toga, obratite se svome liječniku.

Upravljanje vozilima i strojevima

Bosentan Cipla ima zanemariv ili nikakav utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima. Ipak, Bosentan Cipla može uzrokovati hipotenziju (pad krvnog tlaka) što može uzrokovati

omaglicu i utjecati na vaš vid, a to može utjecati na vašu sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima. Zato, ako osjećate omaglicu ili Vam je vid замуćen tijekom uzimanja Bosentan Cipla, nemojte voziti niti koristiti alate ili strojeve.

Bosentan Cipla sadrži natrij

Ovaj lijek sadrži manje od 1mmol (23 mg) natrija po tableti, tj. zanemarive količine natrija.

3. Kako uzimati Bosentan Cipla

Liječenje treba započeti i nadzirati jedino liječnik s iskustvom u liječenju PAH ili sistemske skleroze. Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza:

Odrasli

Liječenje odraslih bolesnika obično započinje tijekom prva 4 tjedna dozom od 62,5 mg dva puta dnevno (ujutro i navečer), a potom će Vam liječnik vjerojatno savjetovati da uzimate 125 mg dva puta dnevno, ovisno o Vašoj reakciji na Bosentan Cipla.

Djeca i adolescenti

Preporučena doza za djecu je samo za liječenje PAH. Za djecu od 1 godine i stariju liječenje s Bosentan Cipla se obično započinje dozom od 2 mg po kg tjelesne težine dva puta dnevno (ujutro i navečer). Međutim, neke doze bosentana nije moguće postići za djecu s tjelesnom masom manjom od 31 kg. Za te bolesnike potrebne su tablete s manjom jačinom. Liječnik će Vam propisati doziranje.

Molimo obratite pozornost da je dostupan i u obliku tableta za oralnu suspenziju od 32 mg koje mogu olakšati točno doziranje za djecu i bolesnike s malom tjelesnom težinom ili za one koji imaju poteškoća s gutanjem filmom obloženih tableta.

Ako imate osjećaj da je učinak Bosentan Cipla prejak ili preslab, razgovarajte sa svojim liječnikom kako biste utvrdili postoji li potreba za promjenom doze.

Kako uzimati Bosentan Cipla

Tablete treba popiti ujutro i navečer s vodom. Tablete se mogu uzeti s hranom ili bez nje.

Ako uzmete više Bosentan Cipla nego što ste trebali

Ako uzmete više tableta nego što Vam je liječnik propisao, odmah se javite svom liječniku.

Ako ste zaboravili uzeti Bosentan Cipla

Ako ste zaboravili uzeti Bosentan Cipla, uzmite dozu čim se sjetite i zatim nastavite s uzimanjem tableta u uobičajeno vrijeme. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljene tablete.

Ako prestanete uzimati Bosentan Cipla

Nagli prestanak liječenja s lijekom Bosentan Cipla može dovesti do pogoršanja Vaših simptoma. Nemojte prestati koristiti Bosentan Cipla, osim ako Vam je liječnik tako rekao. Liječnik će Vam vjerojatno reći da postupno smanjite dozu tijekom nekoliko dana prije potpunog prestanka uzimanja lijeka.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se one neće javiti kod svakoga.

Najozbiljnije nuspojave lijeka Bosentan Cipla su:

- Oštećenje funkcije jetre koje se može pojaviti u više od 1 na 10 osoba
- Anemija (slabokrvnost) koja se može pojaviti u do 1 na 10 osoba. Anemija u nekim slučajevima može zahtijevati transfuziju krvi

Funkcija jetre i krvna slika će se pratiti za vrijeme liječenja lijekom Bosentan Cipla (pogledajte dio 2). Važno je da provodite sve pretrage prema uputama liječnika.

Znakovi oštećenja funkcije jetre uključuju:

- mučninu (nagon na povraćanje)
- povraćanje
- vrućicu (povišenu tjelesnu temperaturu)
- bol u trbuhu (abdomenu)
- žutica (žutilo kože ili bjeloočnica očiju)
- tamno obojenu mokraću
- svrbež kože
- bezvoljnost ili umor (neuobičajen osjećaj umora ili iscrpljenosti)
- sindrom sličan gripi (bol u zglobovima i mišićima s vrućicom)

Ako primijetite bilo koji od ovih znakova **odmah recite svom liječniku**

Ostale nuspojave:

Vrlo česte (mogu se pojaviti u više od 1 na 10 osoba):

- Glavobolja
- Edem (oticanje nogu i gležnjeva ili drugi znakovi zadržavanja tekućine)

Česte (mogu se pojaviti u do 1 na 10 osoba):

- Pojava rumenila u licu ili crvenila na koži
- Reakcije preosjetljivosti (uključujući upalu, svrbež i osip na koži)
- Gastroezofagealna refluksna bolest (vraćanje kiselog sadržaja iz želuca)
- Proljev
- Sinkopa (nesvjestica)
- Palpitacije (brzi ili nepravilni otkucaji srca)
- Nizak krvni tlak
- Začepljenost nosa

Manje česte (mogu se pojaviti u do 1 na 100 osoba):

- Trombocitopenija (smanjen broj krvnih pločica)
- Neutropenija/leukopenija (smanjen broj bijelih krvnih stanica)
- Povišene vrijednosti testova jetrene funkcije s hepatitisom (upala jetre), uključujući moguće pogoršanje podležeg hepatitisa, i/ili žuticom (žutilo kože ili bjeloočnica)

Rijetke (mogu se pojaviti u do 1 na 1000 osoba):

- Anafilaksija (generalizirana alergijska reakcija), angioedem (oticanje, najčešće oko očiju, usana, jezika ili grla)
- Ciroza (stvaranje ožiljaka) jetre, zatajenje jetre (teški poremećaj funkcije jetre), autoimuni hepatitis (upala jetre uzrokovana napadom vlastitog tjelesnog obrambenog sustava na stanice jetre) koji se može pojaviti čak nekoliko mjeseci do godina nakon početka liječenja.

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

- Zamućen vid.

Nuspojave u djece i adolescenata

Nuspojave uočene u djece liječene lijekom Bosentan Cipla iste su kao u odraslih.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava; navedenog u [Dodatku V](#).

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Bosentan Cipla

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji ili blisteru iza "Rok valjanosti". Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ovaj lijek na zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Bosentan Cipla sadrži

Djelatna tvar je bosentan.

Bosentan Cipla 62,5 mg filmom obložene tablete:

Svaka filmom obložena tableta sadrži 62,5 mg bosentana (u obliku bosentan hidrata).

Bosentan Cipla 125 mg filmom obložene tablete:

Svaka filmom obložena tableta sadrži 125 mg bosentana (u obliku bosentan hidrata).

Drugi sastojci su:

- Jezgra tablete: kukuruzni škrob, natrijev škroboglikolat (tip B), povidon (PVP K-30), prethodno gelirani kukuruzni škrob, gliceroldibehenat i magnezijev stearat.
- Film ovojnice: hipromeloza, titanijev dioksid (E171), triacetin, talk, žuti željezov oksid (E172), crveni željezov oksid (E172), etilceluloza, cetilni alkohol i natrijev lauril sulfat.

Kako Bosentan Cipla izgleda i sadržaj pakiranja

Bosentan Cipla filmom obložene tablete:

Bosentan Cipla 62,5 mg filmom obložene tablete su su krem do blijedo žute, okrugle bikonveksne filmom obložene tablete, s oznakom „62,5“ na jednoj strani i ravne s druge. Promjer: 6,10 mm ± 0,20 mm.

Bosentan Cipla 125 mg filmom obložene tablete su krem do blijedo žute, duguljaste bikonveksne filmom obložene tablete, s oznakom „125“ na jednoj strani i ravne s druge. Duljina: 11,10 ± 0,20 mm i širina: 5,10 ± 0,20 mm.

Za Bosentan 62,5 mg filmom obložene tablete i 125 mg filmom obložene tablete
PVC/PE/PVDC/aluminij blister. Blister pakiranje s 14, 56 i 112 filmom obloženih tableta.

Perforirani blisteri djeljivi na jedinične doze: PVC/PE/PVDC/aluminij. Veličine pakiranja: 14 x 1, 56 x 1, 112 x 1 filmom obloženih tableta.

Samo za Bosentan 125 mg filmom obložene tablete
PVC/PE/PVDC/aluminij blister. Blister pakiranje s 120 filmom obloženih tableta.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač:

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

Cipla Europe NV
De Keyserlei 60C, Bus-1301,
2018 Antwerp,
Belgija

Proizvođač:

S&D Pharma CZ, spol. s r. o, Theodor 28, 273 08 Pchery (Pharmos a. s. facility), Republika Češka

Cipla Europe NV, De Keyserlei 60C, Bus-1301, 2018 Antwerp, Belgija

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku:

Marti Farm d.o.o.
Laščinska cesta 40
10 000 Zagreb
Tel: 01 5588297

Ovaj lijek je odobren u zemljama članicama Europskog ekonomskog prostora (EEA) pod sljedećim nazivima:

Njemačka	Bosentan Cipla 62,5 mg filmtabletten Bosentan Cipla 125 mg filmtabletten
Španjolska	Bosentan Cipla 62,5 mg comprimidos recubiertos con película EFG Bosentan Cipla 125 mg comprimidos recubiertos con película EFG
Danska	Bosentan Cipla
Norveška	Bosentan Cipla 62,5 mg filmdrasjerte tabletter Bosentan Cipla 125 mg filmdrasjerte tabletter
Slovačka	Bosentan Cipla 62,5 mg filmom obalené tablety Bosentan Cipla 125mg filmom obalené tablety
Hrvatska	Bosentan Cipla 62,5 mg filmom obložene tablete Bosentan Cipla 125 mg filmom obložene tablete

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u listopadu 2025.

KARTICA S UPOZORENJIMA ZA BOLESNIKA	
Važne sigurnosne informacije za bolesnika koji uzima: Bosentan Cipla (bosentan) Ova kartica sadrži važne informacije o lijeku Bosentan Cipla. Molimo Vas da pažljivo pročitate sljedeći tekst prije nego što počnete uzimati Bosentan Cipla. Vaše ime: _____ Ime Vašeg liječnika: _____ Ako imate pitanja o lijeku Bosentan Cipla, pitajte Vašeg liječnika.	Kontracepcija Da li trenutno koristite kontraceptive? Da ☐ Ne ☐ Ako koristite, napišite nazive ovdje: _____ Ponesite ovu karticu Vašem liječniku ili ginekologu prilikom sljedeće posjete kako bi Vaš liječnik ili ginekolog mogli odrediti je li Vam potrebna dodatna ili drugačija metoda kontracepcije.
Ako ste žena reproduktivne dobi pažljivo pročitajte ovu stranicu Trudnoća Bosentan Cipla može naškoditi razvoju fetusa. Zbog toga ne smije uzimati Bosentan Cipla ako ste trudni te ne smijete zatrudnjeti tijekom uzimanja lijeka Bosentan Cipla. Osim toga, ako bolujete od plućne hipertenzije, trudnoća može jako pogoršati simptome Vaše bolesti. Ako posumnjate na trudnoću, recite to svom liječniku ili ginekologu. Kontracepcija Metode hormonske kontracepcije primjenjene oralno, u obliku injekcija, implantata ili flastera nisu pouzdane u žena koje uzimaju lijek Bosentan Cipla. Stoga morate primijenjivati mehaničke metode kontracepcije kao što su kondom, dijafragma ili kontracepcijska spužva uz bilo koju od navedenih vrsta hormonalne kontracepcije. O svim pitanjima koja imate razgovarajte sa svojim liječnikom ili ginekologom - pažljivo ispunite poledinu ove kartice i pokažite ju svom liječniku ili ginekologu prilikom sljedeće posjete. Morate napraviti test na trudnoću prije uvođenja lijeka Bosentan Cipla i svaki mjesec tijekom liječenja, iako mislite da niste trudni . Datum prvog mjesečnog testiranja: _____	Krvne pretrage za jetrenu funkciju Neki bolesnici koji su uzimali lijek Bosentan Cipla imali su promijenjene nalaze jetrene funkcije. Tijekom liječenja lijekom Bosentan Cipla liječnik će zakazati redovite krvne pretrage kako bi provjerio promjene u funkciji jetre. Sjetite se svaki mjesec napraviti pretrage jetrene funkcije. Nakon povećanja doze trebat će napraviti nove pretrage nakon 2 tjedna. Datum prve mjesečne pretrage: _____ Raspored Vaših mjesečnih krvnih pretraga funkcije jetre: Sij _____ Svi _____ Ruj _____ Velj _____ Lip _____ Lis _____ Ožu _____ Srp _____ Stud _____ Tra _____ Kol _____ Pro _____