

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

BRONCHOSTOP SINE sirup

suhi ekstrakt timijanove zeleni, tekući ekstrakt korijena običnog bijeloga sljeza

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se svom ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
- Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 5 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je BRONCHOSTOP SINE sirup i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati BRONCHOSTOP SINE sirup
3. Kako uzimati BRONCHOSTOP SINE sirup
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati BRONCHOSTOP SINE sirup
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je BRONCHOSTOP SINE sirup i za što se koristi

BRONCHOSTOP SINE sirup je tradicionalni biljni lijek koji se primjenjuje za ublažavanje produktivnog kašlja povezanog s prehladom i ublažavanje nadražaja ždrijela i povezanog kašlja, isključivo na temelju dugotrajne uporabe.

BRONCHOSTOP SINE sirup namijenjen je za primjenu u djece starije od 4 godine i odraslih.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 5 dana.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati BRONCHOSTOP SINE sirup

Nemojte uzimati BRONCHOSTOP SINE sirup

- ako ste alergični na korijen običnog bijelog sljeza, timijan ili druge biljke iz porodice usnjača (*Lamiaceae*), poput metvice, ružmarina, kadulje, origana ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6):

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari, molimo pogledajte dio 6 ("Sadržaj pakiranja i druge informacije").

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se liječniku prije uzimanja Bronchostop Sine sirupa ako imate astmu ili ste skloni razvoju alergijskih reakcija, jer Bronchostop Sine sirup može pogoršati simptome astme.

U slučaju vrućice, otežana disanja ili gnojnoga iscjetka, morate se obratiti liječniku.

Djeca

Primjena u djece mlađe od 4 godine se ne preporučuje jer nije dostupno dovoljno podataka za primjenu lijeka u toj dobnoj skupini te zbog toga što je potrebno potražiti savjet liječnika.

Drugi lijekovi i BRONCHOSTOP SINE sirup

Obavijestite svoga liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Apsorpcija istodobno primijenjenih lijekova može biti odgođena. Kao mjera opreza, lijek se ne smije uzimati ½ do 1 sat prije ili nakon uzimanja drugih lijekova.

Nisu poznate interakcije s drugim lijekovima.

Plodnost, trudnoća i dojenje

Nema podataka o djelovanju ovog lijeka na plodnost, tijekom trudnoće i dojenja. Zbog nedostatka odgovarajućih podataka, ne preporučuje se primjena ovog lijeka tijekom trudnoće i dojenja.

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nisu provedena ispitivanja o učincima na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

BRONCHOSTOP SINE sirup sadrži konzervanse: metilparahidroksibenzoat i propilparahidroksibenzoat. Mogu uzrokovati alergijske reakcije koje se mogu pojaviti kao odgođene reakcije (vidjeti "Nemojte uzimati BRONCHOSTOP SINE sirup").

BRONCHOSTOP SINE sirup sadrži koncentrirani sok maline koji sadrži saharozu, glukozu i fruktozu.

Ovaj lijek sadrži 66 mg fruktoze u svakih 15 ml.

Ako Vam je liječnik rekao da Vi (ili Vaše dijete) ne podnosite (podnosi) neke šećere ili ako Vam je dijagnosticirano nasljedno nepodnošenje fruktoze, rijetki genetski poremećaj kod kojeg osoba ne može razgraditi fruktozu, obratite se liječniku prije nego Vi (ili Vaše dijete uzmete (uzme) ili primite (primi) ovaj lijek.

BRONCHOSTOP SINE sirup sadrži propilenglikol.

Ovaj lijek sadrži 38,9 mg propilenglikola u svakih 15 ml.

BRONCHOSTOP SINE sirup sadrži natrij.

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po 15 ml doze, tj. zanemarive količine natrija.

3. Kako uzimati BRONCHOSTOP SINE sirup

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Doziranje

Odrasle osobe i adolescenti u dobi od 12 godina ili stariji

15 ml svaka 3 do 4 sata (4 puta na dan; ako je potrebno, može se uzeti najviše 6 doza (90 ml) dnevno.)

Djeca u dobi od 4 do 12 godina

7,5 ml svaka 3 do 4 sata (4 puta na dan; ako je potrebno, može se uzeti najviše 6 doza (45 ml) dnevno.)

Djeca mlađa od 4 godine:

Ne preporučuje se primjena u djece mlađe od 4 godine jer ne postoji dovoljno podataka.

Način primjene

Za primjenu kroz usta.

Uzimajte BRONCHOSTOP SINE sirup nerazrijeđen, stavljajući gore navedenu dozu u mjernu čašu koja ima skalu od 2,5 ml do 20 ml.

Trajanje primjene

Samoliječenje BRONCHOSTOP SINE sirupom treba biti ograničeno na pet dana. Ako do tada ne dođe do značajnijeg poboljšanja ili se simptomi pogoršaju, trebali biste se obratiti liječniku jer može biti prisutna ozbiljnija bolest.

Ako imate otežano disanje, visoku temperaturu (groznicu), iskašljana sluz je žuto-zelene ili smeđe boje (gnojni iskašljaj), morate se posavjetovati sa svojim liječnikom.

Ako uzmete više BRONCHOSTOP SINE sirupa nego što ste trebali

Nakon predoziranja ovim lijekom simptomi poznati kao nuspojave mogu imati jači intenzitet. U ovome slučaju, molimo obavijestite Vašeg liječnika koji će odlučiti o potrebnim mjerama.

Ako ste zaboravili uzeti BRONCHOSTOP SINE sirup

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Učestalost sljedećih nuspojava nije poznata.

Ovaj lijek može uzrokovati sljedeće ozbiljne alergijske reakcije. Ako primijetite bilo koju od sljedećih nuspojava, prestanite uzimati lijek i potražite hitnu liječničku pomoć:

- simptomi koji mogu uključivati vrtoglavicu ili nesvjesticu, otežano disanje ili piskanje, ubrzan rad srca, osip na koži, zbunjenost i tjeskobu ili gubitak svijesti (anafilaktička reakcija, reakcije preosjetljivosti)
- oticanje lica, usana, jezika, usta ili grla (angioedem; reakcije preosjetljivosti)

Druge moguće nuspojave:

- alergijske reakcije /reakcije preosjetljivosti) na koži uključujući koprivnjaču (crvena uzdignuta područja ili kvрге na koži), osip i svrbež
- poremećaji probavnog sustava kao što su probavne smetnje, bol ili nelagoda u truhu, proljev, povraćanje i mučnina.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u [Dodatku V](#).

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati BRONCHOSTOP SINE sirup

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25 °C.

Čuvati bocu u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenoga na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nakon uporabe čvrsto zatvorite bocu. Nakon otvaranja boce, sadržaj iskoristite unutar 4 tjedna.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što BRONCHOSTOP SINE sirup sadrži

Djelatne tvari su suhi ekstrakt timijanove zeleni i tekući ekstrakt korijena običnog bijeloga sljeza.

15 ml (15,45 g) oralne otopine sadrži:

0,12 g ekstrakta (kao suhi ekstrakt) iz *Thymus vulgaris* L. i/ili *Thymus zygis* L., herba (timijanova zelen) (7-13 : 1), ekstrakcijsko otapalo: voda i

0,83 g tekućega ekstrakta iz *Althaea officinalis* L., radix (korijen običnog bijeloga sljeza) (1 : 12-14), ekstrakcijsko otapalo: voda.

Drugi sastojci su:

maltodekstrin, akacija guma (arapska guma), ksilitol (E 967), metilparahidroksibenzoat (E 218), koncentrirani sok maline (sadrži saharozu, glukozu i fruktozu), ksantanska guma, citratna kiselina hidrat (E 330), propilparahidroksibenzoat (E 216), aroma maline (sadrži propilenglikol (E 1520), glicerol (E 422), saharinnatrij (E 954), neohesperidin dihidrokalkon (E 959), pročišćena voda.

Kako BRONCHOSTOP SINE sirup izgleda i sadržaj pakiranja

BRONCHOSTOP SINE sirup je smeđecrvena, viskozna otopina s mirisom i okusom timijanove zeleni i malina. 120 ml oralne otopine u smeđoj staklenoj boci s nastavkom za doziranje i polietilenskim zatvaračem.

Mjerna čaša sa skalom između 2,5 ml i 20 ml omogućuje precizno mjerenje preporučene količine.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Kwizda Pharma GmbH
Effingergasse 21, 1160 Beč
Austrija

<logo nositelja odobrenja>

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Oktal Pharma d.o.o.
Utinjska 40
10020 Zagreb
Hrvatska

Tel: 01/6595 777

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima.

Ova uputa je posljednji puta revidirana u ožujku 2023.