

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Bupropion Genericon 150 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem

bupropionklorid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Bupropion Genericon i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Bupropion Genericon
3. Kako uzimati Bupropion Genericon
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Bupropion Genericon
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Bupropion Genericon i za što se koristi

Bupropion Genericon je lijek koji Vam je liječnik propisao za liječenje depresije. Smatra se da ovaj lijek djeluje s kemijskim tvarima u mozgu koje se zovu *noradrenalin* i *dopamin*.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Bupropion Genericon

Nemojte uzimati Bupropion Genericon

- **Ako ste alergični** na bupropion ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
- **Ako uzimate druge lijekove koji sadrže bupropion**
- **Ako Vam je dijagnosticirana epilepsija ili imate epileptičke napadaje u povijesti bolesti**
- **Ako patite ili ste patili od nekog poremećaja prehrane** (npr. bulimije ili anoreksije)
- **Ako imate tumor na mozgu**
- **Ako inače puno pijete**, a nedavno ste prestali ili namjeravate prestati piti alkohol
- **Ako imate teških problema s jetrom**
- **Ako ste nedavno prestali uzimati sredstva za umirenje (sedative)** ili ih namjeravate prestati uzimati tijekom liječenja lijekom Bupropion Genericon
- **Ako uzimate ili ste uzimali druge lijekove za liječenje depresije** koji se nazivaju *inhibitori monoamino oksidaze (MAOI)* u posljednjih 14 dana.

Ako se nešto od navedenog odnosi na Vas, odmah porazgovarajte s liječnikom i **nemojte uzeti Bupropion Genericon**.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Bupropion Genericon:

- ako imate stanje koje se zove **Brugadin sindrom** (rijedak nasljedni sindrom koji utječe na srčani ritam) ili ako je netko u Vašoj obitelji doživio srčani zastoj ili iznenadnu smrt.

Djeca i adolescenti

Bupropion Genericon nije indiciran za liječenje djece mlađe od 18 godina.

Postoji povišen rizik od razmišljanja o samoubojstvu i takvog ponašanja u djece mlađe od 18 godina koja se liječe antidepresivima.

Odrasli

Prije nego započnete liječenje lijekom Bupropion Genericon obavijestite Vašeg liječnika:

- Ako redovito pijete alkoholna pića u većim količinama
- Ako imate dijabetes (šećernu bolest) i liječite se tabletama ili inzulinom
- Ako ste doživjeli ozbiljnu ozljedu ili u povijesti bolesti imate traumu glave

Bupropion Genericon može izazvati epileptičke napadaje u oko 1 na 1000 osoba. Vjerojatnije je da ova nuspojava nastupi u osoba koje pripadaju jednoj od gore navedenih skupina. Ako tijekom liječenja dobijete napadaj, morate prestati uzimati Bupropion Genericon. **Nemojte ga više uzimati i javite se svom liječniku.**

- Ako imate bipolarni poremećaj (ekstremne promjene raspoloženja), Bupropion Genericon bi mogao izazvati epizode te bolesti
- Ako uzimate druge lijekove za depresiju, primjena ovih lijekova zajedno s lijekom Bupropion Genericon može dovesti do serotoninskog sindroma, stanja koje je potencijalno opasno po život (vidjeti „Drugi lijekovi i Bupropion Genericon” u nastavku ovog dijela)
- Ako imate problema s jetrom ili bubrežima, možete biti skloniji nuspojavama.

Ako se nešto od navedenog odnosi na Vas, porazgovarajte ponovno s Vašim liječnikom prije uzimanja lijeka Bupropion Genericon. Liječnik će Vas možda željeti osobito pažljivo pratiti ili preporučiti neko drugo liječenje.

Razmišljanje o samoubojstvu i pogoršanje Vaše depresije

Ako patite od depresije, ponekad možete imati misli o samoozljeđivanju ili samoubojstvu. Takva razmišljanja mogu se pogoršavati na početku uzimanja antidepresiva, s obzirom na to da je potrebno oko dva tjedna, a ponekad i više, da takvi lijekovi počnu djelovati.

Vjerojatnije je da ćete tako razmišljati:

- Ako ste i prije razmišljali o samoozljeđivanju ili samoubojstvu.
- Ako ste mlađa odrasla osoba. Podaci iz kliničkih ispitivanja pokazali su povišen rizik od suicidalnog ponašanja u odraslih osoba mlađih od 25 godina s psihijatrijskim stanjima koji su liječeni antidepresivima.

Imate li u bilo kojem trenutku misli o samoozljeđivanju ili samoubojstvu, **odmah obavijestite Vašeg liječnika ili otidite u najbližu bolnicu.**

Bilo bi poželjno da rođaku ili bliskom prijatelju kažete da ste depresivni i zamolite ih da pročitaju ovu uputu. Možete ih zamoliti da Vam kažu ako misle da se Vaša depresija pogoršava ili ako su zabrinuti zbog promjena u Vašem ponašanju.

Drugi lijekovi i Bupropion Genericon

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, biljne ili vitaminske pripravke, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta. Liječnik će možda prilagoditi dozu lijeka Bupropion Genericon ili savjetovati promjenu u uzimanju drugih lijekova.

Ako uzimate ili ste uzimali druge antidepresive koji se nazivaju inhibitori monoamino oksidaze (MAO inhibitori) u proteklih 14 dana, obavijestite Vašeg liječnika i nemojte uzimati Bupropion Genericon (vidjeti također „Nemojte uzimati Bupropion Genericon” u dijelu 2).

Neki lijekovi ne smiju se uzimati istodobno s lijekom Bupropion Genericon. Neki od njih mogu povećati vjerojatnost da dobijete epileptički napadaj. Drugi lijekovi mogu povećati rizik od drugih nuspojava. Neki primjeri su navedeni u nastavku teksta, ali taj popis nije potpun.

Vjerojatnost napadaja može biti veća nego obično:

- Ako uzimate druge lijekove za liječenje depresije ili nekih drugih psihičkih bolesti
- Ako uzimate teofilin za liječenje astme ili bolesti pluća
- Ako uzimate tramadol, jako sredstvo za ublažavanje bolova
- Ako uzimate sredstva za umirenje (sedative) ili ih namjeravate prestati uzimati dok se liječite lijekom Bupropion Genericon (vidjeti također „Nemojte uzimati Bupropion Genericon” u dijelu 2)
- Ako uzimate lijekove protiv malarije (npr. meflokin ili klorokin)
- Ako uzimate stimulanse ili neke druge lijekove za kontrolu težine ili apetita
- Ako uzimate steroide (na usta ili injekcijom)
- Ako uzimate antibiotike iz skupine kinolona
- Ako uzimate neke vrste antihistaminika koji mogu uzrokovati pospanost
- Ako uzimate lijekove za liječenje dijabetesa.

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas, odmah razgovarajte s Vašim liječnikom prije nego počnete uzimati Bupropion Genericon. Liječnik će procijeniti korist u odnosu na rizik liječenja lijekom Bupropion Genericon.

Vjerojatnost drugih nuspojava može biti veća nego obično:

- Ako uzimate druge lijekove za liječenje depresije (npr. amitriptilin, fluoksetin, paroksetin, citalopram, escitalopram, venlafaksin, dosulepin, dezipramin ili imipramin) ili nekih drugih psihičkih bolesti (npr. klopazepam, risperidon, tioridazin ili olanzapin). Bupropion Genericon može stupiti u interakciju s nekim lijekovima koji se koriste za liječenje depresije te možete iskusiti promjene mentalnog statusa (npr. uznemirenost, halucinacije, koma) i druge učinke, kao što su tjelesna temperatura iznad 38 °C, povećana srčana frekvencija, nestabilan krvni tlak i pretjerani refleksi, ukočenost mišića, nedostatak koordinacije i/ili probavni simptomi (npr. mučnina, povraćanje, proljev).
- Ako uzimate lijekove za liječenje Parkinsonove bolesti (levodopa, amantadin ili orfenadrin)
- Ako uzimate lijekove koji utječu na sposobnost Vašeg tijela da razgradi Bupropion Genericon (karbamazepin, fenitoin, valproat)
- Ako uzimate lijekove koji se koriste u liječenju raka (kao što su ciklofosfamid ili ifosfamid)
- Ako uzimate tiklopidin ili klopidogrel, koji se uglavnom koriste za sprječavanje moždanog udara
- Ako uzimate neke beta blokatore (npr. metoprolol)
- Ako uzimate neke lijekove za liječenje nepravilnog srčanog ritma (propafenon ili flekainid)
- Ako koristite nikotinske flastere kao pomoć pri prestanku pušenja.

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas, odmah razgovarajte s Vašim liječnikom, prije nego počnete uzimati Bupropion Genericon.

Bupropion Genericon može biti manje učinkovit:

- Ako uzimate ritonavir ili efavirenz, lijekove za liječenje infekcije HIV-om.

Ako se ovo odnosi na Vas, svakako recite svom liječniku. Liječnik će provjeriti koliko dobro Bupropion Genericon djeluje na Vas. Možda će Vam biti potrebno povisiti dozu ili promijeniti terapiju za Vašu depresiju. Nemojte nikako povisivati dozu lijeka Bupropion Genericon bez savjetovanja s Vašim liječnikom, jer to može povisiti rizik od pojave nuspojava, uključujući i napadaje.

Bupropion Genericon može smanjiti učinkovitost drugih lijekova:

- Ako uzimate tamoksifen za liječenje raka dojke. Ako se ovo odnosi na Vas, obavijestite Vašeg liječnika. Možda će biti potrebno promijeniti liječenje Vaše depresije.
- Ako uzimate digoksin za Vaše srce. Ako se ovo odnosi na Vas, obavijestite Vašeg liječnika. Vaš liječnik može razmotriti prilagodbu doze digoksina.

Bupropion Genericon s alkoholom

Alkohol može utjecati na djelovanje lijeka Bupropion Genericon i kad se uzimaju zajedno, mogu utjecati na Vaše živce ili mentalno stanje. Neki ljudi su osjetljiviji na utjecaj alkohola dok uzimaju bupropion. Liječnik Vam može preporučiti da ne pijete alkohol (pivo, vino ili žestoka pića) dok uzimate Bupropion Genericon ili da pokušate piti vrlo malo. Ali ako sada puno pijete, nemojte naglo prestati, jer Vas to može izložiti riziku dobivanja napadaja.

Razgovarajte s liječnikom o alkoholu prije nego počnete uzimati Bupropion Genericon.

Učinci na pretrage urina

Bupropion Genericon može djelovati na neke pretrage urina kojima se otkrivaju drugi lijekovi. Ako morate napraviti pretragu urina, obavijestite Vašeg liječnika ili u bolnici u koju idete da uzimate Bupropion Genericon.

Trudnoća i dojenje

Nemojte uzimati Bupropion Genericon ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, osim ako Vam ga liječnik ne propiše. Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek. Neka, ali ne sva, ispitivanja su pokazala povećani rizik od nastanka urođenih mana, osobito srčanih mana, u djece čije su majke uzimale bupropion. Nije poznato je li navedeno posljedica uzimanja bupropiona.

Djelatna tvar lijeka Bupropion Genericon može prijeći u majčino mlijeko. Upitajte svog liječnika ili ljekarnika za savjet prije nego počnete uzimati Bupropion Genericon.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ako nakon uzimanja lijeka Bupropion Genericon osjetite omaglicu ili ošamućenost, nemojte voziti niti upravljati alatima ili strojevima.

3. Kako uzimati Bupropion Genericon

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Ovo su uobičajene doze, ali će liječnik preporučiti dozu osobno za Vas. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Može proći neko vrijeme prije nego se počnete osjećati bolje. Treba vremena dok lijek ne postigne puni učinak, ponekad nekoliko tjedana ili mjeseci. Kad se počnete osjećati bolje, liječnik Vam može savjetovati da nastavite uzimati Bupropion Genericon kako bi spriječili da se depresija vrati.

Koliko tableta uzeti

Uobičajena preporučena doza za odrasle je jedna tableta od 150 mg svakog dana. Liječnik Vam može povisiti dozu na 300 mg svakog dana, ako se depresija ne poboljša nakon nekoliko tjedana.

Neke osobe će ostati na dozi od jedne tablete od 150 mg na dan cijelo vrijeme liječenja. Liječnik Vam to može preporučiti ako imate problema s jetrom ili bubrezima.

Uzmite dozu Bupropion Genericon tableta ujutro. Nemojte uzimati Bupropion Genericon više od jedanput na dan.

Bupropion Genericon je namijenjen za primjenu kroz usta.

Tablete progutajte cijele. Nemojte ih žvakati, drobiti niti lomiti - jer u tom slučaju postoji opasnost od predoziranja zbog prebrzog oslobađanja lijeka u Vašem organizmu. Ako se to dogodi, povećana je vjerojatnost pojave nuspojava, uključujući napadaje.

Bupropion Genericon tablete mogu se uzeti s hranom ili bez nje.

Tableta je obložena ovojnicom koja polako otpušta lijek u Vašem tijelu. Mogli biste uočiti nešto što nalikuje na tabletu u Vašoj stolici. To je prazna ovojnica koja je prošla kroz Vaše tijelo.

Koliko dugo uzimati tablete

Samo Vi i Vaš liječnik možete odlučiti koliko dugo morate uzimati Bupropion Genericon. Mogu proći tjedni ili mjeseci liječenja prije nego primijetite poboljšanje. Redovito razgovarajte s liječnikom o simptomima kako biste odlučili koliko dugo morate uzimati lijek. Kad se počnete osjećati bolje, liječnik Vam može savjetovati da nastavite uzimati Bupropion Genericon kako bi spriječili da se depresija vrati.

Ako uzmete više Bupropion Genericon tableta nego što ste trebali

Ako uzmete previše tableta, možete povećati rizik od napadaja. Bez odgađanja upitajte svog liječnika što trebate učiniti ili se javite u hitnu službu najbliže bolnice.

Ako ste zaboravili uzeti Bupropion Genericon

Ako zaboravite uzeti dozu, pričekajte i uzmite sljedeću tabletu u redovno vrijeme. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.

Ako prestanete uzimati Bupropion Genericon

Nemojte prestati uzimati Bupropion Genericon ili smanjiti dozu prije nego što razgovarate sa svojim liječnikom.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Ozbiljne nuspojave

Napadaji

Otpribliže 1 od 1000 osoba koje uzimaju bupropion imaju rizik od pojave napadaja (napadaji ili konvulzije). Rizik se povećava ako prekoračite dozu, ako istodobno uzimate određene lijekove, ili ako ste pod većim rizikom od napadaja nego uobičajeno. Ako ste zabrinuti zbog toga, razgovarajte s Vašim liječnikom.

Ako doživite napadaj, javite se Vašem liječniku čim se oporavite. **Nemojte više uzimati tablete.**

Alergijske reakcije

Neki ljudi mogu razviti alergijske reakcije na Bupropion Genericon. One uključuju:

- Crvenilo ili osip kože (poput koprivnjače), mjehuriće ili kvržice na koži koje svrbe. Neke oblike osipa možda će biti potrebno liječiti u bolnici, osobito ako se uz njih javljaju i bolna usta ili oči.
- Neuobičajeno piskanje ili otežano disanje
- Otečene kapke, usne ili jezik
- Bolove u mišićima ili zglobovima
- Kolaps ili nesvjesticu

Ako imate bilo koji znak alergijske reakcije, odmah se javite Vašem liječniku. **Nemojte više uzimati tablete.**

Alergijske reakcije mogu trajati dulje vrijeme. Ako Vam je liječnik propisao neki lijek za ublažavanje alergijskih simptoma, važno je da dovršite liječenje.

Kožni osip kod lupusa ili pogoršanje simptoma lupusa

Učestalost pojave ove ozbiljne nuspojave se ne može procijeniti iz dostupnih podataka kod osoba koje uzimaju bupropion.

Lupus je poremećaj imunološkog sustava koji utječe na kožu i druge organe. Ako tijekom uzimanja lijeka Bupropion Genericon dođe do rasplamsavanja lupusa, pojave kožnog osipa ili lezija (posebno na mjestima izloženim suncu), odmah se obratite svom liječniku jer će možda biti potrebno prekinuti liječenje.

Akutna generalizirana egzantematozna pustuloza (engl. Acute Generalised Exanthematous Pustulosis, AGEP)

Učestalost ove ozbiljne nuspojave se ne može procijeniti iz dostupnih podataka o osobama koje uzimaju bupropion.

Simptomi AGEP-a uključuju osip s prištićima/mjehurićima ispunjenima gnojem.

Ako imate osip s prištićima/mjehurićima ispunjenima gnojem, odmah se obratite liječniku jer ćete možda morati prekinuti liječenje.

Ostale nuspojave

Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba)

- Teškoće sa spavanjem. Svakako uzimajte Bupropion Genericon ujutro.
- Glavobolja
- Suha usta
- Mučnina, povraćanje

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba)

- Vrućica, omaglica, svrbež, znojenje i osip kože (ponekad zbog alergijske reakcije)
- Tresenje, nevoljno drhtanje, opća slabost, umor, bol u prsnom košu
- Osjećaj tjeskobe ili uznemirenosti
- Bol u trbuhu ili ostali poremećaji (zatvor), promjene okusa hrane, gubitak apetita (anoreksija)
- Porast krvnog tlaka, ponekad jak, naleti crvenila
- Zvonjava u ušima, poremećaji vida

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba)

- Osjećaj depresije (vidjeti također dio 2. „Razmišljanje o samoubojstvu i pogoršanje Vaše depresije“)
- Osjećaj smetenosti
- Otežano koncentriranje
- Ubrzani puls
- Gubitak tjelesne težine

Rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba)

- Napadaji

Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba)

- Osjećaj lupanja srca, nesvjestica
- Trzanje mišića, ukočenost mišića, nekontrolirani pokreti, problemi s hodaњem ili koordinacijom
- Osjećaj nemira, razdražljivosti, neprijateljsko, agresivno raspoloženje, abnormalni snovi, trnci ili utrnulost, gubitak pamćenja
- Žutilo kože ili bjeloočnica (žutica) što može biti uzrokovano povećanjem razina jetrenih enzima, hepatitis
- Teške alergijske reakcije; osip praćen bolovima u zglobovima i mišićima

- Promjene razina šećera u krvi
- Mokrenje češće ili rjeđe nego obično
- Urinarna inkontinencija (nevoljno mokrenje, curenje mokraće)
- Teški osipi kože koji mogu zahvatiti usta i druge dijelove tijela i mogu biti opasni po život bolesnika
- Pogoršanje psorijaze (zadebljala područja crvene kože)
- Možete se osjećati nestvarno ili čudno (depersonalizacija); čuti ili vidjeti stvari koje ne postoje (halucinacije); osjećati ili vjerovati u stvari koje nisu istinite (deluzije) ili imati jake sumnje (paranoja)
- Pad tlaka kod naglog ustajanja (posturalna hipotenzija)

Nepoznata učestalost (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

Ostale nuspojave pojavljuju se kod malog broja ljudi, no točna učestalost nije poznata.

- misli o samoozljeđivanju ili samoubojstvu tijekom uzimanja bupropiona ili ubrzo nakon prekida liječenja (vidjeti dio 2. „Što morate znati prije nego počnete uzimati Bupropion Genericon”). Ako imate takve misli, **odmah se javite Vašem liječniku ili otidite u bolnicu.**
- gubitak dodira sa stvarnošću i nemogućnost jasnog razmišljanja ili donošenja odluka (*psihoza*); ostali simptomi mogu uključivati halucinacije i/ili deluzije
- osjećaj iznenadnog i intenzivnog straha (napadaj panike).
- mucanje.
- smanjeni broj crvenih krvnih stanica (anemija), smanjeni broj bijelih krvnih stanica (leukopenija) i smanjeni broj krvnih pločica (trombocitopenija)
- snižene vrijednosti natrija u krvi (hiponatrijemija)
- **Serotoninski sindrom:** promjene mentalnog statusa (npr. uznemirenost, halucinacije, koma), i drugi učinci, kao što su tjelesna temperatura iznad 38°C, povećana srčana frekvencija, nestabilan krvni tlak i pretjerani refleksi, ukočenost mišića, nedostatak koordinacije i/ili probavni simptomi (npr. mučnina, povraćanje, proljev), tijekom primjene lijeka Bupropion Genericon zajedno s lijekovima za liječenje depresije (poput paroksetina, citaloprama, escitaloprama, fluoksetina i venlafaksina).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u [Dodatku V](#). Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Bupropion Genericon

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ovaj lijek ne zahtijeva posebne temperaturne uvjete čuvanja.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage i svjetlosti.

Nakon prvog otvaranja: Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C. Iskoristiti u roku od 3 mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Bupropion Genericon sadrži

- Djelatna tvar je bupropionklorid. Svaka tableta sadrži 150 mg bupropionklorida.
- Drugi sastojci su:
 - *jezgra tablete*: hidroksipropilceluloza, silicifirana mikrokristalična celuloza, stearatna kiselina, magnezijev stearat
 - *ovojnica tablete*: etilceluloza, hidroksipropilceluloza, titanijev dioksid (E171), trietilcitrat, metakrilatna kiselina/etilakrilat kopolimer, talk

Kako Bupropion Genericon izgleda i sadržaj pakiranja

Bupropion Genericon 150 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem su kremasto bijele do blijedo žute, okrugle, bikonveksne tablete promjera približno 8,1 mm.

Veličine pakiranja

Bupropion Genericon je dostupan u pakiranjima koja sadrže 7, 30, 60 ili 90 tableta.

U spremniku s tabletama nalazi se kapsula sa sredstvom koje održava tablete suhima. Molimo Vas nemojte progutati kapsulu.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.

Hafnerstrasse 211

8054 Graz

Austrija

Proizvođač

Balkanpharma-Dupnitsa AD

3 Samokovsko Shosse Str.

Dupnitsa 2600

Bugarska

Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.

Hafnerstrasse 211

8054 Graz

Austrija

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Genericon Pharma d.o.o.

Nova Ves 17

10 000 Zagreb

Tel: 01 4669322

Ovaj lijek je odobren u državama Europskog gospodarskog prostora (EGP) pod sljedećim nazivima:

Austrija: Bupropion +pharma 150 mg Tabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung

Hrvatska: Bupropion Genericon 150 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem

Češka: Bupropion +pharma

Poljska: Welbox

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u siječnju 2024.