

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Canephron obložene tablete

prašak kičice zeleni, prašak ljupčačevog korijena, prašak ružmarinovog lista

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš liječnik ili ljekarnik.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se Vašem ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
- Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Canephron i za što se koristi?
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Canephron?
3. Kako uzimati Canephron?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Canephron?
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Canephron i za što se koristi?

Canephron je tradicionalni biljni lijek koji se primjenjuje

- za potporno liječenje u slučaju blažih tegoba uzrokovanih upalnim bolestima izvodnih mokraćnih putova (kao što su učestalo mokrenje, žarenje pri mokrenju i pojačan poriv na mokrenje);
- kako bi se postiglo ispiranje mokraćnih putova radi smanjenja nakupljanja bubrežnih kamenaca.

Ovo je tradicionalni biljni lijek koji se primjenjuje u određenim indikacijama isključivo na temelju dugotrajne uporabe.

Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Canephron?

Nemojte uzimati Canephron:

- ako ste alergični na djelatne tvari, druge biljke iz porodice štitarki (*Apiaceae/Umbelliferae*, npr. anis, koromač), anetol (sastavni dio eteričnih ulja) ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6);
- ako imate čir na želucu ili dvanaesniku;
- u slučaju edema koji je posljedica oštećene srčane ili bubrežne funkcije i/ili ako je liječnik preporučio smanjeni unos tekućine.

Upozorenja i mjere opreza

Ako nastupe ustrajna vrućica, bol u donjem dijelu trbuha, grčevi, krv u mokraći, poremećaj mokrenja i akutno zadržavanje mokraće, odmah se obratite liječniku.

Djeca

Nema dovoljno podataka o primjeni ovog lijeka u djece mlađe od 12 godina. Ovaj lijek se ne smije primjenjivati u djece mlađe od 12 godina.

Drugi lijekovi i Canephron

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate/primjenjujete, nedavno ste uzeli/primjenili ili biste mogli uzeti/primjeniti bilo koje druge lijekove.

Za sada nema poznatih interakcija s drugim lijekovima. Nisu provedena ispitivanja interakcija.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Može se razmotriti primjena lijeka Canephron tijekom trudnoće ako liječnik smatra da je potrebna.

Nije poznato izlučuju li se Canephron ili djelatne tvari/metaboliti u majčino mlijeko. Canephron se ne bi trebao primjenjivati tijekom dojenja.

Nema dostupnih podataka o učincima na plodnost u ljudi.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nisu provedena ispitivanja utjecaja lijeka Canephron na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

Canephron sadrži šećere glukoza, saharozu i laktozu

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

3. Kako uzimati Canephron?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je:

Odrasli i adolescenti stariji od 12 godina uzimaju 1 obloženu tabletu 3 puta na dan.

Nema dovoljno podataka za posebne preporuke za doziranje u slučaju oštećene funkcije bubrega ili jetre.

Primjena u djece

Canephron se ne smije primjenjivati u djece mlađe od 12 godina.

Način primjene:

Uzmite jednu dozu lijeka Canephron 3 puta na dan (ujutro, sredinom dana, navečer), neovisno o obroku.

Canephron treba proglutati cijeli (neprožvakan) i najbolje ga je uzeti s nešto tekućine, npr. uz čašu vode.

Uzimanje obilnih količina tekućine tijekom terapije pridonosi liječenju.

Ako se simptomi pogoršaju ili se ne poboljšaju unutar 3 dana, potrebno je potražiti savjet liječnika. U slučaju samoliječenja, lijek se ne smije uzimati dulje od 2 tjedna.

Ako uzmete više lijeka Canephron nego što ste trebali

Ako ste uzeli više lijeka Canephron nego što ste trebali, obavijestite Vašeg liječnika.

Liječnik će odlučiti o potrebnim mjerama. Postoji mogućnost da niže navedene nuspojave budu jače izražene.

Za sada nema prijavljenih slučajeva predoziranja.

Ako ste zaboravili uzeti Canephron

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba)

Poremećaji probavnog sustava (mučnina, nelagoda u trbuhu, proljev).

Nepoznata učestalost (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

Alergijske reakcije.

Ako nastupe nuspojave, potrebno je odmah prestati uzimati lijek i obratiti se liječniku. Liječnik može procijeniti njihovu težinu i odlučiti koje bi daljnje mjere trebalo poduzeti.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u [Dodatku V](#).

Prijavljinjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Canephron?

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i spremniku (blister pakiranje). Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Canephron sadrži?

Djelatne tvari su prašak kičice zeleni, prašak ljupčačevog korijena i prašak ružmarinovog lista. Jedna obložena tableta sadrži 36 mg *Centaurium erythraea* Rafn s.l., herba pulvis (kičina zelen, prašak), 36 mg *Levisticum officinale* Koch., radix pulvis (ljupčačev korijen, prašak) i 36 mg *Rosmarinus officinalis* L., folium pulvis (ružmarinov list, prašak).

Drugi sastojci su:

Jezgra tablete: laktosa hidrat, magnezijev stearat, kukuruzni škrob, povidon K 25, koloidni bezvodni silicijev dioksid

Ovojnica: kalcijev karbonat, djevičansko ricinusovo ulje, željezov(III) oksid (E172), dekstrin, tekuća glukoza, suha disperzija, kukuruzni škrob, montanski glikolni vosak, povidon K 30, saharoza, šelak, riboflavin (E101), talk, titanijev dioksid (E171).

Kako Canephron izgleda i sadržaj pakiranja?

Obložene tablete su narančaste, okrugle, bikonveksne, glatke površine. Obložena tableta ima promjer od 10,2 do 10,6 mm.
Pakiranje sadrži 30, 60 ili 90 obloženih tableta u PVC/PVdC//Al blisteru, u kutiji.

U prometu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač
BIONORICA SE
Kerschensteinerstraße 11-15
92318 Neumarkt
Njemačka

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku:
Aicore Consumer d.o.o.
Jarunska ulica 35
10000 Zagreb
Tel.: +385 98 9313 330

Način i mjesto izdavanja
Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u veljači 2022.