

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Claritine Alergija 1 mg/ml sirup loratadin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se Vašem ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
- Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Claritine Alergija sirup i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Claritine Alergija sirup
3. Kako uzimati Claritine Alergija sirup
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Claritine Alergija sirup
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Claritine Alergija sirup i za što se koristi

Puni naziv ovog lijeka je Claritine Alergija 1 mg/ml sirup.

Što je Claritine Alergija sirup

Claritine Alergija sirup sadrži djelatnu tvar loratadin, koja pripada skupini lijekova poznatih pod nazivom "antihistaminici".

Kako Claritine Alergija sirup djeluje

Claritine Alergija sirup pomaže u olakšavanju alergijskih simptoma sprječavajući učinke tvari pod nazivom "histamin", koja se stvara u organizmu kad ste na nešto alergični.

Kada je potrebno uzimati Claritine Alergija sirup

Claritine Alergija sirup ublažava simptome povezane s alergijskim rinitisom (npr. kod peludne groznice), poput kihanja, curenja ili svrbeža nosa, peckanja ili svrbeža očiju u odraslih i djece starije od 2 godine.

Claritine Alergija sirup se također može primijeniti za ublažavanje simptoma koprivnjače (svrbež, crvenilo te brojnost i veličina osipa).

Učinak Claritine Alergija sirupa traje cijeli dan i to bi Vam trebalo pomoći da nastavite s normalnim dnevnim aktivnostima i da normalno spavate.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Claritine Alergija sirup

Nemojte uzimati Claritine Alergija sirup

- ako ste alergični na loratadin ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete lijek Claritine Alergija sirup:

- ako imate bolest jetre
- ako ste naručeni na neki kožni test za alergije. Nemojte uzimati Claritine Alergija sirup dva dana prije testiranja, zato što to može utjecati na rezultate testa.

Ako se išta od gore navedenog odnosi na Vas (ili niste sigurni), obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Claritine Alergija sirup.

Djeca

Nemojte davati Claritine Alergija sirup djeci mlađoj od 2 godine.

U djece od 2 do 6 godina liječenje se mora provoditi pod nadzorom liječnika.

Drugi lijekovi i Claritine Alergija sirup

Nuspojave lijeka Claritine Alergija sirup mogu se pogoršati kada se Claritine Alergija sirup uzima zajedno s lijekovima koji mijenjaju djelovanje nekih enzima odgovornih za metabolizam lijekova u jetri. Međutim, u kliničkim ispitivanjima nije opaženo pogoršavanje nuspojava prilikom primjene loratadina kada se uzima s lijekovima koji utječu na djelovanje tih enzima.

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. To uključuje i lijekove koje ste nabavili bez recepta.

Claritine Alergija sirup s alkoholom

Claritine Alergija sirup nije pokazao pojačavanje učinka alkoholnih pića.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Preporučuje se, kao mjeru predostrožnosti, izbjegavati primjenu lijeka Claritine Alergija sirup tijekom trudnoće.

Ako dojite, nemojte uzimati Claritine Alergija sirup. Loratadin se izlučuje u majčino mlijeko.

Upravljanje vozilima i strojevima

U kliničkim ispitivanjima u kojima se procjenjivala sposobnost upravljanja vozilima nije primjećen negativan utjecaj u bolesnika koji su primali loratadin. Ako se uzme u preporučenoj dozi, ne očekuje se da će Claritine Alergija sirup izazvati omamljenost ili smanjenje opreznosti. Međutim, vrlo rijetko neki ljudi osjete omamljenost, što može utjecati na njihovu sposobnost upravljanja vozilima ili strojevima.

Claritine Alergija sirup sadrži:

Tekući maltitol: Ovaj lijek sadrži 3 g tekućeg maltitola u 5 ml sirupa, što odgovara 600,69 mg/ml.

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se svom liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

Sorbitol: Ovaj lijek sadrži 700 mg sorbitola u 5 ml sirupa, što odgovara 140 mg/ml. Sorbitol je izvor fruktoze. Ako vam je liječnik rekao da Vi (ili vaše dijete) ne podnosite neke šećere ili ako Vam je dijagnosticirano nasljedno nepodnošenje fruktoze (HFI), rijetki nasljedni poremećaj kod kojeg bolesnik ne može razgraditi fruktozu, obratite se liječniku prije nego što Vi (ili vaše dijete) uzmete ovaj lijek.

Propilenglikol: Ovaj lijek sadrži 270,7 mg propilenglikola u 5 ml sirupa što odgovara 54,14 mg/ml.

Natrij: Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija na 5 ml sirupa, tj. zanemarive količine natrija.

Natrijev benzoat: Ovaj lijek sadrži 2,5 mg natrijevog benzoata u 5 ml sirupa, što odgovara 0,5 mg/ml.

3. Kako uzimati Claritine Alergija sirup?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Koliko lijeka uzeti:

Dob i tjelesna težina	Koliko lijeka uzeti	Koliko često uzeti lijek
Odrasli i djeca starija od 12 godina	10 ml (mjerna čašica napunjena do linije od 10 ml)	Jedanput na dan
Djeca u dobi od 2 do 12 godina, tjelesna težina veća od 30 kg	10 ml (mjerna čašica napunjena do linije od 10 ml)	Jedanput na dan
Djeca u dobi od 2 do 12 godina, tjelesna težina 30 kg ili manja	5 ml (mjerna čašica napunjena do linije od 5 ml)	Jedanput na dan

U djece od 2 do 6 godina liječenje se mora provoditi pod nadzorom liječnika. Claritine Alergija sirup se ne preporučuje u djece mlađe od 2 godine.

Odrasli i djeca s teškim problemima s jetrom:

Prije nego što uzmete ovaj lijek, morate se obratiti Vašem liječniku.

Dob i tjelesna težina	Koliko lijeka uzeti	Koliko često uzeti lijek
Odrasli i djeca tjelesne težine veće od 30 kg	10 ml (mjerna čašica napunjena do linije od 10 ml)	Jedanput svaki drugi dan
Djeca u dobi od 2 do 12 godina, tjelesne težine 30 kg ili manja	5 ml (mjerna čašica napunjena do linije od 5 ml)	Jedanput svaki drugi dan

Uzimanje ovog lijeka

- Nije potrebna voda ili druga tekućina da bi se progutao sirup.
- Sirup se može uzimati s hranom ili bez nje.

Trajanje liječenja

Lijek je namijenjen za kratkotrajnu primjenu. Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije.

Ako uzmete više lijeka Claritine Alergija sirup nego što ste trebali

Ako uzmete više lijeka Claritine Alergija sirup nego što ste trebali, odmah se obratite svom liječniku ili ljekarniku. Ne očekuju se ozbiljni problemi, međutim, možete imati glavobolju, ubrzano kucanje srca ili osjetiti pospanost.

Ako ste zaboravili uzeti Claritine Alergija sirup

- Ako ste zaboravili uzeti svoju dozu, uzmite je čim se sjetite, a zatim lijek nastavite uzimati po uobičajenom rasporedu.
- Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Najčešće prijavljene nuspojave u odraslih i djece u dobi iznad 12 godina su:

- omamljenost
- glavobolja
- pojačan apetit
- poteškoće sa spavanjem.

Najčešće prijavljene nuspojave u djece u dobi od 2 do 12 godina su:

- glavobolja
- nervoza
- umor.

Sljedeće **vrlo rijetke** nuspojave (mogu se javiti u najviše 1 na 10 000 osoba) također su opažene nakon stavljanja loratadina u promet:

- jake alergijske reakcije (uključujući oticanje)
- omaglica
- konvulzije
- ubrzani ili nepravilni otkucaji srca
- mučnina
- suha usta
- nelagoda u želucu
- tegobe s jetrom
- ispadanje kose
- osip
- umor.

Sljedeća nuspojava **nepoznate** učestalosti (učestalost se ne može utvrditi iz dostupnih podataka): povećana tjelesna težina.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: [navedenog u Dodatku V](#).

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Claritine Alergija sirup

- Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
- Ne zamrzavati. Bočicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.
- Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na bočici iza oznake "EXP". Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.
- Claritine Alergija sirup se mora upotrijebiti unutar 1 mjeseca nakon otvaranja.
- Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti ako primijetite neku promjenu u izgledu sirupa.
- Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove mjere pomoći će u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Claritine Alergija sirup sadrži

- Djelatna tvar je loratadin. Svakih 10 ml sirupa sadrži 10 mg loratadina.
- Drugi sastojci su dinatrijev edetat (E386), natrijev dihidrogenfosfat dihidrat (E339), tekući maltitol (E965), propilenglikol (E1520), glicerol (E422), fosfatna kiselina (E338), natrijev benzoat (E211), sorbitol, tekući (E420), sukraloza (E955), umjetna aroma grožđa i pročišćena voda.

Kako Claritine Alergija sirup izgleda i sadržaj pakiranja

Sirup.

Claritine Alergija sirup je bistar, bezbojan do svijetložut sirup.

Claritine Alergija sirup dostupan je u bijeloj neprozirnoj plastičnoj bočici od 120 ml sa sigurnosnim plastičnim zatvaračem za djecu. Priložena je plastična mjerna čašica s dozirnim linijama za 5 ml i 10 ml.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač**Nositelj odobrenja**

Bayer d.o.o.

Radnička cesta 80

10 000 Zagreb

Proizvođač

Berlimed S.A.

Poligono Industrial Santa Rosa

Calle Francisco Alonso No.7

28806 Alcalá de Henares (Madrid)

Španjolska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u kolovozu 2023.