

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Clizay 25 mg filmom obložene tablete
Clizay 50 mg filmom obložene tablete
Clizay 100 mg filmom obložene tablete
brivaracetam

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Clizay i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Clizay
3. Kako uzimati Clizay
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Clizay
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Clizay i za što se koristi

Što je Clizay

Ovaj lijek sadrži djelatnu tvar brivaracetam. Pripada skupini lijekova koji se zovu „antiepileptici“. Ti se lijekovi koriste za liječenje epilepsije.

Za što se Clizay koristi

- Clizay se koristi u odraslih, adolescenata i djece od navršene 2 godine.
- Koristi se za liječenje jedne vrste epilepsije s djelomičnim napadajima uz sekundarnu generalizaciju ili bez nje.
- Parcijalni napadaji su napadaji koji započinju tako da zahvaćaju samo jednu stranu mozga. Ti se parcijalni napadaji mogu proširiti i zahvatiti veća područja na obje strane mozga – to se naziva sekundarnom generalizacijom.
- Dobili ste ovaj lijek kako bi se smanjio broj napadaja koje imate.
- Clizay se primjenjuje zajedno s drugim lijekovima za liječenje epilepsije.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Clizay

Nemojte uzimati Clizay

- ako ste alergični na brivaracetam, druge slične kemijske spojeve poput levetiracetama ili piracetama ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.). Ako niste sigurni, obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Clizay.
- ako ste ikada imali težak kožni osip ili ljuštenje kože, mjehuriće i/ili ranice u ustima nakon uzimanja lijeka brivaracetam.
- Ozbiljne kožne reakcije, uključujući Stevens-Johnsonov sindrom, prijavljene su u vezi s liječenjem lijekom brivaracetam. Prestanite uzimati Clizay i odmah potražite liječničku pomoć ako primijetite bilo koji od simptoma povezanih s ovim ozbiljnim kožnim reakcijama opisanim u dijelu 4.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Clizay:

- ako razmišljate o samoozljeđivanju ili samoubojstvu. Mali broj ljudi koji se liječe antiepileptičkim lijekovima kao što je brivaracetam razmišljali su o samoozljeđivanju ili samoubojstvu. Ako u bilo kojem trenutku počnete razmišljati o tome, odmah se javite svom liječniku.
- ako imate jetrenih tegoba, Vaš liječnik će možda trebati prilagoditi dozu.

Djeca i adolescenti

Primjena lijeka Clizay ne preporučuje se u djece mlađe od 2 godine.

Drugi lijekovi i Clizay

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Posebice obavijestite svog liječnika ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova – to je stoga što će Vaš liječnik možda trebati prilagoditi Vašu dozu lijeka Clizay:

- rifampicin – lijek koji se koristi za liječenje bakterijskih infekcija
- gospinu travu, (također poznatu kao *Hypericum perforatum*) - biljni lijek koji se koristi za liječenje depresije i tjeskobe, kao i drugih stanja.

Clizay s alkoholom

- Ne preporučuje se kombinirati ovaj lijek s alkoholom.
- Ako pijete alkohol dok uzimate Clizay, negativni učinci alkohola mogu se pojačati.

Trudnoća i dojenje

Žene koje mogu zatrudnjeti trebaju razgovarati s liječnikom o upotrebi kontraceptiva.

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ne preporučuje se uzimati Clizay tijekom trudnoće jer učinci brivaracetama na trudnoću i nerođeno dijete nisu poznati.

Ne preporučuje se dojiti dijete dok uzimate Clizay jer brivaracetam prelazi u majčino mlijeko.

Nemojte prekinuti liječenje bez prethodnog razgovora sa svojim liječnikom. Prekid liječenja može povećati učestalost napadaja i naškoditi djetetu.

Upravljanje vozilima i strojevima

- Tijekom liječenja brivaracetamom možete osjećati pospanost, omaglicu ili umor.
- Pojava tih učinaka vjerojatnija je na početku liječenja ili nakon povećanja doze.
- Nemojte upravljati vozilima, voziti bicikl ni rukovati alatima ili strojevima dok ne vidite kako ovaj lijek utječe na Vas.

Clizay sadrži laktozu i natrij

Clizay filmom obložene tablete sadrže:

- laktozu (jednu vrstu šećera) – Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se sa svojim liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.
- natrij – Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po tableti, tj. zanemarive količine natrija.

3. Kako uzimati Clizay

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni. Drugi oblik/oblici ovog lijeka mogu biti prikladniji za određene bolesnike, primjerice za djecu (npr. ako ne mogu progutati cijelu tabletu); obratite se liječniku ili ljekarniku.

Clizay ćete uzimati zajedno s drugim lijekovima za epilepsiju.

Koliko lijeka uzeti

Vaš liječnik će odrediti odgovarajuću dnevnu dozu za Vas. Uzmite dnevnu dozu u dvije jednako podijeljene doze, u razmaku od oko 12 sati.

Adolescenti i djeca s tjelesnom težinom od 50 kg ili više i odrasli

- Preporučena pojedinačna doza iznosi od 25 mg do 100 mg i uzima se dvaput dnevno. Vaš liječnik se zatim može odlučiti za prilagodbu Vaše doze kako bi se pronašla najbolja doza za Vas.

Adolescenti i djeca s tjelesnom težinom od 20 kg do manje od 50 kg

- Preporučena pojedinačna doza iznosi od 0,5 mg do 2 mg po kilogramu tjelesne težine i uzima se dvaput dnevno. Vaš liječnik se zatim može odlučiti za prilagodbu Vaše doze kako bi se pronašla najbolja doza za Vas.

Djeca s tjelesnom težinom od 10 kg do manje od 20 kg

- Preporučena pojedinačna doza iznosi od 0,5 mg do 2,5 mg po kilogramu tjelesne težine i uzima se dvaput dnevno. Liječnik Vašeg djeteta se zatim može odlučiti za prilagodbu djetetove doze kako bi se pronašla najbolja doza za Vaše dijete.

Osobe s jetrenim tegobama

Ako imate jetrenih tegoba:

- kao adolescent ili dijete s tjelesnom težinom od 50 kg ili više ili kao odrasla osoba, najveća doza koju ćete uzimati bit će 75 mg dvaput dnevno.
- kao adolescent ili dijete s tjelesnom težinom od 20 kg do manje od 50 kg, najveća doza koju ćete uzimati je 1,5 mg za svaki kg tjelesne težine, dvaput dnevno.
- najveću dozu koju može uzimati dijete s tjelesnom težinom od 10 kg do manje od 20 kg je 2 mg za svaki kg tjelesne težine, dvaput dnevno.

Kako uzimati Clizay tablete

- Tablete progutajte cijele, uz čašu tekućine.
- Lijek se može uzimati s hranom ili bez nje.

Koliko dugo uzimati Clizay

Clizay je lijek za dugoročno liječenje – nastavite ga uzimati dok Vam liječnik ne kaže da prestanete.

Ako uzmete više lijeka Clizay nego što ste trebali

Ako ste uzeli više lijeka Clizay nego što ste trebali, obratite se svom liječniku. Možete osjećati omaglicu i pospanost. Također možete imati bilo koji od sljedećih simptoma: mučnina, vrtoglavica, problemi u održavanju ravnoteže, tjeskoba, izrazit umor, razdražljivost, agresivnost, nesanica, depresija, razmišljanja o samoozljeđivanju ili samoubojstvu, ili pokušaji da to učinite.

Ako zaboravite uzeti Clizay

- Ako propustite dozu, uzmite je čim se sjetite.
- Nakon toga uzmite sljedeću dozu prema uobičajenom rasporedu.
- Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.
- Ako niste sigurni što učiniti, pitajte svog liječnika ili ljekarnika.

Ako prestanete uzimati Clizay

- Nemojte prestati uzimati ovaj lijek ako Vam to ne kaže Vaš liječnik. Naime, prekid liječenja može povećati broj napadaja koje imate.
- Ako liječnik od Vas zatraži da prestanete uzimati ovaj lijek, on će postupno smanjivati dozu. To pomaže spriječiti povratak napadaja ili njihovo pogoršanje.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Vrlo česte: mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba

- pospanost ili omaglica

Česte: mogu se javiti u do 1 na 10 osoba

- gripa
- izrazit umor
- konvulzija, vrtoglavica (osjećaj da se sve oko Vas vrti)
- mučnina, povraćanje, zatvor
- depresija, tjeskoba, nesanica, razdražljivost
- infekcije nosa i grla (poput prehlade), kašalj
- smanjen apetit

Manje česte: mogu se javiti u do 1 na 100 osoba

- alergijske reakcije
- abnormalne misli i/ili gubitak dodira sa stvarnošću (psihotični poremećaj), agresivno ponašanje, nervozna uzbuđenost (agitacija)
- razmišljanje o samoozljeđivanju ili samoubojstvu; odmah to priopćite svojem liječniku
- smanjen broj bijelih krvnih stanica (što se naziva „neutropenijom“) – vidljivo u nalazima krvnih pretraga

Nepoznate: učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka

- rašireni osip s mjehurićima i ljuštenjem kože, osobito oko usta, nosa, očiju i genitalija (Stevens-Johnsonov sindrom)

Dodatne nuspojave u djece

Česte: može zahvatiti u do 1 na 10 osoba

- nemir i hiperaktivnost (psihomotorička hiperaktivnost)

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u [Dodatku V](#). Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Clizay

- Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
- Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza oznake „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.
- Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.
- Nikada nemojte nikakve lijekove baciti u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Clizay sadrži

Djelatna tvar je brivaracetam.

Jedna filmom obložena tableta sadrži 25 mg, 50 mg ili 100 mg brivaracetama.

Drugi sastojci su:

Jezgra

Laktoza hidrat, umrežena karmelozanatrij (E468), mikrokristalična celuloza, bezvodni silicijev dioksid, laktoza, magnezijev stearat (E470b).

Ovojnica

Clizay 25 mg filmom obložene tablete

Poli(vinilni alkohol) (E1203), titanijev dioksid (E171), makrogol 3350 (E1521), talk (E553b), crveni željezov oksid (E172).

Clizay 50 mg filmom obložene tablete

Poli(vinilni alkohol) (E1203), titanijev dioksid (E171), makrogol 3350 (E1521), talk (E553b), žuti željezov oksid (E172).

Clizay 100 mg filmom obložene tablete

Poli(vinilni alkohol) (E1203), titanijev dioksid (E171), makrogol 3350 (E1521), talk (E553b).

Kako Clizay izgleda i sadržaj pakiranja

Clizay 25 mg filmom obložene tablete

Ružičasta, ovalna, filmom obložena tableta, s utisnutom oznakom „B11“ na jednoj strani i „M“ na drugoj strani.

Clizay 50 mg filmom obložene tablete

Žuta, ovalna, filmom obložena tableta, s utisnutom oznakom „B12“ na jednoj strani i „M“ na drugoj strani.

Clizay 100 mg filmom obložene tablete

Bijela, ovalna, filmom obložena tableta, s utisnutom oznakom „B14“ na jednoj strani i „M“ na drugoj strani.

Clizay tablete su pakirane u blisterima u kartonskoj kutiji koja sadrži 14 ili 56 filmom obloženih tableta ili u višestrukim pakiranjima koja sadrže 168 (3 pakiranja po 56) filmom obloženih tableta.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

MSN Labs Europe Limited,
KW20A, Corradino Park,
Paola PLA 3000,
Malta

Proizvođač

Pharmadox Healthcare Limited
KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA3000,
Malta

MSN Labs Europe Limited
KW20A Corradino Park, Paola, PLA3000,
Malta

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

PharmaS d.o.o.
Radnička cesta 47

10000 Zagreb
Hrvatska
Tel: 01 5509375
info@pharmas.hr

Ovaj lijek odobren je u državama članicama Europskog gospodarskog prostora pod sljedećim nazivima:

Država	Naziv lijeka
Nizozemska	Brivaracetam MSN 25 mg filmomhulde tabletten Brivaracetam MSN 50 mg filmomhulde tabletten Brivaracetam MSN 100 mg filmomhulde tabletten
Češka	Clizay
Poljska	Clizay
Bugarska	EN: Clizay 25 mg; 50 mg; 100 mg film-coated tablets BG: Клизай 25 mg; 50 mg; 100 mg филмирани таблетки
Hrvatska	Clizay 25 mg; 50 mg; 100 mg filmom obložene tablete
Mađarska	Clizay 25 mg; 50 mg; 100 mg filmtabletta
Rumunjska	Clizay 25 mg; 50 mg; 100 mg comprimate filmate
Slovačka	Clizay 25 mg; 50 mg; 100 mg
Slovenija	Clizay 25 mg; 50 mg; 100 mg filmsko obložene tablete

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u ožujku 2026.